


Mange: 5th Nov 1892

33737/B/1

BM(MH) 424



11
11
P. Guénée
9^{bre} 1867

CAROLI LINNÆI

ARCHIATRI REGII; MED. ET BOT. PROF. REG. UPS.
HORT. ACAD. PRÆFECT.

HORTUS UPSALIENSIS.

Exhibens

PLANTAS EXOTICAS,

HORTO

UPSALIENSIS ACADEMIÆ

A SESE ILLATAS,

Ab anno 1742, in annum 1748,

ADDITIS

DIFFERENTIIS, SYNONYMIS,
HABITATIONIBUS, HOSPITIIS,
RARIORUMQUE DESCRIPTIONIBUS,

IN GRATIAM

Studioſæ juventutis,

VOL. I.

STOCKHOLMIÆ

Sumtu & literis LAURENTII SALVII

1748.

CHURCH OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

SERENISSIMO PRINCIPI,
 DOMINO
**ADOLPHO
 FRIDERICO**

D. G. ELECTO

SVEC. GOTHOR. VANDALORUMQUE
 PRINCIPI HEREDITARIO;

&c. &c. &c.

NORVEGIÆ HEREDI;
 DUCI SLESVICI, HOLSATIÆ,
 &c. &c. &c.

Domino Clementissimo.

QUam primum serenus ille Titan, novo vere septentrioni redditus, directioribus radiis suis seminaria nostra refovet, hæc reviviscunt actutum, virent florentque.

)o(

Cum

Cum Seminariis non incommode conferuntur Academiæ: Quoties Principes Augusti, illarum Tutores, Docentium lucubrationes sereno vultu adspiciunt, toties his animus & novæ vires adduntur. Ita demum sperati proveniunt fructus, scientiarum utpote incrementa.

Ex quo S. RA REG. CELSITUDO vestra, clementissime suscepto CANCELLARII ad nostram hanc Academiam munere, Augusto præsidio suo nos beatre & mira indies gratia laborantibus nobis addere stimulos dignata fuit, nã! nos ex votis, immo vero ultra vota, felicissimum ducimus ævum. O! nos nimium fortunatos, quibus Moderatore Sapientissimo Principe, quo nihil mitius, justius itidem graviusque nihil vidit Orbis, artium nostrarum studiis suaviter indulgere licitum est.

Itaque eo pium me gaudium impulit, ut primitias agri, quem colo, sacras esse velim nostræ huic Apollini, qui meis frugibus vigorem floremque vere dedit & dabit olim, quod devotissimus spero, maturitatem.

Ego vera æterna sanctissime polliceor obsequia, futurus ad cineres

SACRÆ REGIÆ CELSITUDINI TUÆ

*Subjectissimus fidelissimus
servus.*

C. LINNÆUS.

PRÆFATIO.

HORTI UPSALIENSIS prima fundamenta anno 1675 jecit OLAUS RUDBECKIUS Pater, a quo tres *Catalogi* (a) *plantarum exoticarum & indigenarum* exhibiti sunt.

Hic idem Hortus solo æquatus fuit funesto incendio Upsaliensi 1702 sub præfectura OLAI RUDBECKII Filii, a quo tempore fere incultus jacuit ad annum usque 1741.

Demum anno 1742 *INSTAURATUS* impensis Academiae ex unanimi consensu Senatus Academici, approbante Illustrissimo tum Cancellario C. GYLLENBORG, *ICONA* exhibente D. Barone C. HÅRLEMAN, Architecturæ primario Præfecto Regio, viro in ista arte sine pari. Hujus Horti cum alibi habetur historia (b) heic eandem præterimus.

MEÆ eodem anno commissus curæ vix quinquaginta exoticas includebat plantas; verum amicitia, quam mihi colere licuit cum Botanicis præstantissimis totius Europæ, factum ut undique mihi semina missa fuerint, quorum licet non pauca longo itinere effeta, multa tamen etiam fecunda plantas hujus Horti dedere. Sic debeo plantas

)o(2

INDI-

(a) RUDBECKII OLAI.

Catalogus plantarum Horti Academici Upsaliensis

Upsal. 1658. duod. latine. pag. 43.

Auctarium Horti Upsaliensis Academiae.

Upsal. 1666. duod. latine. pag. 22.

Hortus Botanicus.

Upsal. 1685. oct. lat-svec. pag. 120.

(b) *HORTUS UPSALIENSIS* in *Dissert. Academica propositus a S. Nauclero*; sub præsidio nostro, *Upsal. 1745. quart. cum figuris.*

PRÆFATIO.

INDICAS B. Jussæo instar omnium, Royen

EXOTICAS Hallero, Gleditschio, Ludvigio
Breynio, Wagnero, Bergero, Barrerio.

SIBIRICAS Ammanno, Gmelino, Bielkio.

VIRGINICAS Gronovio, Collinsono, Catess
bæo, Lawsono.

MONSPELIENSES Sauvagesio.

ITALICAS Rathgebio.

ANNUAS Dillenio, A. Gesnero, quos cum
gratiarum actione heic nomino, ut alios taceam.
Adeoque plantas hasce omnes, absque ullis impem
fis Academiae, ipse mihi comparavi omnes.

HESPERIDES dein placuit Clementissimæ nostræ
Principi Hereditariæ, S:ræ Reg. Celsitudinis

LUDOVICÆ ULRICÆ communicare; cujus
clementissimum exemplum secuti Comes C. F.
Piper Regiæ Camerae Præses, Comes *Törnflycht*
& Dominus *C. De Geer* Cubicularii Regii, & sic
Hortus Lauris, Citris, Aurantiis, Malis Sinensib
bus instructus est.

DIFFICULTATES tamen non paucæ, quas reliqui
Botanici in suis ignorant Hortis, mihi sese obecere:
mihi certandum est cum Hieme intense frigida, ea
que longissima, Æstate vero brevissima, cum Hor
tus hic inter Academicos omnes maxime Borealis
(c) sit, & Situs ejus maxime depressus & aquiloni
nimis expositus, ut taceam defectum Hortorum
curiosorum intra patriam, e quibus exoticas plan
tas mutuari licuerit.

CLI-

(c) Latitudo Upsal. 59 gr. 51½ min.

PRÆFATIO.

CLIMA nostrum plerumque sese ita habet:

Majus radices vivificat primis suis diebus, non tamen admittit plantarum ex Hibernaculis educationem ante XIII diem, cum *Quercus* (d) fronde scit & gelidæ jam noctes cessarunt.

Junius æstatem gratissimam & Botanicis negotiis aptissimam præbet.

Julius æstu (e) et siti premit, sed breve gaudium.

Augustus seminum maturitatem festinat, quo finito vix *Hordeum* in agris maturefcit amplius.

September gelidas noctes reducit & pruinas, foliaque arborum pallida reddit.

October arbores foliis spoliatur & fossas imbribus replet.

November glaciem & Nives reducit.

December aquas solida Glacie vestit, Terram nivibus, cælumque nebulis.

Januarius intensissimum hiemale Frigus (f) adducit, cælo nebuloso plerumque mæstus.

Februarius radiis solaribus parietes calefacere incipit.

Martius glaciem nivesque solvit, aquas & campos denudat, noctes tamen gelidas alit.

Aprilis ultimi dies, discissa hyeme, primum terræ subactionem seminumque sationem admittunt.

)o(3 MA-

(d) *QUERCUS* frondes exserebat mense maio 1741 die 22. 1742-13; 1743-6; 1744-8; 1745-12; 1746-11; 1747-9.

VII

(e) Calor summus 1747. $\frac{VII}{2}$ hora $3\frac{1}{4}$ post merid. 30 gr. supra punctum congelationis.

(f) Frigus summum 1740 $\frac{1}{2\frac{1}{5}}$ nocte gr. 28 infra punct. congelationis, ubi punctum congelationis 0; calor aquæ coquentis 100.

(g) Sub dio vix semina maturefcunt *Scorzonera* 3; *Centaurea* 8; *Cicer* 1; *Chenopodium* 2; *Scabiosa* 2; 4.

PRÆFATIO.

MATURESCUNT in Horto nostro **ANNUAE** Plantæ *regionum septentrionalium* feliciter latius brevi æstate, at *Europæ Australioris* Narbonæ Hispaniæ, Italiæ pulchrè quidem florent, sed difficulter sub dio semina perficiunt (g). *Indicæ* autem sub dio ne florem quidem promunt (h). Plurimæ itaque ingenii, artis & laboris heic requirunt Floræ sacra, quam ullibi locorum. Felices vos, Australes Botanici, quibus hæc sub mitiori cælo peragere concessum est.

Animus fuisset quidem per plures adhuc annos Plantas colligere, antequam Hortum nostrum publicè exponerem luci; dum autem quotannis vidi, quanto cum incommodo Floræ alumni, sub demonstrationibus Botanicis, calamis nomina exipiant, eorum desiderio satisfacere meum putavi.

VARIETATES in hoc opusculo data opera plerasque omisi, ne cresceret in molem. Multas plantas omisi, quarum Flores non dum prodire, ne quando dubias species proponerem.

GENERA eadem assumimus, quæ antea a nobis data tuere in Generibus plantarum, nec mutavimus ulla, præterquam *Allium*, in quo *Illustrens* *Hallerum* secuti sumus.

SYNONYMA vulgatissima assumpsi uti C. Bauhinii ob Pinacem, Camerarii, Dodonæi, Clusii, Lobelii propter Icones; Royeni, Gronovi, Jussæi *Halleri* ob differentias específicas. **HALLERUS**

(h) Sub dio non florent *Sigesbeckia* 1, *Commelina* 1, *Acalypha* 1, *Melothria* 1.

(i) *Act. Stockholm.* 1739, pag. 1.

PRÆFATIO.

HABITATIONES specierum spontaneas s. Loca earum Natalia adjeci, uti Fundamentum unicum idque genuinum Horticulturæ, quod alibi (i) proposui.

HOSPITIUM quod plantæ in Horto occuparunt addidi, ut videant exteri, quænam nostrum patiantur clima, utque nostrates sciant, quæ plantæ facile, quæque difficilior colli in suis Hortis possint.

OBSERVATIONES studiose evitavi, ne cresceret opusculum; futurum opinor brevitate sua studiosis gratissimum. *Descriptions* tamen brevissimas rariorum plantarum interdum adjeci, præsertim in Sibiricis plantis, quas propediem insequentibus voluminibus illustrabit egregius inventor *Gmelinus*.

SVECICAS plantas, quæ non culinares, quamquam, exceptis Lapponicis, fere omnes introduxi in Hortum, exclusi in hoc opere, utpote quas ante in *Flora Svecica* dedi.

Si ita Deo T. O. visum fuerit, (ut tres mei pridem discipuli, qui meo iussu & Mæcenatum indultu remotissimas orbis plagas invisunt (k), Salvi patriæ reddantur, plures plantas in nostrum Hortum olim introducendas, certo auguramur.

Dabam ex Museo Horti Upsalienfis 1748. d. 26 aprilis,

AU-

(k) *TERNSTRÖM* *Christoph.* Theologus, *CHINAM* 1745 adiit.
KALM *Petr.* Profess. Aböensis, in *CANADAM* 1747 iter suscepit,
HASSELQUIST *Frid.* Med. stud. *TERRAM SANCTAM* aditurus, in procinctu est.

AUCTORES.

SYNONYMA primaria e *C. Baubini* pinace
petenda.

ICONES Europæarum plantarum apud *Camera-*
rium, *Clusium*, *Lobelium*, *Dodonæum* evol-
endæ.

DESCRIPTIONES vulgarium dederunt *Clusius*,
J. Baubinus, *Morisonus*, *Rajus*, in Historiis.

VARIETATES copiosissimas collegit *Tournefor-*
tius.

DIFFERENTIÆ Specierum habentur apud *Gro-*
novium, *Royenum*, *Hallerum*.

SIBIRICAS et septentrionales pulchre habet *Gmeli-*
nus.

ALPINAS optime collegit & proposuit *Hallerus*.

OBSERVATIONES collegit *Vaillantius* & (in
synopsi) *Rajus*.

AFRICANÆ plantæ apud *Hermannum*, *Rajum*,
Bumannum inquirendæ.

ASIATICÆ apud *Rheede*, *Plukenetium*, *Rajum*
(in supplemento) indagandæ.

AMERICANAS septentrionales *Claytonus* cum
Gronovio, Australiores *Marcgrave*, *Plumier*,
Sloane indagarunt.

CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

CANNA.

1. CANNA foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis.
Roy. lugdb. 11. Fl. zeyl. 1.

Canna spathulis bifloris. *Hort. cliff. 1.*

Canna indica. *Clus. hist. 81. Sloan. flor. 181. hist. 1. p. 253.*

Arundo indica latifolia. *Baub. pin. 19.*

β. *Cannacorus* amplissimo folio, flore rutilo. *Tournef. inst. 367.*

Habitat in *Asia, Africa, America.*

Hospitatur in *Caldario*, perennis.

2. CANNA foliis lanceolatis petiolatis enerviis. *Roy. lugdb. 11. Vir. cliff. 104.*

Cannoides. *Hort. cliff. 488.*

Cann - Acorus glaucophyllus, ampliore flore iridis palustris facie. *Dill. elth. 69. t. 59. f. 69.*

Habitat in *America.*

Hospitatur in *Caldario*, perennis, vix florens.

AMOMUM.

1. AMOMUM scapo nudo, spica ovata. *Hort. cliff. 3. Fl. zeyl. 3.*

Zingiber, angustiore folio, foemina, utriusque indiae alumna. *Pluk. alm. 317.*

Zingiber. *Baub. pin. 35. theatr. 651.*

Inschi. *Rhed. mal. 11. p. 21. t. 12.*

Pharm : ZINGIBERIS Radix ; Condita.

Svecis Ingfæra.

Habitat in *utraqve India* calidiore.

Hospitatur in *Caldario & Vaporario* perennis, sterilis.

2. AMOMUM scapo nudo, spica oblonga obtusa. *Hort. cliff. 3. Fl. zeyl. 2.*

A

Zingi-

MONANDRIA MONOGYNIA.

Zingiber latifolium sylvestre. Herm. lugdb. 636.

Kua. Rhed. mal. 11. p. 13. t. 7.

Habitat in Malabar, Zeylona.

Hospitatur in Caldario & Vaporario, perennis, sterilis.

C O S T U S.

1. *COSTUS. Hort. cliff. 2. Fl. zeyl. 5.*

Costus arabicus. Baub. pin. 36.

Arundo indica latifolia brasiliensis, squammato capite.

Morif. hist. 3. p. 251. f. 8. t. 14. f. 8.

Anonyma. Merian. surin. 36. t. 36.

Tiana Kua. Rhed. mal. 11. p. 15. t. 8.

Pharmac. COSTI DULCIS & ARABICI Radix.

Habitat in Brasilia, Surinama, Malabar, Zeylona.

Hospitatur in Caldario, perennis, sterilis.

K Æ M P F E R I A.

1. *KÆMPFERIA foliis ovatis sessilibus. Fl. zeyl. 8.*

Kæmpferia. Hort. cliff. 2. t. 1.

Orchis abortiva bifolia. Rudb. elys. 2. p. 218. f. 3.

Wanhom. Kæmpf. amoen. 901. t. 902.

Katsjula-Kelengu. Rhed. mal. 11. p. 81. t. 41.

Pharm. GALANGÆ MAJORIS & MINORIS Radix.

Habitat in Zeylona, Malabar, Philippinis.

Hospitatur in Caldario & Vaporario, perennis, florens absque fructu.

B O E R H A V I A.

1. *BOERHAVIA diffusa. Fl. Zeyl. 10.*

Boerhavia foliis ovatis. Hort. cliff. 17.

Antonifophyllum solanifolium majus. Vaill. act. 1722. p. 258.

Talu dama. Rhed. mal. 7. p. 105. t. 56.

Habitat in India orientali.

Hospitatur in Caldario, perennis fructificans.

Obs. Stamen huic unicum est, nec tria, uti constitit nuperis observatis.

D I G Y N I A.

C O R I S P E R M U M.

1. *CORISPERMUM floribus lateralibus.*

Corispermum foliis alternis: Hort. cliff. 3. It. gotl. 316.

Cori-

Corispermum hyssopifolium. *Juss. act.* 1712. p. 244.
t. 10.

Rhagrostis femine pastinacæ. *Buxb. cent.* 3. p. 30. t. 55.

Habitat in *Tartaria arenosis circa Wolgam.*

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

Obs. *Flos infimus stamina quatuor, secundus tria, tertius duo, reliqui unum habent.*

2. CORISPERMUM spicis squarrosis.

Corispermum glabrum majus, longissimis foliis. *Amm. ruth.* 158.

Rhagrostis foliis arundinaceis. *Buxb. cent.* 3. p. 30. t. 55.

Habitat in *Tartaria ad Wolgæ ripam, inque desertis Cassakorum.*

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

Obs. *Radix annua. Omnia præcedentis, sed duplo major, magis procumbens.*

Caulis in hac glaber, in præcedente vero parum scaber cum villositate quadam. Folia duplo majora & robustiora, Ramorum apices magis imbricati foliis, hinc quasi spicati. Sed an his sufficienter a præcedenti distincta species? /S

BLITUM.

1. BLITUM capitellis spicatis terminalibus.

Blitum foliis triangularibus dentatis. *Hort. cliff.* 28.

Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis nudis. *Virid. cliff.* 1.

Chenopodio - Morus major. *Boerb. lugdb.* 2. p. 91.

Chenopodio - Morus foliis pene integris. *Hall. gött.* 6.

Morocarpus major. *Rupp. jen.* 2. p. 271.

Spinachia baccifera. *Ald. farnes.* 85.

Atriplex baccifera. *Raj. hist.* 197.

Habitat in *Comitatu Tyrolensi.*

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

2. BLITUM capitellis sparsis lateralibus.

Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis foliosis. *Hort. cliff.* 495.

Blitum fragiferum maximum polyspermum. *Amm. ruth.* 166.

Chenopodio - Morus foliis argute dentatis. *Hall. gött.* 6.

Atriplex sylvestris baccifera. *Clus. hist.* 2. p. 135.

Atriplex sylvestris, mori fructu. *Bauh. pin.* 119.

Habitat in *Tartaria & Hispania.*

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

CLASSIS. II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

NYCTANTHES.

I. NYCTANTHES foliis inferioribus cordatis obtusis, superioribus ovatis acutis.

Nyctanthes caule volubili, foliis subovatis acutis.
Hort. cliff. 5. Fl. zeyl. 12.

Jasminum arabicum, foliis limonii conjugatis, flore albo duplici odoratissimo. *Angl. hort. t. 27.*

Jasminum f. Sambac arabum, folio acuminato, flore stellato majore albo odoratissimo, vulgo Mugarino.
Till. pis. 87. t. 31.

Sambac arabicum f. Gelseminum arabicum. *Alp. ægypt. 39. t. 39. Raj. hist. 1600.*

Sambac arabum f. Jasminum arabicum aut Syringa arabica. *Clus. cur. 3. t. 3.*

Habitat in India orientali, Malabarìa.

Hospitatur in Caldario, frutex florens, vix fructum maturans, sempervirens.

Deser. Frutex bipedalis. Caulis griseus, rimosus. Rami oppositi, virides, teretes, vix pilosi, interdum volubiles, sæpe non. Folia prima, quæ vere erumpunt; cordata sunt, obtusa, & fere emarginata; insequentia, æstate, ovata, acuta, omnia nuda, petiolata, venosa, integerrima, utrinque glabra, ad vasorum ramificationes subtus sæpe villis notata. Petioli incurvi & quasi geniculum in medio formantes, hinc cadunt folia juxta basin folii, re manente petiolo rigidiusculo (fere ut in *Volkameria*) unde rami asperi, quamvis vix spinam mentiantur. Racemus ramos terminans, erectus, ex tribus, novem vel quinque floribus oppositis, pedunculatis. Perianthium monophyllum, octo dentatum, dentibus subulatis, acuminate, canaliculatis, longis. Corollæ tubus cylindræus, longitudine calycis. Limbus horizontalis, octo partibus: lobis ovatis, concavis, longitudine tubi. Stamina brevissima, in medio tubi hærentia. Germen subrotundum, stylus filiformis, brevis. Stigma crassiusculum, apice bifido. Odor florum Liliæ convalli vel citri, nocturnus gratissimus. Ex his oleum Jasmini primario præparatum fuit.

JASMI-

DIANDRIA MONOGYNIA.

5

J A S M I N U M.

1. JASMINUM foliis oppositis pinnatis. *Hort. cliff.* 5.
Jasminum vulgatus, flore albo. *Baub. pin.* 397.
Jasminum. *Dod. pempt.* 409.
Pharmac. JASMINI Oleum.
Svecis Sierfmin.

Habitat in *India orientali*.

Hospitatur in *Frigidario* & *Tepidario*, frutex, florens.

2. JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, ramis teretibus.

Jasminum foliis alternis ternatis obtusis. *Hort. cliff.* 5.

Jasminum indicum flavum odoratissimum. *Ferr. cult.* 393.

Habitat - - - -

Hospitatur in *Tepidario*, frutex florens, sempervirens.

Descr. Caulis Frutex altus, rami rubicundi, ramuli teretes, nisi quod stria utrinque a petiolo descendat. Folia ternata (aut in medio ramulorum pinnata septem foliis) foliolis ovatis, vix acuminatis, glabris, juxta petiolum a latere interiore deliquescentibus, petiolo in medio rubro.

3. JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, ramis angulatis.

Jasminum foliis alternis ternatis acuminatis. *Hort. cliff.* 6.

Jasminum humile luteum. *Baub. pin.* 397.

Jasminum f. *Gelseminum luteum.* *Baub. hist.* 2. p. 102.

Habitat. - - - - -

Hospitatur in *Frigidario*, Frutex, florens, sempervirens.

Descr. Frutex parvus: rami virides, glabri, flexiles, parum angulati. Folia ternata (in medio ramorum pinnata ex septem foliis) foliola lateralia ovalia f. ovata, terminali duplo majore, ovato, acuminato, basi etiam saepe acuto.

4. JASMINUM foliis alternis ternatis simplicibusque, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 5.

Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum. *Baub. pin.* 398.

Jasminum fruticans. *Dod. pempt.* 571.

Habitat in *Neapolitanis* & *Monspeliensibus* sepibus.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex, florens.

P H I L L Y R E A.

1. PHILLYREA foliis lanceolatis subintegerrimis.

Phillyrea foliis ovato lanceolatis vix crenatis. *Hort. cliff.* 4.

Phillyrea ligustri folio. *Baub. pin.* 476.

Phillyrea 3. *Clus. hist.* 1. p. 52.

β. Phillyrea foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 4.

Phillyrea angustifolia prima. *Baub. pin.* 476.

Phillyrea 4. *Clus. hist.* 1. p. 52.

γ. Phillyrea angustifolia secunda. *Baub. pin.* 476.

Phillyrea 5. *Clus. hist.* 1. p. 52.

Habitat in glareosis saxosis rupibus *Hispaniæ*, *Galliæ*, *Italiæ*.

Hospitatur in *Frigidario*, arbor florens, sempervirens

2. PHILLYREA foliis cordato-ovatis. *Hort. cliff.* 4.

Phillyrea latifolia spinosa. *Baub. pin.* 476.

Phillyrea folio ilicis. *Baub. hist.* 1. p. 541.

Phillyrea 1. *Clus. hist.* 1. p. 51.

β. Phillyrea folio leviter serrato. *Baub. pin.* 476.

Phillyrea 2. *Clus. hist.* 1. p. 52.

Habitat in *Hetruria*, *Lusitania*.

Hospitatur in *Frigidario*, florens, sempervirens.

Obs. Valde affinis præcedenti, licet folia diversa.

SYRINGA.

1. SYRINGA foliis ovato cordatis. *Hort. cliff.* 6.

Syringa cærulea. *Baub. pin.* 398.

Lilac. *Tournef. inst.* 601.

Calobotrychis. *Renealm. spec.* 31. t. 30.

β. Lilac flore albo. *Tournef. inst.* 601.

Habitat in *Oriente*.

Hospitatur frequens in hortis, sub dio, arbuscula fructificans, sepes majores constituens, cicur.

2. SYRINGA foliis lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 6.

Syringa persica foliis integris. *Herm. lugdb.* 586.

Lilac ligustri folio. *Tournef. inst.* 602.

Agem Lilac persarum. *Corn. can.* 190.

Habitat in *Persia*.

Hospitatur sub dio, rarius in *Frigidario*, frutex, florens, sepes minores constituens.

3. SYRINGA foliis lanceolatis integris laciniatisque. *Hort. cliff.* 6.

Ligustrum foliis laciniatis. *Baub. pin.* 476.

Lilac:

Lilac laciniato folio. *Tournef. inst.* 602.

Agem lilac persarum, inciso folio. *Corn. canad.* 188.

Habitat in Persia.

Hospitatur in Frigidario. † Frutex.

Obs. Forte antecedentis sola varietas.

VERONICA.

1. VERONICA spicis terminalibus, foliis oppositis lanceolatis ferratis acuminatis.

Veronica spicata longifolia altera. *Amm. ruth.* 26.

- β. Veronica spicata, urticæ folio. *Amm. ruth.* 26.

Habitat in Tatavia.

Hospitatur sub dio, perennis fructificans.

Obs. Radix perennis. Caules erecti, glabri, bipedales, ex una eademque radice numerosissimi. Convenit statura cum Veronica foliis ternis (*Fl. Sv.* 6.) sed differt foliis latioribus oppositis: an itaque Veronicæ 1, erectioris latifoliæ. *Clus. hist.* 1. p. 346. varietas.

2. VERONICA spicis terminalibus, foliis oppositis crenatis obtusis, caule erecto tomentoso.

Veronica spicata lanuginosa & incana, floribus cæruleis. *Amm. ruth.* 21. n. 30.

Habitat ubique per Ucraniam & Samaram.

Hospitatur sub dio, perennis.

Descr. Radix paucorum annorum. Caules erecti, vix pedales, teretes, tomentosi, albi. Folia lanceolato-oblonga (ligustri), crenata, subtus albo tomento. supra viridia, vix manifeste tomentosa, obtusa, petiolis brevissimis, pollicem transversum longa. Spica unica erecta rara, calyces albo-tomentosi, corollæ cæuleæ. Hæc in cultis deponit albedinem tomenti, minusque tomentosa fit, & argutius serrata, magisque ramosa, & ad Veronicam spicatan secundam *Floræ Svec.* 7. proprius accedens; forte itaque Veronicæ 2. erectioris angustifoliæ 2. *Clus. hist.* 1. p. 346. varietas.

3. VERONICA spicis terminalibus, foliis ternis æqualiter ferratis.

Habitat in Siberia.

Hospitatur sub dio perennis.

Obs. Differt a Veronica foliis ternis *Fl. Svec.* 6. quod hæc semper folia terna promit, nec sæpius quatuor uti maritima. Quod folia glabra, nec subtus tomentosa, quod Serraturæ foliorum æquales & simpliciter serratæ, nec inæquales & duplicato serratæ. Quod serraturæ acutæ, nec acuminatæ, ut in maritima. Quod caulis duplo crassior, inferne omnino glaber, nec ut in illa tomentosus.

JUSTICIA.

1. JUSTICIA. arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis persistentibus, corollarum galea concava.

Fl. zeyl. 16.

Justicia foliis ovato-lanceolatis, spicis foliosis, florum galea concava. *Hort cliff.* 9.

Adhatoda zeylanensium. *Pluk. alm.* 9. t. 173. f. 3.
Herm. lugdb. 642. t. 643. *Tournef. inst.* 175.

Habitat in Zeylona.

Hospitatur in Caldario, Tepidario & Frigidario, arbuscula, raro florens, sempervirens.

VERBENA

2. **VERBENA**, tetrandra spicis fasciculatis, foliis lanceolatis amplexicaulibus.

Verbena foliis lanceolatis, floribus congestis fastigiatis. *Hort. cliff.* 11.

Verbena bonariensis altissima, lavendulæ canariensis spica multiplici. *Dill. elth.* 406. t. 300. f. 387.

Habitat in agro Bonariensi.

Hospitatur in Frigidario, perennis, fructificans.

Obs. Caulis articuli duobus lateribus oppositis excavato-canaliculati. Folia dentata, rugosa. Fructu maturo cadunt calyces cum inclusis seminibus.

3. **VERBENA** tetrandra, spicis filiformibus, foliis multido-lacinitis, caulibus numerosis.

Verbena humilior foliis incis. *Clayt. virg.* 8.

Verbena urticæ folio, canadensis, foliis incis, flore majore. *Tournef. inst.* 200. *Hall. gött.* 174.

Habitat in Lusitania.

Hospitatur, sub dio perennis, fructificans.

Obs. Differt a *Verbena* communi, *Fl. Sv.* 26. quod hæc duplo major, ex eadem radice plures ramos fert, & radice perenni gaudet, cum vulgaris annua sit. *Verbena lusitanica* latifolia procerior *Tournef.* 200, est biennis alias pro eadem habere.

4. **VERBENA** tetrandra, spicis longis acuminatis, foliis hastatis.

Verbena foliis lanceolatis serratis, spicibus filiformibus paniculatis. *Roy. lugdb.* 327.

Verbena americana altissima, spica multiplici, urticæ foliis angustis, floribus cæruleis. *Raj. app.* 286.
Herm. parad. 242. t. 242.

Verbena americana urticæ foliis angustioribus, flore cæruleo. *Moris. hist.* 3. p. 408.

5. *Verbena americana* altissima, urticæ foliis angustis, spicis brevioribus, floribus purpureis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 186.

Hab;

DIANDCIA MONOGYNIA.

9

Habitat in Canada.

Hospitatur sub dio, perennis.

- γ. VERBENA tetrandra spicis filiformibus paniculatis, foliis indivisis ferratis petiolatis.

Verbena foliis ovatis, caule erecto, spicis filiformibus paniculatis. *Hort. cliff.* 11. *Gron. virg.* 7. *Roy. lugdb.* 327.

Verbena, urticæ folio, canadensis. *Raj. hist.* 536. *Zan. hist.* 203.

Verbena recta canadensis, f. virginiana maxima, urticæ foliis. *Moris. hist.* 3. p. 418. f. 11. t. 25. f. 3.

Verbena peregrina, foliis urticæ. *Dod. pempt.* 125.

Verbena lamii folio. *Barr. rar.* 30. t. 1146.

Habitat in Virginia, Canada.

Hospitatur, sub dio, perennis.

Obs. Omnes gaudent staminibus quatuor, nec ex his quatuor speciebus ulla diandra est, ideoque ad Didynomia classē amandaretur genus: nisi repugnant plures aliæ diandræ: nec genus naturale lubenter lacerarem.

AMETHYSTEA.

- ι. AMETHYSTEA.

Amethystina montana erecta, foliis exiguis digitatis trifidis-ferratis, flosculis cum coma e cæruleo janthinis. *Amm. ruth.* 44. *Hall. act. upf.* 1742. p. 51.

Habitat in montosis Siberiæ.

Hospitatur sub dio, annua, fructificans.

ZIZIPHORA.

- ι. ZIZIPHORA foliis lanceolatis, floribus lateralibus. *Roy. lugdb.* 313.

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus ex alis. *Hort. cliff.* 305.

Acinos syriaca, folio mucronato, capsulis hirsutis. *Moris. hist.* 3. p. 404. f. 11. t. 19. f. 3, *Raj. app.* 300.

Clinopodium orientale hirsutum, foliis inferioribus ocymum, superioribus hyssopum referentibus. *Tournef. cor.* 12.

- β. Acinos syriaca, tenuiore folio, capsulis hirsutis. *Moris. hist.* 3. p. 404. f. 11. t. 19. f. 4. *Raj. app.* 300.

Habitat in Syria & Media,

Hospitatur sub dio, annua, fructificans.

S A L V I A.

1. SALVIA foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. *Hort. cliff.* 12.

Salvia major. *Baub. pin.* 232.

Salvia. *Cam. epil.* 475.

- β. Salvia major, foliis ex luteo & viridi variegatis.

Boerb. lugdb. 1. p. 166.

Pharmac. SALVIÆ Herba, Aqua, Spiritus, Oleum, Flores, Semina.

Svecis Salvia. *Tysk* Salvia.

Habitat in *Gallia Narbonensi* & *Italia*.

Hospitatur in *Frigidario*, raro sub dio, hymenes ferens, perennis.

- * SALVIA foliis ovatis inciso-crenatis, verticillis subnudis. *Fl. Sv.* 28. flore albo.

Habitat in *Germania*, rarius in *Svecia*.

Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

Obs. Radix vivax. Folia cordato-oblonga, repanda crenata, summa sessilia. Galea corollæ falcata. Corollæ albo colore variantes. Stylus corolla longior, galea vestitus.

3. SALVIA foliis simplicibus dentato-pinnatis rugosis verrucosis. *Hort. cliff.* 13.

Horminum rugoso verrucosoque folio, cornu cervi exprimente. *Pluk. alm.* 186. t. 194. f. 5. *Herm. parad.* 186. f. 186.

Horminum ceratophyllum rugosum, flore sulphureo. *Moris. hist.* 3. p. 293. f. 11. t. 13. f. 6.

Sclarea rugoso verrucosoque folio laciniato. *Tournef. inst.* 18c.

Habitat in *Persia*.

Hospitatur in *Frigidario*, biennis fructificans.

Obs. Totâ planta lanata & folia valde rugosa, hinc affinis sequenti.

4. SALVIA foliis rugosis oblongo-cordatis: floralibus calyce longioribus. *Hort. cliff.* 12.

Horminum Sclarea dictum. *Baub. pin.* 234.

Orvala. *Dod. pempt.* 292.

Pharmac. SCLAREA (GALLITRICHI) Herba.

Habitat in *Syria*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis, fructificans.

5. SALVIA foliis hastato-triangularibus oblongis crenulatis obtusis.

Sclarea folio triangulari, caule tomentoso. *Tournef. inst.* 180.

Hor-

Horminum hastatis amplioribus foliis f. ari modo alatis caulibus & pediculis araneosa lanugine villosis, ex infula gomorra. *Pluk. alm. 185. t. 301. f. 2. bona.*

Horminium canariense tomentosum, hastato folio. *Moris. hist. 3. p. 394. f. 11. t. 13. f. 17.*

Habitat in Canariis.

Hospitatur in Tepidario, frutescens, fructificans, sempervirens.

Obs. Caulis lana araneosa molli tectus, quod singulare; Hæcque præcipue in tepidario fit; uti idem fit in Marrubio vulgari & Marrubiis reliquis in Caldario calido loco positus, an itaque avertat lana calorem? Frutex est.

6. SALVIA foliis cordata-fagittatis ferratis acutis. *Hort. cliff. 13.*

Horminum luteum glutinosum. *Bauh. pin. 238.*

Horminum sylvestre secundum. *Clus. hist. 2. p. 29.*

Orvala tertia. *Dod. pempt. 292.*

Habitat in Germania, Italia, locis lutosi ad scaturigines.

Hospitatur in Frigidario, perennis.

7. SALVIA foliis cordatis crenato dentatis, verticillis subnudis, stylis corollæ labio inferiori incumbentibus.

Salvia foliis cordato fagittatis dentatis. *Hort. cliff. 495.*

Horminum sylvestre 3. *Clus. hist. 2. p. 29.*

Habitat in Hungaria.

Hospitatur sub dio, annua, cicur.

Descr. Folia cordata, obtusiuscula, petiolata, petiolis interdum duobus foliolis minimis ovatis lyrata. Verticilli nudi, corollis lavendulæ parvis, galea ovata, stylo corollæ longiore, labio inferiori corollæ incumbente, seu deflexo.

8. SALVIA foliis ovatis oblongis obtusis æqualiter crenatis, corolla galea semiorbiculata.

Horminum coma viridi. *Tournef. inst. 178.*

Habitat - - -

Hospitatur sub dio, annua.

Descr. Radix annua. Caules erecti, herbacei, virides, parum pilosi. Folia ovato-oblonga, æqualiter crenata: crenis rotundatis, obtusa, venosa, inferiora longis petiolis, superiora sessilia. Folia floralia summa cordata, integerrima. Verticilli vix constant pluribus quam tribus utrinque floribus ad alas foliorum. Galea corollæ semi orbiculata, integerrima nec emarginata, Labium inferius integerrimum emarginatum, dentes laterales prominenti, acuti. faux alba Pistillum incurvum, vix prominens.

ROSMARINUS.

1. ROSMARINUS. *Hort. cliff. 14.*

Rosmarinus hortensis, angustiore folio. *Bauh. pin. 217.*

Pharmac. ROSMARINI Herba, Aqua, Oleum, Semina, ANTHOS Flores conserva, Spiritus.

Sve.

Svecis Rosmarin.

Habitat in *Hispania*, *Narbona*, *Gallilea*. &c.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex, florens, sempervirens.

M O N A R D A.

1. MONARDA capitulis ~~se~~terminalibus, caule obtuse angulato.

Monarda floribus capitatis, caule obtuso. *Virid. cliff.* 3.

Monarda floribus capitatis, caule obtuso. *Hort. cliff.*

11. 495.

Origanum fistulosum canadense. *Corn. can.* 13. t. 14.

Clinopodium canadense majus hirsutum, floribus fistulosis. *Morif. hist.* 3. p. 374. f. 11. t. 8. f. 2.

Habitat in *Canada*.

Hospitatur in *Frigidario*, florens, perennis,

2. MONARDA floribus verticillatis, corollis punctatis.

Monarda floribus verticillatis. *Hort. cliff.* 495. *Gron.*

vig. 9. *Roy. lugdb.* 313.

Clinopodium virginianum angustifolium, floribus amplis luteis purpuro maculatis, cujus caulis sub quovis verticillo decem vel duodecim foliolis rubentibus est cinctus. *Pluk. alm.* 111. t. 24. f. 1.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur sub dio, inque frigidario, tepidario & caldario, sed prima hyeme plerumque perit.

Obs. Flores punctis obscuris glandulosis adpersi; Folia fragrantissima sunt.

D I G Y N I A.

B U F F O N I A.

1. BUFFONIA. *Diff. nov. sen.* 2.

Alfine polygonides tenuifolia, flosculis ad longitudinem caulis velut in spicam dispositis. *Raj. syn.* 3. p. 246.

Polygonum, angustissimo gramineo folio, erectum.

Magn. monsp. 211.

Polygono angustissimo folio affinis. *Bauh. pin.* 281.

Raj. suppl. 131.

Habitat in *Anglia*, *Monspeli.*

Hospitatur in *Apricario*, annua, †

CLASSIS. III,

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

VALERIANA.

1. VALERIANA floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis.

Valeriana foliis infimis integris, proximis laciniatis, caulinis pinnatis. *Hort cliff.* 16.

Valeriana hortensis. *Bauh. pin.* 164.

Valeriana major. *Lob. hist.* 44.

Pharmac. VALERIANÆ MAJORIS (PHU) Radix, Herba.

Habitat in *Alsatia*.

Hospitatur *sub dio*, perennis, fructificans,

2. VALERIANA floribus tetrandris æqualibus, foliis pinnatifidis, seminibus palea ovali adnatis.

Valeriana lutea humilis. *Amm. ruth.* 18. n. 25. tab. 3.

Habitat in *Siberiæ* campis.

Hospitatur *sub dio*, biennis.

Obs. Semina nuda absque pappo, affixa paleæ ovali, perpendiculari, laterali, majori.

3. VALERIANA floribus diandris ringentibus, foliis ovatis - sessilibus. *Hort. cliff.* 15.

4. Valeriana foliis ovatis sessilibus, floribus diandris ringentibus, tubo squammas calycinas multoties exsuperante. *Moerb. E. N. C.* 1742. p. 302.

Valeriana cornucopioides mauritanica, flore purpureo longiore. *Walth. hort.* 2. p. 169.

Valeriana indica. *Clus. hist.* 2. p. 54.

Valeriana peregrina purpurea albave. *Bauh. pin.* 164. *prodr.* 87.

Pseudo-Valeriana cornucopioides annua purpurea, semine solido. *Moris. hist.* 3. p. 104. f. 7. t. 16. f. 27.

- β. Valeriana foliis ovatis sessilibus, floribus diandris ringentibus, tubo squammas calycinas parum exsuperante, *Moerb. E. N. C.* 1742. p. 302.

Habitat in arvis *Americæ, Siciliæ, Hispaniæ, Mauritaniæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

4. VALERIANA floribus monandris, foliis pinnatifidis.

Valeriana foliis pinnato-lacinatis, floribus diandris.

Hort. cliff. 16.

Valeriana foliis calcitrapæ. *Bauh. pin.* 164.

Valeriana annua seu æstiva. *Clus. hist.* 2. p. 54.

- β. Valeriana sylvestris, foliis tenuissime divisis. *Bauh. pin.* 165.

Habitat in *Lusatia.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

5. VALERIANA floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 15.

Valeriana rubra. *Bauh. pin.* 165.

Phu peregrinum. *Cam. epit.* 24.

Ocymastrum valerianthon. *Lob. ic.* 241.

Habitat in muris ruderatis *Normannia, Helvetia, Italia.*

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

- * VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Fl. Sv.* 32.

- β. Valerianella arvensis præcox humilis, foliis ferratis. *Tournef. inst.* 132.

Phu minimum alterum. *Lob. ic.* 717.

- γ. Valerianella caule dichotomo, foliis oblongis plerumque ferratis, feminis corona tridentata. *Hal. helv.* 666.

Locusta major. *Riv. mon.* 8.

Habitat in *Europa.*

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur, oleracea.

C N E O R U M,

1. CNEORUM. *Hort. cliff.* 18.

Chamælea tricoccus. *Bauh. pin.* 462. *hist.* 1. p. 87.

Chamælea. *Dod. pempt.* 363. *Cam. epit.* 973.

Habitat in glareosis siccis fervidis *Hispaniæ*, *Narbonæ*.
Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

TAMARINDUS,

1. TAMARINDUS. *Hort. cliff.* 18. *Flor. zeyl.* 14. *Tournef. act.* 1699. p. 69.

Siliqua arabica, quæ Tamarindus. *Baub. pin.* 403.

Balam. pulli. *Rhed. mal.* 1. p. 39. t. 23.

Pharmac: TAMARINDI Fructus, Pulpa.

Habitat in regionibus fervidis *Arabia* & *utriusque India*.

Hospitatur in *Caldario*, arbor, †.

MELOTHRIA.

1. MELOTHRIA. *Hort. cliff.* 490. *descr.* *Gron. virg.* 10.
Bryonia candadensis, folio angulato, fructu nigro.
Tournef. inst. 102.

Cucumis minima, fructu ovali nigro lævi. *Sloan. flor.*
103. *hist.* 1. p. 227. t. 142. f. 1.

Cucumis parva repens virginiana, fructu minimo. *Pluk.*
alm. 123. t. 85. f. 5.

Habitat in in *Canada*, *Virginia*, *Jamaica*.

Hospitatur in *Caldario*, sæpe e parietibus pendula, annua luxurians.

CROCUS,

1. CROCUS floribus fructui impositis, tubo longissimo. *Roy. lugdb.* 41.

Crocus vernus latifolius flavus. *Baub. pin.* 66.

- β. Crocus vernus latifolius purpureo-violaceus. *Baub. pin.* 66.

- γ. Crocus autumnalis sativus. *Morif. hist.* 2. p. 335. f. 4.
t. 2. f. 1.

Crocus sativus. *Baub. pin.* 65.

Crocum. *Cam. epit.* 33.

Pharmac. CROCI BRITANNICI Pulvis, *Tinctura*, *Extractum*.

Svecis. Saffran.

Habitat in alpibus *Helvetiæ*, *Traciæ*, *Lusitaniæ*, *Pyrenæorum*.

Hospitatur *sub dio*, florens, Bulbosa.

Obs. Folia singulari modo linea membranacea longitudinaliter exarantur.

I X I A.

1. IXIA foliis ensiformibus, floribus remotis. — *Bermuch*
 Habitat in China — *na in dis folio majore, flore croceo elegantissime punctato*
 Hospitatur in Frigidario, Caldario, Tepidario, perennis. *Roloff. Krauss. 85.*
 Obs. Facies Ireos; Flores lutei, maculis fulvis; hanc debemus amicissimo
 D. Gmelino.

G L A D I O L U S.

1. GLADIOLUS foliis ensiformibus. *Hort. cliff. 20.*
 Gladiolus floribus unoversu dispositis. *Baub. pin. 41.*
Rudb. elys. 2. p. 16. f. 3.
 Gladiolus. *Riv. mon. 163.*
 Habitat in pratis Monspeli, Italiae, Tartariae.
 Hospitatur *sub dio*, bulbosa.

A N T H O L Y Z A.

1. ANTHOLYZA.
 Gladiolo aetiopico similis, planta angustifolia, caule
 hirsuto, flore rubicundissimo. *Comm. hort. 1. p. 81.*
t. 41. Rudb. elys. 2. p. 237. f. 15.
 Gladiolus floribus rictum referentibus coccineis, supre-
 ma lacinia erecta & fistulosa. *Breyn. ic. 21. t. 8.*
 Habitat in Aethiopia.
 Hospitatur in Tepidario, bulbosa.

I R I S.

1. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore multiflo-
 ro. *Hort. cliff. 18.*
 Iris vulgaris violacea s. purpurea hortensis & sylve-
 stris. *Baub. hist. 2. p. 708.*
 Iris hortensis latifolia. *Baub. pin. 31.*
Pharm. IRIS NOSTRATIS Radix, Faeculae.
 Habitat in clivosis Germaniae.
 Hospitatur *sub dio*, perennis.
 Obs. Germen teres, subrotundum.
2. IRIS collis barbatis, caule longitudine foliorum mul-
 tifloro. *Roy. lugdb. 17.*
 Iris corollis barbatis, foliis altitudine caulis multiflo-
 ri. *Hort. cliff. 19.*

Iris latifolia pannonica, colore multiplici. *Bauh. pin.* 31.

Iris lutea, foliis florum repandis variegatis. *Bauh. hist.* p. 720.

Habitat in *Hungaria*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

3. *IRIS* corollis barbatis, caule foliis brevioribus multifloro.

Iris corollis barbatis, foliis caulem multiflorum superantibus. *Hort. cliff.* 19.

Iris humilis major saturate purpurea biflora. *Tournef. inst.* 361.

Chamæiris major saturate purpurea. *Bauh. pin.* 33.

Chamæ-Iris latifolia biflora. *Best. eyst. vern.* 14.

Habitat in rupibus maritimis *Lusitaniæ*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

Obs. Bis in anno floret; Caulus communiter tres flores profert.

4. *IRIS* corollis imberbibus, fructu trigono, caule tereti foliis linearibus. *Hort. cliff.* 19. *Gmel. Sibir.* 1. p. 28. *Hall. helv.* 280.

Iris pratensis angustifolia non foetida altior. *Bauh. pin.* 32. *theatr.* 597.

Iris angustifolia 2. *Clus. hist.* 1. p. 227.

Habitat in pratis *Austriæ*, *Hungariæ*, *Sibiriciæ*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

5. *IRIS* corollis imberbibus, fructu sexangulari, caule tereti, foliis sublinearibus. *Hort. cliff.* 19.

Iris pratensis angustifolia, folio foetido. *Bauh. pin.* 32.

Iris angustifolia 1. *Clus. hist.* 1. p. 228.

Habitat in pratis *Germaniæ*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

6. *IRIS* corollis imberbibus, fructu hexagono, caule ancipiti, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 19.

Iris angustifolia prunum redolens minor. *Bauh. pin.* 33.

Iris angustifolia 6. *Clus. hist.* 1. p. 330.

Habitat ad radices montium *Viennæ*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

7. *IRIS* corollis imberbibus, foliis subulato canaliculatis caule brevioribus.

Iris foliis margine conniventibus, corollis imberbibus.
Hort. cliff. 20.

Iris bulbosa cæruleo-violacea. *Bauh. pin.* 40.

Xiphium cæruleo-violaceum. *Tournef. inst.* 364.

Habitat in *Hispania*.

Hospitatur *sub dio*, testa hyeme, bulbosa.

COMMELINA.

1. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis, caule procumbente glabro, petalis duobus majoribus. *Hort. cliff.* 21.

Commelina procumbens annua, saponariæ folio. *Dill. elth.* 93. *t.* 79. *f.* 89.

Ephemerum phalangoides dipetalon africanum annuum, flore dipetalo. *Morif. hist.* 3. *p.* 606. *f.* 25. *t.* 2. *f.* 3.

Habitat in agris humidis *Æthiopiæ*, *Brasiliæ*, *Jamaicæ*.

Hospitatur in *Caldario*, annua, luxurians; *sub dio* non florens.

2. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis, caule erecto scabro.

Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule erectiusculo scabro, petalis duobus majoribus. *Hort. cliff.* 495. *Gron. virg.* 11.

Commelina erecta, ampliore subcæruleo flore. *Dill. elth.* 94. *t.* 77. *f.* 88.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis.

Obs. Lana grisea ad vaginæ foliorum margines.

3. COMMELINA corollis æqualibus, foliis ovato lanceolatis subciliatis:

Commelina foliis ovato-lanceolatis, petalis tribus majoribus æqualibus. *Hort. cliff.* 21.

Commelina radice anacampserotidis. *Dill. elth.* 49. *t.* 79. *f.* 90.

Ephemerum phalangoides mexicanum surrectum, radice palmata. *Pluk. phyt.* 174. *f.* 4.

Habitat in *Mexico*.

Hospitatur in *Caldario*, perennis, fructificans.

C Y P E R U S,

1. CYPERUS ferotinus odoratus, radice longa, paniculis ex locustis latis ferrugineis compactis. *Mont. gram. 12. t. 1. f. 2.*

Gramen cyperoides aquaticum majus, panicula cyperi longi ex crassioribus glumis compacta, at brevioribus petiolis donata. *Triumf. obs. 64. Raj. suppl. 626. Mich. gen. 45. Scheuch. gram. 380.*

Habitat Bononiæ, Florentiæ in paludosis.

Hospitatur in Frigidario, perennis, nondum adulta.

D I G Y N I A.

S A C C H A R U M.

1. SACCHARUM. *Hort. cliff. 26.*

Arundo saccharifera. *Baub. pin. 18. Sloan. flor. 31. hist. 1. p. 108. t. 66. f. bona.*

Pharm. SACCHARUM varium, Syrupus.

Svecis Sacker-Rör.

Habitat in utraque India, locis per hyemem inundatis.

Hospitatur in Caldario, perennis, sterilis, sempervirens.

P H A L A R I S.

1. PHALARIS panicula subovata spiceformi, glumis carinatis.

Phalaris radice annua. *Hort. cliff. 23.*

Phalaris major, semine albo. *Baub. pin. 28. Scheuch. gram. 52. Cam. epit. 661.*

Pharm. CANARIENSE Semen.

Svecis Canarie-Frö.

Habitat in Hetruria, Hispania, Narbona, Fortunatis.

Hospitatur sub dio, annua.

P A N I C U M.

1. PANICUM spica composita, aristis flosculo brevioribus. *Vir. cliff. 7.*

Panicum italicum s. panicula majore. *Baub. pin. 27. theatr. 519.*

Panicum vulgare. *Clus. hist.* 2. p. 215.

Habitat in *utraque India.*

Hospitatur *sub dio*, annuum.

2. **PANICUM** panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus. *Hort. cliff.* 27.

Milium semine luteo & albo. *Bauh. pin.* 26. *theatr.* 502.

Milium nostras. *Dalech. hist.* 409.

Svecis Hirs.

Habitat in *India.*

Hospitatur *sub dio*, annuum, sæpius maturans semina.

M E L I C A,

1. **MELICA** petalis imberbibus, panicula ramosissima. *Melica flosculis glabris: summo urceolari.* *Gmel. sibir.*

1. p. 98. t. 20.

Gramen avenaceum, panicula heteromalla, locustis amplissimis. *Amm. ruth.* 171. n. 246.

Habitat in *Sibiria.*

Hospitatur *sub dio*, perennis,

L A G U R U S.

1. **LAGURUS** spica ovata. *Hort. cliff.* 25.

Alopecurus. *Dod. pempt.* 541.

Gramen alopecuroides, spica rotundiore. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 56.

Habitat in *Helvetia, Italia, Gallia, Sicilia.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

B R I Z A.

1. **BRIZA** spiculis ovatis, flosculis septendecim.

Gramen tremulum maximum. *Bauh. pin.* 2. *theat.* 54. *prodr.* 5. t. 5. *Scheuch. gram.* 202.

Habitat in montibus *Italicæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua, †.

A V E N A.

1. **AVENA** calycibus dispermis, seminibus lævibus. *Hort. cliff.* 25.

α. *Avena nigra.* *Bauh. pin.* 23.

Avena. *Dod. pempt.*

β. *Avena vulgaris & alba.* *Bauh. pin.* 23, *theatr.* 469.

Svecis Hvithafra.

Pharmac. AVENA excorticata.

Suecis Hafre.

Habitat. - - -

Hospitatur ubique in *agris* pro *Equis*, annua.

TRITICUM.

1. TRITICUM radice annua, glumis ventricosus glabris imbricatis aristatis.

Triticum radice annua, spica glabra aristata. *Hort. cliff.* 24.

Triticum æstivum. *Bauh. pin.* 21.

Triticum trimestre. *Morif. hist.* 3. f. 8. t. 1. f. 10.

Suecis Sommar-hvete.

Habitat - - -

Hospitatur rarius in *agris*, annua aut biennis.

2. TRITICUM radice annua, glumis ventricosus lævibus imbricatis submuticis.

Triticum radice annua, spica mutica. *Hort. cliff.* 24.

Triticum hybernum aristis carens. *Bauh. pin.* 21. *theatr.*

352.

Siligo spica mutica. *Lob. hist.* 14.

Pharmac. AMYLUM, *Pulvis cyprius.*

Suecis Winter-hwete.

Habitat - - -

Hospitatur in *Agri* biennis.

3. TRITICUM radice annua, glumis ventricosus villosis imbricatis obtusis.

Triticum radice annua, glumis villosis. *Hort. cliff.* 24.

Triticum spica villosa quadrata brevior & turgidior.

Morif. hist. 3. p. 176. f. 8. t. 1. f. 14.

Suecis Kubb-hwete.

Habitat - - -

Hospitatur rarius in *agris* per se, sed sæpius præcedenti mixtum occurrit, biennis.

4. TRITICUM calycibus truncatis quadrifloris, flosculis aristatis hermaphroditis: intermedio neutro.

Zea dicoccos vel *Zea* major. *Bauh. pin.* 22. *theatr.* 412.

t. 413.

Zea f. *Spelta*. *Bauh. hist.* 2. p. 412. *Raj. hist.* 1242.

Suecis Spelt.

Habitat - - -

Hospitatur *sub dio*, biennis.

Obs. *Glumas non facile deponit.*

SECALE.

1. SECALE *glumarum ciliis scabris.*

α. Secale hybernum vel majus. Bauh. pin. 22. theatr. 425.

Rogga f. Secale. Dod. pempt. 499.

Svecis Winter-Råg.

β. Secale vernum f. minus. Bauh. pin. 23.

Svecis Wår-Råg.

Habitat - - -

Hospitatur *et in agris Sveciæ, Scantiæ*, biennis; *β. vero in Gøthiæ* plerisque agris, annua.

ELYMUS.

1. ELYMUS *aristis spicula longioribus.*

*Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, involu-
cris flosculos crassitie & longitudine superantibus.*

Gron. virg. 13.

Habitat in *Virginia.*

Hospitatur *sub dio*,

Obs. *Involucrum tetraphyllum f. duo calyces eidem spicæ denticulo, juxta se
invicem, impositi.*

2. ELYMUS *spica flacido-pendula.*

*Triticum radice perenni, spiculis binis longissime aris-
tatis. Gmel. sibir. 1. p. 123. t. 28.*

Habitat in *Sibiria.*

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Deser. *Radix minus repens, Culmus bipedalis. Folia arundinacea, viri-
dia, sed molliora, utrinque retrorsum scabra. Spica Spithamæa, sed cul-
mo inter spiculas compresso, & fere membranaceo, hinc erecta stare nequit,
sed laxa nutat. Spicæ structura convenit cum SECALE spiculis geminatis.
Fl. Sv. 106. quod singulo denti culmi spiculas duas juxta se invicem positas
gerit, quarum calyx singulus constat foliolis duobus spicula brevioribus arista-
tis, adeoque singulo denticulo culmi, quatuor foliola calycina insident. Spi-
culæ aristatæ calyce longiores sunt. Facies TRITICI radice repente. Fl. Sv.
105.*

Obs. *Elymus gaudet calyce tetraphyllo, qui continet duas spiculas, juxta
se impositas eidem denticulo spicæ; in Hordeo calycis gluma hexaphylla
est, & tres flosculos continet; in Secale vero diphylla est.*

HORDEUM

1. HORDEUM *flosculis omnibus hermaphroditis, se-
minibus corticatis.*

Hor-

Hordeum polyftichum venum. *Bauh. pin. 22. theatr.*
439.

Hordeum. *Dod. pempt. 501.*

Pharm. CEREVISIA (Pryffing) dantiscana.

Svecis Korn. Gothis Biugg.

Habitat - - -

Hospitatur ubique in *agris*, annuum.

2. HORDEUM flosculis omnibus hermaphroditis, feminibus decorticatis.

Svecis Himmels - korn.

Habitat - - -

Hospitatur rarius in *Agriis*, annuum.

3. HORDEUM flosculis omnibus hermaphroditis, feminibus sexfariam æqualiter positis.

Svecis Kågel - korn.

Habitat - - -

Hospitatur *sub dio*, annuum, minus frequens.

4. HORDEUM flosculis lateralibus masculis muticis; angularibus imbricatis. /ic

Hordeum distichum. *Bauh. pin. 23. theatr. 440. Dod. pempt. 501.*

Svecis Gumring, Gumrik.

Habitat - - -

Hospitatur præsertim in *Oelandiæ & Gottlandiæ agris*, annuum.

5. HORDEUM flosculis lateralibus masculis muticis, angularibus horizontalibus.

Hordeum distichum, spica brevior & latior, granis confertis. *Raj. hist. 1243.*

Zeocryton f. Oryza germanica. Bauh. pin. 22.

Svecis Skyffel - korn.

Habitat - - -

Hospitatur *sub dio*, annuum, rarius.

TRIGYNIA

ALSINE.

1. ALSINE foliis subcordatis, stipulis utrinque quaternis.

Alfine americana, nummulariæ folio. *Herm. parad.* II.
t. II. *Pluk. alm.* 21. t. 75. f. 7? *Raj. app.* 499.

Habitat in Jamaica, Surinama, Noveboraco.

Hospitatur in tepidario, annua, repens, †.

MOLLUGO.

- I. MOLLUGO foliis verticillatis cuneiformibus acutis, caule subdiviso decumbente, pedunculis unifloris. Mollugo foliis sæpius septenis lanceolatis. *Gron. virg* 14. Alfine - spergulariana, latiori folio, floribus ad nodos pediculis curtis circa caulem insidentibus, calycibus eleganter punctatis. *Pluk. mant.* 9. t. 332. f. 5.

Habitat in Virginia & Terra Mariana.

Hospitatur in caldario, annua.

Descr. Radix annua. Caulis multiplex, dichotomus terræ appressus, articulatus: articulis teretibus substriatis, nudis basi nodosis & crassis, incarnatisque. Folia adgenicula quinque (interdum septem) lanceolata, superne latiora seu cuneiformia, acuminata, in petiolos desinentia integerrima, glabra, subramosa, longitudinaliter excavata, verticillatim posita. Pedunculi quinque vel septem, capillares, folio breviores, nudi, simplicissimi, uniflori. Calyces oblongi, pentaphylli, externe virides, interne albi, persistentes, glabri. Stamina tria & Pistilla tria alba. Capsula trivalvis, Semina rufa, striata.

TILLEA.

- I. TILLEA erecta.

Sedum anuum minimum stellatum rubrum. *Magn. monsp.* 228. t. 229.

Habitat Monspeliæ inter muscos in luco Gramuntii.

Hospitatur in apricario, annua †.

Descr. Planta minima, erecta, annua. Rami pauci, erecti, sensili. Folia ovata, oblongo-teretia, apice hemisphærico, basi soluta versatilia, alterna. Flores ex alis foliorum solitarii, sessiles, adeoque minime corymbosi. Calyx quadrifidus, Petala quatuor, Cranius 3. f. 5. 9. minima, exalbida. Pistilla totidem patentia, rubra. Stamina - - - Hinc inter Tilleam, Crassulam & Sedum quasi intermedia.



CLASIS. IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

CEPHALANTHUS.

. CEPHALANTHUS foliis oppositis ternatisque.

Gron. virg. 15.

Cephalanthus foliis ternis. *Hort. cliff.* 73.

Platanocephalus tini foliis ex adverso ternis. *Vaill. act.* 1722. p. 259.

Scabiosa dendroides americana, ternis foliis circa caulem ambientibus, floribus ochroleucis. *Pluk. alm.* 336. t. 77. f. 4.

Valerianoides americana, flore globoso, pisaminis folio. *Pet. cent.* 28. n. 293.

Habitat in *america septentrionali.*

Hospitatur in *Hybernaculo vario*, arbor.

DIPSACUS.

. DIPSACUS foliis connato-perfoliatis.

Dipsacus capitulis florum conicis. *Hort. cliff.* 29.

Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major. *Bauh. pin.* 385.

Dipsacus sylvestris. *Dod. pempt.* 735.

. Dipsacus sativus. *Bauh. pin.* 385. *Dod. pempt.* 735.

. Dipsacus folio laciniato. *Bauh. pin.* 385. *Moris. hist.* 3. p. 158. f. 7. t. 36. f. 4.

Dipsacus sylvestris, laciniato folio. *Bauh. hist.* 3. p. 75. *Svecis* Kardor.

Habitat in *Anglia, Gallia, Italia*, at *Y* in *Alsatia* & circa *Azow*.

Hospitatur *sub dio*, biennis, cicur

Obs. *Varietas Y* convenit in omnibus fructificationis partibus cum hac specie
et *B* exceptis foliorum basibus coadunatis seu perfoliatis, adeoque specie non
distingvo, licet *varietas insignis.*

. DIPSACUS foliis petiolatis appendiculatis.

Dipsacus capitulis florum subglobosis. *Hort. cliff.* 30.

Dipsacus sylvestris, capitulo minore s. *Virga pastoris* minor. *Baub. pin.* 385.

Dipsacus tertius. *Dod. pempt.* 735.

Succisa hirsuta, *lapathi folio*, flore albo. *Vaill. æt.* 1722. p. 238.

Habitat in *Anglia*, *Gallia*.

Hospitatur *sub dio*, biennis.

SCABIOSA.

1. *SCABIOSA* corollulis quadrifidis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ferratis. *Hort. cliff.* 30.

Scabiosa alpina, foliis *centaurii majoris*. *Baub. pin.* 270.

Scabiosa alpina centauroides. *Best. eyf. æst.* 122.

Succisa foliis pinnatis: pinnis ferratis, capitulis hispidis congestis. *Hall. helv.* 672.

Habitat in *Alpibus Helveticis*, *Italicis*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

2. *SCABIOSA* corollulis quadrifidis calyce brevioribus, foliis radicalibus lyratis, caulinis pinnatis. *Roy. lugdb.* 189.

Scabiosa altissima annua, foliis *agrimoniæ* nonnihil similibus. *Herm. lugdb.* 539. *Moris. hist.* 3. p. 46. f. 6. t. 13. f. 13.

Habitat in *Transylvania Hungariæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua, vix semina maturans †.

Descr. Folia fere antecedentis, sed minora. Caulis humanæ altitudinis, angustissimus: Folia radicum pinnatifida, laciniis extrorsum obtuse serrata; Folia superiora pinnata impari lanceolato, integerrimo, lateralibus linearibus. Capitula parva paleis rigidis mucronatis; flosculi parvi, pallidi, antheris cæruleis.

3. *SCABIOSA* corollulis quinquefidis, foliis dissectis, receptaculis florum subulatis. *Hort. cliff.* 31.

Scabiosa peregrina rubra, capite oblongo. *Baub. pin.* 270.

Scabiosa 6. *indica*. *Clus. hist.* 2. p. 3.

Habitat in *Indiis*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

4. *SCABIOSA* corollulis quinquefidis, foliis dissectis, receptaculis florum subrotundis. *Hort. cliff.* 31.

Scabiosa stellata, folio laciniato, major. *Baub. pin.* 271.

Scabio-

Scabiosa major hispanica. *Clus. hist. 2. p. 1.*

Habitat in agro *Salmanticensi Hispaniæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. *pulchro gaudet fructu descripto in Hort. Cliffort.*

K N A U T I A,

KNANUTIA. *Hort. cliff. 32.*

Lychni-scabiosa, flore rubro, annua. *Boerb. lugdb.*

I. p. 131.

Scabiosa orientalis, caryophylli flore. *Vaill. aët. 1722.*

p. 241.

Habitat in *Oriente.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

A S P E R U L A.

ASPERULA foliis senis, floribus sessilibus. *Hort. cliff. 33.*

Asperula cærulea. *Dod. pempt. 355.*

Asperula cærulea arvensis. *Bauh. pin. 355.*

Habitat in agris *Galliæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

C R U C I A N E L L A.

CRUCIANELLA erecta, foliis senis.

Crucianella foliis linearibus. *Hort. cliff. 32.*

Rubeola angustiore folio. *Tournef. inst. 140.*

Rubia angustifolia spicata. *Bauh. pin. 334. prodr. 145.*

Habitat *Monspelii.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. *Caulis erectus, tetragonus. Folia sex s. quinque, erecta, linearia, acuta.*

CRUCIANELLA procumbens, foliis quaternis.

Crucianella foliis lanceolatis. *Hort. cliff. 33.*

Rubeola latiore folio. *Tournef. inst. 130.*

Rubia latifolia spicata. *Bauh. pin. 334.*

Rubia spicata cretica. *Clus. hist. 2. p. 177.*

Habitat *Monspelii & in Creta.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. *Caulis diffusus, obsolete quadrangulus. Folia quaterna, patentia, lanceolata.*

G A L I U M.

GALIUM foliis pluribus linearibus, pedunculis dichotomis, summo caule floriferis. *Roy. lugdb. 156.*

Ga-

Galium saxatile, glauco folio. *Bocc. mus.* 2. p. 172.
t. 116.

Habitat in *Tartariæ* deserto nagaico.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

2. **GALIUM** foliis senis cuneiformi-lanceolatis mucronatis glabris.

Habitat : - -

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Deser. CAULES plurimi adscendentes, quadranguli, glabri, lateribus sulco exarati, longitudine digiti. Folia sex, verticillata, linearia, sursum latiuscula, convexa, spinula inermi terminata, glabra, nitida. Flores in racemum coarctatum, minimum degeti. Corollæ flavæ, antheris fulvis, stylo pallidior, duplici stigmate capitato. Pericarpia didyma, glabra, nitida, supra rufescentia, carnosæ, magna.

A P A R I N E,

1. **APARINE** foliis senis lanceolatis retrorsum aculeatis, fructu glabro.

Aparine foliis crebrioribus & semine læviore. *Morist. hist.* 3. p. 332.

Aparine semine lævicre. *Raj. hist.* 484. *syn.* 3. p. 225.

Aparine lævis. *Park. theatr.* 567.

Habitat in agris & cultis *Europææ*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. Caules diffusi, similes Aparine vulgari, sed minores. Folia ad verticillos sex, lanceolata, retrorsum aculeata tam superficie, quam angulis; non vero octo folia ut in vulgari; Semina glabra sunt, per maturitatem vix rugosa.

R U B I A,

1. **RUBIA** foliis senis. *Hort. cliff.* 35.

Rubia tinctorum sativa. *Bauh. pin.* 33.

Rubia. *Dod. pempt.* 532.

Pharm. RUBIÆ TINCTORUM Radix, *Tinctura*.

Svecis Krapp.

Habitat *Monspeli* & in pratis *Danubii*.

Hospitatur *sub dio* & in *Frigidario*.

P L A N T A G O.

1. **PLANTAGO** caule ramoso, foliis dentatis, spicis nudis.

Psyllium dioscoridis vel indicum, foliis crenatis. *Bauh. pin.* 191.

Pharm.

*Pharm. PSYLLII Semina, Mucilago.*Habitat ut fertur in *India*.Hospitatur *sub dio*, annua.

Descr. Caules erecto-diffusi, vestiti pilis brevissimis, confertis, pellucidis, gluten secernentibus. Folia linearia, versus apicem dentata, revoluta, inferiora opposita, superiora terna. Pedunculi ex alis, SPICA subovata, non cincta foliis longioribus sed nuda; flores destituti bracteis linearibus.

PLANTAGO caule ramoso, foliis integerrimis, spicis foliosis.

Plantago annua, foliis integerrimis, caule ramoso erecto. *Hort. cliff.* 37.

Psyllium majus erectum.

Habitat in sepibus *Italiae & Gallo-provinciae*.Hospitatur *sub dio*, annua.

Descr. Caules erecti, vestiti pilis inaequalibus, albis, sparsis, nec gluten secernentibus. Folia linearia, minime dentata, basi lanata, superiora terna, Pedunculi ex alis spica subovata, basi cincta foliis quatuor spica longioribus inaequalibus. Flores destituti bracteis ovatis.

PLANTAGO foliis ovatis glabris. *Fl. Svec.* 122.

Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spicam dispositis. *Bauh. pin.* 189.

Plantago rosea. *Bauh. hist.* 3. p. 503.

Habitat in *Europa* passim.Hospitatur *sub dio*, biennis saepius.

Obs. Varietas haec gerit bracteas spicae in folia enatas, unde spica foliosa evadit.

E P I M E D I U M

EPIMEDIUM. *Hort. cliff.* 37. *Dod. pempt.* 599. *Lob. hist.* 176.

Habitat in *Alpibus Euganeis, Ligurinis, Pontebæ*, locis humentibus, umbrosis,Hospitatur *sub dio*, perennis, florens.

C O R N U S.

CORNUS umbellis involucrum æquantibus. *Hort. cliff.* 38.

Cornus hortensis mas. *Bauh. p.* 441.

Cornus. *Clus. hist.* 1. p. 12.

Habitat in *Misnia, Austria*.Hospitatur in *Frigidario*, arbor.

CORNUS involucrio maximo: foliolis obverse cordatis. *Hort. cliff.* 38. *Gron. virg.* 17.

Cornus mas virginiana, flosculis in corymbum digestis,
a pe-

a periantho tetrapetalo albo radiatim cinctis. *Pluk. alm. 20. Catesb. carol. 1. p. 27. t. 27.*

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Tepidario*, arbor.

EVONYMUS.

1. EVONYMUS foliis lato-lanceolatis ferratis.

Evonymus foliis lanceolatis. Gron. virg. 17.

Evonymus virginianus, pyracanthæ foliis, capsula veruccarum instar exasperata rubente. *Pluk. alm.*

139. t. 115. f. 5.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Frigidario*, arbor †.

Obs. Huic Calyx, corolla, Stamina, loculamenta fructus, quinquepartita in omnibus floribus.

PTELEA.

1. PTELEA. *Hort. cliff. 36. Gron. virg. 138.*

Frutex virgianus trifolius, ulmi samaris, bannisterii

Pluk. alm. 159. Dill. elth. 147. t. 122. f. 148.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Tepidario*, arbor.

LUDWIGIA.

1. LUDWIGIA capsulis cubicis apice perforatis.

Lyfimachia non papposa, flore luteo majore, filiqua caryophylloide minore, ex virginia. Pluk. alm. 235.

t. 203. f. 2.

Habitat in aquosis *Virginiæ*.

Hospitatur in *Tepidario* perennis †

Descr. Planta pedalis, facie *Jussieæ octandra*. Caulis erectus, ramosus. Folia alterna, lanceolata, integerrima. Flores laterales, solitarii, calyx clausus, primum lateribus modo dehiscens, dein apertus, maximus, deciduus. Perala ovata, longitudine calycis, lutea, intra calycem. Stamina quatuor parva. Pistillum unicum, capitatum. Germinum tetragonum, angulis membranaceis. Capsula calyce brevior, glabra, cubica, ore perforato. Pedunculi breves, acuti, foliis duobus oppositis.

AMMANNIA.

1. AMMANNIA foliis semiamplexicaulibus. *Hort. cliff. 344.*

Aparines folio anomala, vasculo seminali rotundo, semina minutissima continente. Sloan. flor. 50. hist. 1.

p. 44. t. 7. f. 4. Raj. suppl. 164.

Habitat

Habitat in locis humentibus *Caribæarum*.
Hospitatur in *Caldario*, annua.

E L Æ A G N U S.

ELÆAGNUS foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 250.

Elæagnus. *Hort. cliff.* 38. *Cam. epit.* 106.

Olea sylvestris, folio molli incano. *Baub. pin.* 473.

Ziziphus cappadocica. *Dod. pempt.* 807.

Habitat in *Bohemia*, *Hispania*, *Syria*, *Cappadocia*.

Hospitatur in *Frigidario*, arbor. †

R I V I N A.

RIVINA. *Hort. cliff.* 35.

Solanoides americana, circææ foliis canescentibus.
Tournef. act. 1706.

Solanum barbadense racemosum minus tinctorium, circææ foliis mollibus & incanis. *Pluk. alm.* 112. t. 112. f. 2.

Amaranthus baccifer, circææ foliis. *Comm. hort.* 1. p. 127. t. 66. bona.

Habitat in insulis *Barbados*, *Jamaica*, *Caribæarum*.

Hospitatur in *Caldario*, arbor, luxurians, sempervirens.

D I G Y N I A.

H Y P E C O U M.

HYPECOUM filiquis arcuatis compressis articulatis.

Hypocoum filiquis erectis articulatis incurvis. *Morif. hist.* 2. p. 279.

Hypocoum. *Baub. pin.* 172. *Dod. pempt.* 449. *Hort. cliff.* 38.

Habitat inter segetes *Narbonenses* & *Salmanticenses*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. Planta terræ incumbit, nec erecta est. Siliquæ inflectuntur, nec reflectuntur. Siliqua dehiscit articulatim, nec in binas valvulas.

HYPECOUM filiquis pendulis teretibus æqualibus.

Hypocoum alterum. *Raj. hist.* 1328.

Hypocoum tenuiore folio. *Tournef. inst.* 230.

Hype-

Hypecoum filiquis pendentibus non articulatis bivalvibus incurvis. *Morif. hist. 2. p. 280.*

Cuminum sylvestre filiquatum ponæ. *Dalech. hist. 698.*

Cuminum alterum dioscoridis sylvestre filiquosum.

Lob. ic. 743.

Habitat non procul *Aquis sextis.*

Hospitatur sub dio annua.

Obs. Planta erecta. Siliquæ rectæ; deorsum omnino pendulæ, pedunculo rigido affixæ, longitudinaliter bivalves, non articulatae.

3. HYPECOUM filiquis erectis teretibus torulosis.

Hypecoum tenuifolium, filiquis erectis teretibus.

Amm. ruth. 58. t. 9.

Habitat in *Dauria.*

Hospitatur sub dio, annua, †

Obs. Flos quadruplo major, quam in reliquis. Siliquæ bivalves, erectæ, torulis nodosæ, neque pendulæ, neque incurvæ.

TRIGYNIA.

I L E X.

1. ILEX foliis ovatis acutis spinosis. *Hort. cliff. 40.*

Ilex aculeata baccifera, folio sinuato. *Bauh. pin. 425.*

Aquifolium f. *Agrifolium.* *Lob. hist. 582.*

Habitat in umbrosis *Germaniæ, Galliæ, Angliæ.*

Hospitatur in *Frigidario*, arbor, sempervirens.



CLASSIS. V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

HELIOTROPIUM.

HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis tomentosis rugosis.

Heliotropium foliis ovatis integerrimis, spicis conjunctis. *Hort. cliff.* 45.

Heliotropium majus dioscoridis. *Baub. pin.* 253.

Heliotropium *Dod. pempt.* 70.

Habitat ad agrorum limites in Gallo-provincia, Italia, Sicilia, Madera.

Hospitatur sub dio, annua; in Caldario luxurians.

HELIOTROPIUM foliis lanceolato-linearibus glabris aveniis. *Hort. cliff.* 45.

Heliotropium indicum procumbens glaucophyllum, floribus albis. *Pluk. alm.* 182. t. 36. f. 3.

Heliotropium maritimum minus, folio glauco, flore albo. *Sloan. flor.* 94. *hist.* 1. p. 213. t. 132. f. 3.

Heliotropium curassavicum, foliis lini umbilicati. *Morif. hist.* 3. p. 452. f. 14. t. 31. f. 12.

Habitat in paludosis maritimis Jamaica, Mexica, Curassavia.

Hospitatur in Caldario, annua, †.

CYNOGLOSSUM.

CYNOGLOSSUM staminibus corollam æquantibus.

Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum.

Col. ecphr. 1. p. 168. t. 170.

Habitat in Italia.

Hospitatur sub dio, biennis.

Desc. Radix biennis, altero anno proferens caulem floribus ovisum et clavatum. Calyces longitudine fere corollæ, stamina corollæ longitudine vel paulo longiora, cum in reliquis intra faucem occultentur. Facies propria plantæ florentis & fructificantis vulgaris cynoglossi; non tamen varietas, sed distincta species est.

CYNOGLOSSUM foliis lineari-lanceolatis glabris. *Hort. cliff.* 47.

Cynoglossum minus album, lini foliis glaucis, semine umbilicato. *Morif. hist. 3. p. 449. f. 11. t. 30. f. 11.*

Linum umbilicatum. *Park. theatr. 1687.*

Omphalodes lusitanica, lini foliis. *Tournef. inst. 40.*

Habitat in *Lusitania.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

B O R R A G O.

1. BORRAGO foliis omnibus alternis, calycibus patentibus.

Borrigo calycibus patentibus. *Hort. cliff. 44.*

Borrigo floribus cæruleis. *Tournef. inst. 133.*

Buglossum latifolium, Borrigo. *Bauh. pin. 256.*

- β. Borrigo floribus albis. *Tournef. inst. 133.*

Pharmac. BORRAGINIS Herba, Syrupus, Aqua, Flores, Conserva.

Svecis Stoffer-blomma.

Habitat nunc passim per *Europam*, seminibus ex australibus terris delatis.
Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

2. BORRAGO foliis ramificationum oppositis, calycis foliolis sagittatis.

Borrigo calycinis foliis sagittatis erectis. *Hort. cliff. 45. Fl. zeyl. 71.*

Borriginoides angustifolia, flore pallescente cæruleo. *Boerb. lugdb. 1. p. 188. t. 188.*

Cynoglossoides folio caulem amplexante. *Isnard. act. 1718. p. 325. t. 10.*

Habitat in *Zeylona.*

Hospitatur in *Vaporario*, annua.

Obs. Folia opposita ad ramificationes caulis, alterna vero ubi flores absque ramis.

L Y C O P S I S.

1. LYCOPSIS foliis repandis dentatis callosis, caule decumbente, corollis cernuis.

Lycopsis foliis repando-dentatis. *Hort. cliff. 44.*

Buglossum creticum verrucosum. *Stiff. bot. 57. t. 57.*

Buglossum creticum, cauliculis procumbentibus, flore variegato odorato, echii foliis verrucosis. *Herm. lugdb. 98.*

Buglos-

Buglossum annuum humile, bullatis foliis, flore cæ-
rulco eleganter variegato. *Morif. hist. 3. p. 439. f. 11.*
t. 26. f. 10.

Habitat in Creta e rimis muris Candie urbis, et in Monte Hymetto prope
Athenas.

Hospitatur in Frigidario, annua.

2. LYCOPSIS foliis integerrimis, calycibus fructuum
inflatis pendulis. *Hort. cliff. 44.*

Echioides flore pullo. *Riv. mon. 11.*

Buglossum procumbens annuum, pullo minimo flore,
Morif. hist. 3. p. 439. f. 11. t. 96. f. 11.

Habitat in Hungaria.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Pedunculi non ex alis, sed supra alas exeunt et caule, quod non modo huic,
sed et reliquis asperifoliis commune.

ECHIUM.

1. ECHIUM corollis vix calycem excedentibus: mar-
gine villosis.

Echium majus & asperius flore albo. *Bauh. pin. 254.*
Raj. hist. 498.

Echium flore albo. *Cam. epit. 738.*

Echi altera species. *Dod. pempt. 631.*

Lycopsis. *Bauh. pin. 255.*

Habitat in Anglia, Italia.

Hospitatur in Frigidario, biennis.

Obs. Differt ab Echio vulgari Fl. sec. 158. foliis pallidioribus, angustioribus, læ-
vioribus; racemis minoribus; corollis cinereis s. cæruleo-exalbidis vix ca-
lyce longioribus.

2. ECHIUM calycibus fructiferis distantibus.

Echium caule simplici, foliis caulinis linearibus, flo-
ribus spicatis ex alis. *Hort. cliff. 43.*

Echium creticum angustifolium & latifolium rubrum.
Bauh. pin. 254.

Echium rubro flore. *Raj. hist. 499.*

Habitat in Syria, unde semina habui.

Hospitatur sub dio, annua; †.

Obs. Differt caule magis ramoso; magis folioso; foliis magis ovatis, corollis
maximis rubris.

CERINTHE.

1. CERINTHE foliis cordatis sessilibus *Hort.*
cliff. 48.

Cerithe flore ex rubro purpurascete. *Bauh. pin.* 258.

Cerithe quorundam major, flore ex rubro purpurascete. *Bauh. hist.* 3. p. 603. *Clus. hist.* 168.

β. Cerithe, flavo flore, asperior. *Bauh. pin.* 258.

Cerithe quorundam major, flavo flore. *Clus. hist.* 2, p. 167.

Habitat in Europa australi.

Hospitatur sub dio, annua, cicur.

M E S S E R S M I D I A.

I. MESSERSMIDIA.

Argusia montana. Amm. ruth. 38.

Habitat in aridis apricis glareosis Dauriae ad Argun.

Hospitatur sub dio, et in Frigidario, difficilis.

Descr. Caules pedales, superne ramosi, subpilosi. Folia lanceolata, integra. Pedunculi ex alis, ad summitates caulis corymbosi, longitudine foliorum. Calyces hirsuti. Utrum haec Cerinthes species sit nec non, de planta adhuc non florente determinare difficile; hinc genus dubium propono.

A N D R O S A C E.

I. ANDROSACE perianthiis maximis.

Androsace vulgaris latifolio annua. *Tournef. inst.* 123.

Androsace altera matthioli. *Clus. hist.* 2. p. 134.

Androsace altera. *Cam. epit.* 639.

Habitat inter segetes Wiennae.

Hospitatur sub dio, annua, †.

P R I M U L A.

I. PRIMULA foliis ferratis glabris. *Virid. cliff.* 12.

Primula foliis ferratis carnosis glabris. *Hort. cliff.* 50.

Auricula urfi: species 1-5. *Clus. hist.* 1. p. 302.

Auricula urfi: species 1-16. *Tournef. inst.* 121.

Sanicula alpina: sp. 1-6. *Bauh. pin.* 242.

Habitat in alpibus, Helveticis, Austriacis.

Hospitatur sub dio, perennis, florens, sempervirens.

Obs. Varietates hujus speciei sunt sequentes:

α planta glabra, viridis, corollarum laciniis bifidis, limbo erecto, purpureo, fauce flava.

β planta subfarinacea, corollarum laciniis emarginatis, limbo plano rubro, fauce flava.

γ planta farinacea, corollarum laciniis integris, limbo erecto rubro, fauce pallida.

δ planta farinacea, corollarum laciniis repandis, limbo patente atro-purpureo, fauce alba, medio lutea.

* PRI-

PRIMULA foliis denticulatis rugosis. *Fl. Svec.* 161.
 3. Primula veris prolifera, flore purpureo. *Tournef. inst.*
 125.

Primula veris, pallido flore, elatior. *Clus. hist.* 1. p. 301.
 Verbasculum pratense, vel sylvaticum inodorum.
Baub. pin. 241.

Habitat β in oriente, γ passim per Europam australiorem.

Hospitatur sub dio, perennis, florens.

Obi. Singularis est varietas β quæ calyce gaudet corolliformi.

LYSIMACHIA.

LYSIMACHIA foliis lanceolato-linearibus, spicis terminalibus. *Roy. lugdb.* 415.

Lyfimachia foliis lanceolato linearibus, caulem & ramos spica ovata terminante. *Hort. cliff.* 51.

Lyfimachia orientalis minor, foliis glaucis annu-entibus, flore purpureo. *Till. pis.* 106. t. 40. f. 2.

Lyfimachia orientalis angustifolia, flore purpureo.
Tournef. cor. 7. *Comm. rar.* 93. t. 33.

Lyfimachia spicata purpurea minor. *Buxb. cent.* 1. p. 22. t. 33.

Habitat in Oriente.

Hospitatur in Frigidario, biennis, \dagger .

Descr. Radix biennis. Caulis erectus. Folia glauca. Calyces atro-purpurei. Corollæ sanguineæ, erectæ, nec patulæ. Flores in spica sessiles, nec ut in Lyfimachia Ina *Hort. cliff.* pedunculati, cui alias simillima planta.

LYSIMACHIA calycibus corollam superantibus, caule-erecto ramosissimo. *Roy. lugdb.* 416.

Lyfimachia annua minima, polygoni folio. *Tournef. inst.* 142.

Passerina minor faxatilis, quibusdam Chamæ Linum stellatum. *Pluk. alm.* 281.

Linum minimum stellatum. *Baub. pin.* 214. *prodr.* 107.
Magn. monsp. 163. t. 162. *Raj. hist.* 1076.

Habitat Monspeli.

Hospitatur sub dio, annua.

Descr. Radix annua Caulis. digitalis longitudinis, erectus, tetragonus, lateribus oppositis concavis, Folia opposita, lanceolata aut ovato-oblonga, acuminata, integerrima, sessilia. Rami ex alis inferioribus. Pedunculi oppositi, folio breviores, solitarii. Calyx patens, corolla sextuplo longior, foliolis lanceolatis, acuminatis. Corolla minima, alba, quinquefida, rotundata,

ta. Stamina quinque. Pistillum unum. Capsula globosa, in pedunculo nutante, quinquevalvis, stylo mucronata. Hinc corollæ parvitas novum genus causaret, nisi ejusdem structura receptum agnosceret.

ANAGALLIS.

I. ANAGALLIS foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 52.

Anagallis cærulea, foliis binis ternisve ex adverso nascentibus. *Bauh. pin.* 252.

Anagallis tenuifolia monelli. *Clus. app. alt. fig.*

Habitatio incerta. *Johannes Monellus* 1662 Gadibus semina *Clusio* misit. Hospitatur in *Tepidario*, perennis.

PHLOX.

I. PHLOX foliis lineari-lanceolatis, caule recto, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 63. *Gran. virg.* 21.

Lychnidea folio melampyri. *Dill. elth.* 203. t. 166. f. 202.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis, †.

CONVOLVULUS.

I. CONVOLVULUS calycibus tuberculatis pilosis. *Virid. cliff.* 18. *Gran. virg.* 141.

Convolvulus annuus foliis cordatis rarius trilobis, calyce tuberculato piloso. *Hort. cliff.* 67.

α. *Convolvulus purpureus, folio subrotundo.* *Bauh. pin.* 295.

Campanula indica. *Bauh. hist.* 2. p. 165.

β. *Convolvulus cærulæus, hederaceo anguloso folio.* *Bauh. pin.* 295. *Dill. elth.* 96. t. 80. f. 91.

γ. *Convolvulus cæruleus, hederaceo folio magis anguloso.* *Dill. elth.* 96. t. 80. f. 92.

Habitat α in *Syria*. β in *Asia*, *Africa*, *America*, γ in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Caldario*; α sub dio, sed difficile maturatur, & primo gelu corrumpitur. β. γ. vero in *Caldaria*. annua.

2. CONVOLVULUS foliis lanceolato-ovatis nudis, caule recto, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 68,

Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo, Bauh. pin. 295. flore triplici colore insignito. *Moris. hist.* 2. p. 17. f. 1. t. 4. f. 4.

Habi-

Habitat in *Mauritania*, *Sicilia*, *Lusitania*; *Hispania*.
Hospitatur *sub idio*, annua.

I P O M O E A.

1. IPOMOEAE foliis cordatis acuminatis: basi angulatis, pedunculis multifloris.

Ipomoea foliis cordatis acuminatis subdentatis. *Hort. cliff.* 66.

Quamoclit americana, folio *hederæ*, flore coccineo.
Comm. rar. 21. t. 21.

Convolvulus coccineus, folio anguloso. *Plum. amer.* 89. t. 103.

Habitat in *Domingo*.

Hospitatur in *Vaporario*, annua, fructificans.

2. IPOMOEAE foliis pinnatifidis linearibus, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 60., *Fl. zeyl.* 77.

Convolvulus pennatus exoticus rarior. *Col. aquat.* 73. t. 72.

Jasminum millefolii folio. *Baub. pin.* 398.

Quamoclit f. *Jasminum* americanum. *Clus. posth.* 9.

Habitat in *India orientali*.

Hospitatur in *Vaporario*, annua, †

3. IPOMOEAE foliis palmatis: lobis septenis lanceolatis integerrimis.

Convolvulus major heptaphyllus, flore sulphureo odorato. *Sloan. flor.* 55. *hist.* 1. p. 152. t. 96. f. 2. *Raj. suppl.* 381.

Convolvulus americanus, *mandiuccæ* multifido folio, heptaphyllos, flore albo, fundo purpureo, radice tuberosa, cortice albo. *Pluk. alm.* 116. t. 276. f. 5.

Habitat in *Jamaica*.

Hospitatur in *Vaporario*, perennis, †.

Descr. Radix perennis. Caulis volubilis altissimus perennis. Folia glabra septifida; lobis distantibus, acuminatis; internodiis sensim longioribus. Flores non vidi.

4. IPOMOEAE foliis digitatis supra glabris, caule piloso. *Convolvulus* americanus pentaphyllus & hexaphyllus major. *Herm. lugdb.* 183. t. 185.

Habitat in *America meridionali*.

Hospitatur in *Caldario*, † flores non protulit.

P O L E M O N I U M.

1. POLEMONIUM calycibus lanatis.

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obl. *Facies Polemonii vulgaris, Fl. Suec. 175. ut facile pro sola varietate haberetur, sed Caulis minus angulatus, minusque ramosus, magis pubescens, Corollæ duplo majores, Calycēs lanati. Panicula minus expansa. Folia superiora longe minora.*

C A M P A N U L A.

1. CAMPANULA capsulis quinquelocularibus: tectis; calycis sinubus reflexis. *Virid. cliff. 16.*

Campanula calycibus a tergo lamellis quinque notatis. *Hort. cliff. 64.*

Campanula hortensis, folio & flore oblongo. *Bauh. pin. 94.*

Viola mariana. *Dod. pempt 163.*

Medium. *Cam. epit. 729.*

Habitat in saxosis opacis *Germaniæ et Italiæ.*

Hospitatur sub dio, biennis.

2. CAMPANULA foliis undatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata.

Campanula foliis radicalibus lanceolato-ovalibus. caule ramosissimo patulo. *Hort. cliff. 65.*

Rapunculus esculentus. *Bauh. pin. 92.*

Rapunculum. *Dod. pempt. 165.*

Habitat in *Anglia, Gallia, Helvetia.*

Hospitatur sub dio, biennis, cicur.

3. CAMPANULA caule simplici, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus, floribus sessilibus.

Campanula caule simplicissimo, foliis amplexicaulibus. *Hort. cliff. 65.*

Campanula pentagonia perfoliata. *Moris. hist. 2. p. 457. f. 5. t. 2. f. 23.*

Speculum veneris perfoliatum f. Viola pentagonia perfoliata. *Raj. hist. 743.*

Habitat in *Virginia.*

Hospitatur sub dio, annua, cicur.

Obl. Flores plerumque primi corollæ, staminibus, stylo, stigmate quo destituti, videntur fructus perficere et semina; reliqui et seriores flores corollæ et staminibus perfectis gaudent, uti idem in *Ruellia* videre est.

4. CAM-

4. CAMPANULA caule subdiviso, foliis oblongis crenatis, calycibus corolla longioribus, capsulis prismaticis.

Campanula caule ramoso, foliis ovato oblongis crenatis. *Hort. cliff.* 65.

Campanula calycibus corollam superantibus, capsulis columnaribus. *Vir. cliff.* 17.

Speculum veneris. *Raj. hist.* 742.

Habitat inter segetes Galliae, Germaniae, Italiae.

Hospitatur sub dio, annua.

5. CAMPANULA foliis lanceolatis, caulinis acute serratis, floribus paniculatis nutantibus.

Campanula urticae angustioribus foliis glabris rigidisque. *Amm. ruth.* 10. n. 15.

Campanula urticae foliis glabra, floribus minoribus pendulis. *Amm. ruth.* 11. n. 17.

Campanula rapunculi folio, flore pallide caerulefcente pendulo. *Gerb. tanais.* 69.

Habitat in campis feris Tawrow.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Singularis huic nota est, quod caulis antequam paniculam proferat, folia promat quasi in rosam disposita, more Lillii secundi β , cum primum prodeat; dein cum panicula excrescat, disperguntur haec folia per caulem.

TRACHELIUM.

6. TRACHELIUM.

Trachelium foliis ovatis serratis, caule umbella terminato. *Hort. cliff.* 66.

Rapunculus corniculatus valerianoides caeruleus. *Morif. hist.* 2. p. 465. f. 5. t. 5. f. 52.

Cervaria valerianoides caerulea. *Bauh. pin.* 95.

Habitat in Umbrosis Italiae.

Hospitatur in Tepidario, perennis.

COFFEA.

7. COFFEA. *Hort. cliff.* 59. descr.

Jasminum, arabicum, lauri folio, cujus semen apud nos Caffee dicitur. *Juss. act.* 1713. p. 388.

Evonymo similis aegyptiaca, fructu baccis lauri simili. *Bauh. pin.* 428.

Bon vel Ban. *Pluk. alm.* 69. t. 272. f. 1.

Bon. *Alp. ægypt.* 36.

Pharm. COFFÆE Semina, *ustulata.*

Svecis Coffe-træd.

Habitat in *Arabia felici.*

Hospitatur in *Caldario*, Arbor, sempervirens.

DIERVILLA.

1. DIERVILLA racemis terminalibus.

Diervilla. *Hort. cliff.* 63. t. 7. descr.

Diervilla acadensis fruticosa, flore luteo. *Tournef. act.*

1706. t. 7. f. 1.

Habitat in *America septentrionali*, in *Noveboraco*, *Acadia.*

Hospitatur in *Frigidario*, frutex fructificans.

SAMOLUS.

* SAMOLUS. *Fl. Svec.* 165.

β. Samolus africanus, folio rotundiore. *Walth. hort.* 162. t. 23.

Habitat in *Syria.*

Hospitatur sub dio, & in *Frigidario*, biennis.

Obs. Differt a nostrate, quod triplo major, & ramosior, foliisque instructa rotundioribus; esse tamen eandem plantam docent squamæ ad sinus limbi corollæ, et nota specialis pedunculi scilicet unifolii, seu unico minimo lanceolato foliolio instructi.

LONICERA.

1. LONICERA floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis connato-perfoliatis. *Hort. cliff.* 58.

Periclymenum perfoliatum. *Bauh. pin.* 302.

Caprifolium italicum. *Dod. pempt.* 411.

Habitat in *Gallia narborensi* & *Italia.*

Hospitatur in *Frigidario*, frutex, vere florens.

* LONICERA floribus capitatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Fl. Sv.* 191. *Hort. cliff.* 58.

β. *Caprifolium* germanicum, flore rubello, serotinum. *Tournef. inst.* 608. *Hort. angl.* t. 7.

Habitat forte in *Germania.*

Hospitatur in *Frigidario*, frutex, autumnino florens.

Descr. Caulis volubilis, purpureus, hyeme maxima parte marcescens. Folia opposita, non connata. Pedunculus subvillosus. Flores capitati, extus purpurei, intus albi, ad medium usque divisi in duo labia, quorum superius luteum quadrifidum, inferius lineare reflexum.

3. LONICERA pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis cordatis obtusis. Cha-

Chamaecerasus fructu gemino rubro, foliis glabris cordatis. Amm. ruth. 184.

Habitat circa *Samaram*, *Oropolim*, inque *Dauria*.

Hospitatur sub dio & in *Frigidario*, frutex.

Obs. Frutex non dum floruit. Folia cordata, subovata, obtusa, glabra, brevissimis petiolis. Pedunculi axillares, oppositi, solitarii, apice diphylli, foliolis lanceolatis. Germina duo, distincta.

MIRABILIS.

1. *MIRABILIS. Hort. cliff. 53.*

Solanum mexicanum, flore magno. *Baub. pin. 163.*

Admirabilis peruviana, rubro flore. *Clus. hist. 2. p. 87.*

3. *Jalappa* flore flavo. *Tournef. inst. 129.*

4. *Jalappa* flore exalbido. *Tournef. inst. 129.*

5. *Jalappa* flore expurpureo & luteo mixto. *Tournef. inst. 129.*

Pharm. JALAPÆ Radix, Resina, Extractum.

Habitat in utraque *India*.

Hospitatur sub dio, hyeme radix seposita, vel suspensa in *Caldario* aut *Tepidario*, vere lata reviviscit, alias annua.

PLUMBAGO.

1. *PLUMBAGO* foliis petiolatis. *Hort. cliff. 53. Fl. zeyl. 73.*

Dentellaria lychnoides sylvatica scandens, flore albo.

Sloan flor. 91. hist. 1. p. 211. t. 133. f. 1. Raj. app. 245.

Lychnis indica spicata, ocymastri foliis, fructibus lappaceis oblongis, radice urente. *Comm. hort. 2. p. 169. t. 85.*

Habitat in utraque *India*.

Hospitatur in *Caldario*, perennis, bis fructificans.

DATURA.

* *DATURA* pericarpiis spinosis erectis ovatis. *Fl. Svec. 185.*

3. *Solanum fativum*, pomo spinoso oblongo, flore albo. *Baub. pin. 168.*

Tatula. Cam. epit. 176.

Svecis. Spik-klubba.

Habitat in *America*, nunc per *Europam* frequens.

Hospitatur sub dio; in *Caldario* præstantior, annua.

Obs. Folia dentata, viridia, glabra. Flores albi semper. Fructus erecti, longius spinosi, calycis residuo quinque carinato.

2. DA-

2. **DATURA** pericarpis spinosis nutantibus globosis.
Hort. cliff. 55. Fl. zeyl. 86.
 Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore. *Baub. pin. 168.*
 Nux Metella. *Cam. epit. 175.*
 Hum matu. *Rhed. mal. 2. p. 47. t. 28.*
- β. **Stramonium** fructu spinoso rotundo, flore violaceo duplici triplicive. *Tournef. inst. 119.*
 Solanum foeditum, pomo spinoso rotundo, semine pallido. *Baub. pin. 168.*
- γ. **Stramonium ægyptiacum**, flore pleno: intus albo, foris violaceo. *Tournef. inst. 119.*
 Solanum ægyptiacum, flore pleno. *Baub. pin. 168.*
Pharm. DATURÆ Semina.
Svecis Ælskogs-willa.
 Habitat in India, Asia, Africa.
 Hospitatur in Caldario.
 Obs. Folia vix dentata, subtomentosa. Flores sæpe purpurascetes. Fructus nutantes, spinosi, spinis brevioribus subvillosis. Calycis residuo non angulato.

HYOSCYAMUS.

1. **HYOSCYAMUS** foliis lanceolatis subdentatis, calycibus spinosis.
 Hyoscyamus foliis lanceolatis. *Hort. cliff. 56.*
 Hyoscyamus pusillus aureus americanus, anthirrhini foliis glabris. *Pluk. alm. 188. t. 37. f. 5.*
 Habitat in Persia.
 Hospitatur sub dio, annua, †.
 Descr. Radix annua. Folia glabra, lanceolata, acute uno alterove utrinque notata. Flores ex alis nunc sessiles, nunc petiolati. Corollæ luteæ. Calyces fructus in spinas pungentes desinentes.
2. **HYOSCYAMUS** foliis ovatis integerrimis, calycibus inflatis subglobosis.
 Habitat in Sibiria.
 Hospitatur sub dio, perennis, †.
 Descr. Caulis ramosus. Folia ovata, glabra, alterna, in petiolos desinentia, acuta, integerrima. Calyces monophylli, tubulari, quinquesidi, erecti; Corolla infundibuliformis, quinquesida. Stamina quinque; pistillum obliquum. Maturo Fructu calyx inflatus, magnus, subrotundus in cujus fundo capsula subrotunda operculo tecta: adeoque facies Physalidis vulgaris omnino, sed capsula Hyoscyami. An oriuntur novæ plantæ ex diversa cõpula? an Hybridæ speciem propagant? Num hæc ex Physalide & Hyoscyamo? Datisca ex Cannabe et Reseda? Serus dies determinabit. Hæc conjungit Solana cum Hyoscyamis proximo genere.

N I C O T I A N A.

. NICOTIANA foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 56.

Nicotiana major latifolia. *Bauh. pin.* 169.

Blennochoes. *Renealm. spec.* 38. t. 37.

Pharm. TABACI Herba, Pulvis, Oleum, Extractum, Syrupus, Semina.

Svecis Tobak.

Habitat in America.

Hospitatur sub dio, & in Agric annua.

. NICOTIANA foliis ovatis. *Hort. cliff.* 57.

Nicotiana minor. *Bauh. pin.* 170.

Priapeja quibusdam. *Bauh. hist.* 3. p. 630.

Pachyphylla. *Renealm. spec.* 40.

Svecis Turkisk Tobak.

Habitat in America & nunc in variis Europa terris.

Hospitatur sub dio, annua, luxurians.

A T R O P A.

. ATROPA. *Hort. cliff.* 57.

Belladonna majoribus foliis & floribus. *Tournef. inst.* 77.

Solanum melano-Cerasus. *Bauh. pin.* 166.

Solanum majus. *Cam. epit.* 817.

Solanum lethale. *Clus. hist.* 2. p. 86.

Habitat in sylvis montosis Austriae, Angliae.

Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

V E R B A S C U M.

. VERBASCUM foliis cuneiformi-oblongis.

Verbascum mas, angustioribus foliis, floribus pallidis *Bauh. pin.* 239.

Verbascum pulverulentum, flore luteo parvo. *Bauh. hist.* 3. p. 812. *Raj. hist.* 1094. descr.

Verbascum lychnitis, flore albo parvo. *Bauh. pin.* 240.

Verbascum candidum femina. *Fuchs. hist.* 847.

Verbascum ramosum, floribus albis parvis. *Tournef. inst.* 147.

Blattaria flore albo, perperam Verbascum femina. *Lob. ic.* 511.

Verbascum ramosum perenne parisiensium. *Tournef. inst.* 147.

Phlo-

Phlomis mas alter. *Lob. ic.* 562.

- ♂. *Verbascum alpinum* perenne nigrum, flore albo, staminibus purpureis. *Tournef. inst.* 147.

Habitat in *Germania Anglia*, γ in *Gallia Italia*.

Hospitatur sub dio, biennis, cicur.

Obs. Variat β corollis albis, filamentis lana albis.

γ Corollis flavis, filamentis albis.

δ Corollis albidis, filamentis purpureis.

Convenit hæc cum *Verbasc.* *Fl. suec.* 187. at differt caule in hac paniculato, in illo magis simplici. Foliis in hac lanceolatis, inferioribus in petiolos definentibus, in illo inferioribus cordato-oblongis petiolatis. Conveniunt pedunculis confertis simplicibus ad dentes racemi.

Varietas δ videtur hybrida e *Verbasc.* *Fl. Suec.* 187. et ex hac.

2. **VERBASCUM** foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis.

Verbascum annuum, foliis oblongis sinuatis obtusiss glabris. *Hort. cliff.* 55.

Blattaria annua, flore (minore luteo vel) albo, staminibus purpureis. *Moris. hist.* 2. p. 489 f. 5. t. 10. f. 5.

Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Bauh. pin.* 240.

- β. *Blattaria* flore albo corvini. *Barr. rar.* 17. f. 1249.

Habitat in *Italia, Gallia, Germania*.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Flores in nostra sæpius albi, raro lutei, corolla dorso purpurascens. Summitas plantæ pilis gluten secernentibus adspargitur.

C O R I S.

1. **CORIS.** *Hort. cliff.* 68.

Coris cærulea marittima. *Bauh. pin.* 280.

Coris monspeliaca. *Lob. ic.* 402.

Coris quorundam. *Clus. hist.* 2. p. 174.

Habitat in *Gallia narbonensi & Valentia ac Monspeli.*

Hospitatur in *Tepidario*, raro semina perficit, annua, †.

R H A M N U S.

1. **RHAMNUS** floribus trigynis, aculeis geminis: altero inferiore reflexo. *Hort. cliff.* 69.

Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso. *Bauh. pin.* 477.

Rhamnus. *Cam.* 3. epit. 80.

Paliurus. *Dod. pempt.* 756.

Habi-

Habitat in Italia & Gallia Narbonensi.

Hospitatur in Frigidario, arbor.

RHAMNUS inermis, floribus dioicis, stigmate triplici. *Virid. cliff.* 19.

Rhamnus inermis, floribus polygamis, stigmate triplici. *Hort. cliff.* 71.

Alaternus. 1. 2. *Clus. hist.* 1. p. 50.

Philyca elatior & humilior. *Bauh. pin.* 477.

Habitat in Gallia Narbonensi, Lusitania, Italia,

Hospitatur in Frigidario arbor.

LYCIUM.

LYCIUM foliis linearibus. *Hort. cliff.* 57.

Jasminoides africanum, jasmini aculeati foliis & facie.

Nissol. act. 1711. p. 420. t. 12. *Mich. gen. t.* 105. f. 2.

Rhamnus alter, foliis falsis, flore purpureo. *Bauh. pin.* 477.

Rhamni primi species altera. *Clus. hist.* 1. p. 109. *Lob. ic.* 2. p. 180.

Habitat in Africa & extremis regni Valentini.

Hospitatur in Frigidario, Arbor.

CYCLAMEN.

CYCLAMEN foliis cordatis, corolla reflexa.

Cyclamen. *Hort. cliff.* 49.

Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascente. *Bauh. pin.* 308.

Cyclaminus odorato purpureo flore. *Clus. hist.* 1. p. 264.

Cyclaminus. *Cam. epit.* 357.

Pharm. CYCLAMINIS Radix

Habitat in saltibus umbrosis subhumidis Pannonia, Austria, Tataria uvalensis.

Hospitatur in Frigidario, perennis.

CAPSICUM.

CAPSICUM annuum. *Hort. cliff.* 59.

Capficum : species omnes. *Tournef. inst.* 152.

Piper indicum. sp. 1 - 7. *Bauh. pin.* 102.

Pharm. PIPERIS INDICI Fructus.

Habitat in Brasilia, Mexico, Barbados.

Hospitatur in Caldario, annua.

Obs. Variat immense figura baccarum.

SOLA-

S O L A N U M.

1. SOLANUM caule inermi fruticoso, foliis ovato-lanceolatis integris, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 61.
 Solanum fruticosum bacciferum. *Baub. pin.* 166.
 Pseudo-Capsicum. *Dod. pempt.* 718.
 Habitat in *Madera*.
 Hospitatur in *Frigidario*, arbuscula.
- * SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulatis. *Virid. cliff.* 15. *Hort. cliff.* 60. *Fl. Svec.* 188.
- β. Solanum procerius patulum, vulgaris fructu. *Dill. elth.* 367. *t.* 275. *f.* 355.
- γ. Solanum gvineense, fructu magno instar cerasi nigerimo umbellato. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 68. *Dill. elth.* 366. *t.* 274. *f.* 354.
- δ. Solanum nigrum vulgari simile, caulibus exasperatis. *Dill. elth.* 368. *t.* 275. *f.* 356.
- ε. Solanum annuum hirsutius, baccis luteis. *Moris. hist.* 3. *p.* 520. *Dill. elth.* 366. *t.* 274. *f.* 353.
 Solanum lanuginosum hortense s. vulgari simile. *Raj. hist.* 672.
- ζ. Solanum glabrum Judaicum, baccis aurantis. *Dill. m. ss.*
 Habitat β in *India*; γ in *Guinea*; δ in *Virginia*. ε in *Anglia*. ζ in *Judæa*.
 Hospitatur sub dio, annua.
- Obs. β Caules teretes glabri. Folia integerrima, glabra.
 γ Caules angulati dentati. Folia integerrima, glabra.
 δ Caules angulati dentati. Folia repanda glabra.
 ε Caules teretes villosi, Folia magis angulata, minus villosa.
 ζ Viride, caulis exasperatus, aculeis mollibus incurvis, Folia repanda, nuda.
3. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis. *Hort. cliff.* 60. *n.* 2.
 Solanum tuberosum esculentum. *Baub. pin.* 167. *prodr.* 89. *t.* 89.
 Arachidna theophrasti, Papas americanorum. *Clus. hist.* 2. *p.* 79.
Svecis Jord-pæron, Potatoes.
 Habitat, ut fertur, in *Virginia*.
 Hospitatur sub dio, & vulgaris in *Hortis*, annuum, ex tuberibus propagandum.

SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisis. *Hort. cliff.* 60.

Solanum pomiferum, fructu rotundo striato molli. *Baub. pin.* 167.

Lycopersicon galeni. *Tournef. inst.* 150.

Mala aurea. *Dod. pempt.* 438.

Poma amoris. *Cam. epit.* 821.

Habitat in *Jamaica*.

Hospitatur in *Caldario* & *sub dio*; annua.

Obs. *Fructus editur perpiniani*. D. Barrere. Nisi optime maturus venenatus est.

SOLANUM caule aculeis recurvis, foliis sinuatis subtus tomentosis: utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis. *Fl. zeyl.* 95.

Solanum pomiferum frutescens africanum spinosum nigricans, borraginis flore, foliis profunde laciniatis. *Herm. lugdb.* 573. *t.* 575. *Pluk. alm.* 251. *t.* 226. *f.* 5.

Moris. hist. 3. *p.* 521. *f.* 13. *t.* 1. *f.* 15.

Habitat in *Æthiopia* & *Zeylona*.

Hospitatur in *Caldario*; frutex.

SOLANUM aculeatum, foliis cordatis subquinquelobis; utrinque villosis & aculeatis. *Hort. cliff.* 61.

Solanum americanum molle foliorum margine & aculeis flavescentibus, fructu mammoso. *Tournef. inst.* 149.

Solanum barbadense spinosum annuum, fructu aureo rotundiore pyri parvi inversi forma & magnitudine. *Pluk. alm.* 250. *t.* 225. *f.* 1.

Habitat in *Virginia*; *Barbados*.

Hospitatur in *Caldario*; annua.

SOLANUM calycibus aculeatis, foliis ovatis integerrimis tomentosis. *Hort. cliff.* 61. *Flor. zeyl.* 93.

Melongena fructu rotundo. *Tournef. inst.* 152.

Solanum pomiferum, fructu oblongo. *Baub. pin.* 167.

Mala insana. *Dod. pempt.* 458.

Habitat in *Africa* & *America*.

Hospitatur in *Caldario*; annua.

P H Y S A L I S.

PHYSALIS caule simplici annuo, foliis integerrimis geminatis, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 62.

D

Alke-

Alkekengi officinarum. *Tournef. inst.* 151.

Solanum vesicarium. *Baub. pin.* 166. *Dod. pempt.* 454.

Pharm. ALKEKENGII Herba, Baccæ, Aqua. Semina.

Habitat in *Italia, Gallia, Germania.*

Hospitatur *sub dio*, & in *Frigidario*, perennis.

2. **PHYSALIS** annua ramosissima, ramis angulosis glabris, foliis dentato-serratis. *Hort. cliff.* 62. *Fl. zeyl.* 97. Alkekengi indicum glabrum, chenopodii folio. *Dill. elth.* 13. t. 12. f. 12.

Solanum vesicarium indicum. *Baub. pin.* 166.

Halicacabum f. Solanum indicum. *Comm. hort.* 70. t. 17.

Habitat in *Carolina, Zeylona.*

Hospitatur in *Vaporariis*, annua.

3. **PHYSALIS** annua ramosissima, ramis teretibus pubescentibus, geniculis nodosis. *Hort. cliff.* 62. Alkekengi virginianum, fructu luteo. *Feuill. peruv.* 3. p. 5. t. 1.

Solanum vesicarium virginianum procumbens annuum, folio lanuginoso. *Morif. hist.* 3. p. 527. f. 13. t. 3. f. 24.

Habitat in *Virginia, Peru, & India orientali.*

Hospitatur in *Vaporariis*, annua.

VITIS.

1. **VITIS** foliis palmato-angulatis. *Hort. cliff.* 74. Vitis vinifera. *Baub. pin.* 299. *Cam. epit.* 1003. *Dod. pempt.* 415.

Pharm. VITIS Folia. PASSULÆ majores, laxativæ. CORINTHIACÆ, pulpa, Lohoc.

Svecis. Win-ranka.

Habitat in locis nec frigore nec sole ustis: *Narbona, Virginia, Jamaica, Mexico.*

Hospitatur in *Frigidario* arbuscula.

RIBES.

- * **RIBES** inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis. *Fl. Svec.* 197.
 β. Ribes vulgare acidum, albas baccas ferens. *Baub. hist.* 2. p. 98.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

81

Grossularia hortensis, fructu margaritis simili. *Bauh.*
pin. 455.

Svecis Hvita - Vinbår.

Habitat in summo septentrione.

Hospitatur passim in Hortis oleraceis, frutex.

4. *RIBES* inerme floribus oblongis. *Fl. Svec.* 196.

3. *Ribesium nigrum pensylvanicum*, floribus oblongis.

Dill. elth. 324. t. 246. f. 315.

Habitat in Pennsylvania.

Hospitatur sub dio, frutex, †.

5. *RIBES* ramis subaculeatis reclinatis. *Hort. cliff.* 82.

Grossularia spinosa sativa altera, foliis latioribus. *Bauh.*

pin. 455.

Grossularia fructu obscure purpurascente. *Clus. hist.*

1. p. 120.

Svecis Röda - Stickelbår.

Habitat in Germania.

Hospitatur frequens sub dio, in Hortis oleraceis, frutex.

Descr. Caules sub-aculeati, vel vix aculeati, nutantes & reclinati; cortice minus fisso & fere glabro. Gemmarum squamæ, cum debescunt, margine setis capitatis ciliatæ sunt, uti etiam petioli. Pedunculi uniflori, nutantes, villosi, in medio cincti involucto minimo, triphylo, inæquali. Germen setis capitatis (præter villos) undique adpersum. Calyx villosus, laciniis retroflexis. Flos nutans, ergo setæ glanduliferæ ad margines gemmarum petiolorum, & undique in Germine.

6. *RIBES* ramis aculeatis, racemis erectis, baccis hirsutis. *Hort. cliff.* 82.

Grossularia fructu maximo hispido, margaritarum fere colore. *Raj. hist.* 1484.

Svecis Ludne - Krusbår.

Habitat in Europa.

Hospitatur frequens in Hortis oleraceis.

Obs. Setæ ad latera petiolorum longiores, non capitatæ, sed hirsutæ variis pilis, cum in antecedente specie glabræ sint hæ setæ & capitatæ.

7. *RIBES* ramis undique, aculeatis.

Habitat in Virginia.

Hospitatur sub dio, frutex.

Obs. Frutex adhuc, altero anno asatione, pedalis, Caulibus ruffis adpersis undique aculeis tenuibus, parum nutantibus; præter hos alii aculei majores, ternati, sessiles sub foliis, ut in vulgaribus. Folia Ribeos.

CEANOTHUS.

8. *CEANOTHUS* corymbis folio longioribus.

Ceanothus. *Act. ups.* 1741. p. 77.

Celastrus inermis, foliis ovatis ferratis trinerviis, racemis ex summis alis longissimis. *Hort. cliff.* 73. *Gron. virg.* 25.

Evonymus, jujubinis foliis, carolinienfis, fructu parvo fere umbellato. *Pluk. alm.* 139. t. 28. f. 6.

Evonymus novis belgii, corni feminæ foliis. *Comm. hort.* 1. p. 167. t. 86. *Raj. dendr.* 69.

Evonymoides carolinienfis, ziziphi foliis. *Isnard. act.* 1716. p. 369.

Habitat in *Virginia*, *Carolina*.

Hospitatur in *Frigidario*, *Arbor floruit & perit.*

LAGOECIA.

I. LAGOECIA. *Hort. cliff.* 73.

Cuminoides vulgare. *Tournef. inst.* 30.

Cuminum sylvestre, capitulis globosis. *Bauh. pin.* 186.

Cuminum sylvestre. *Cam. epit.* 519. *Dod. pempt.* 300.

Habitat in *Creta*, *Aleppo*, *Lemno*, *Lysia*, *Galatia*.

Hospitatur sub dio, annua.

CLAYTONA.

I. CLAYTONA foliis ovatis.

Limnia. *Act. Stockh.* 1746. p. 130. t. 5.

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur in *Frigidario*, & sub dio perennis.

Descr. Radix promit Folia multa, obverse ovata, coarctata in petiolum canaliculatum, glabra, integerrima, nervosa, fragilia.

Caulis teres, longitudine foliorum radicalinum, terminatus foliis duobus oppositis, sessilibus, obverse ovatis vel magis rotundatis.

Racemus ex oppositione foliorum, foliolis floralibus alternis lanceolatis minimis, simplex, longitudine fere caulis.

Pedunculus unus (vel duo) nudus, simplicissimus, ad latus folii floralis, reflexus ante florescentiam, sub florescentia erectus, post florescentiam reflexus, maturo semine erectus.

Calyx diphyllus, basi transversus, ovatus. Petala quinque, rosacea, rubra, striata, emarginata. Stamina quinque, recurva. Stylus apice trifido. Capsula parva, trilocularis, trivalvis, elastica. Semina tria, rotunda, lutea.

CELOSIA.

I. CELOSIA foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 43.

Amaranthus panicula incurva. *Bauh. pin.* 121.

Amaranthus cristatus. *Cam. epit.* 792.

Habitat forte in *Indiis*.

Hospitatur sub dio & in *Caldario*, annua.

V I N C A.

1. VINCA foliis ovatis. *Hort. cliff.* 77.
 Clematis daphnoides minor. *Bauh. pin.* 301.
 Clematis daphnoides. *Dod. pempt.* 405.
Pharm. VINCÆ PERVINCÆ Herba.
Svecis Wintergrön. Winter-lager.
 Habitat in umbrosis *Germania*, *Helvetiæ*, *Angliæ*, *Galliæ*, *Hispaniæ*.
 Hospitatur *sub dio*, fruticulus & repens, sempervirens.

N E R I U M.

1. NERIUM foliis ternis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.*
 76. *Fl. zeyl.* 108.
 Nerium floribus rubescentibus. *Bauh. pin.* 464.
 Rhododendrum. *Dod. pempt.* 851.
 Oleander, Laurus rosea. *Lob. ic.* 118.
 Habitat in *Liguria*, *Sicilia*, *Creta*, *Syria*, *Malabaria*, *Zeylona*.
 Hospitatur in *Caldario* & *Tepidario*, frutex sempervirens.

D I G Y N I A.

S T A P E L I A.

1. STAPELIA denticulis ramorum extrorsum promi-
 nululis. *Hort. cliff.* 77.
 Apocynum humile aizoides, filiquis erectis, africa-
 num. *Herm. lugdb.* 52. t. 53. *Stiff. bot.* 32.
 Fritilaria crassa capitis bonæ spei. *Stapel. theophr.* 335.
 Habitat ad *Caput bonæ spei*.
 Hospitatur in *Caldario*, vix florens, sempervirens, succulenta.

A S C L E P I A S.

1. ASCLEPIAS caule subvolubili herbaceo, foliis ova-
 to-lanceolatis, floribus confertis patentissimis. *Roy.*
lugdb. 410.
 Asclepias nigro flore. *Bauh. pin.* 303.
 Habitat *Monspeli* in collibus.
 Hospitatur *sub dio*, perennis.
 Obs. Planta nostra non scandit, & excepto colore corollæ & foliis crassioribus
 Asclepiadi Fl. *Svec.* 200. simillima est.
2. ASCLEPIAS caule erecto simplici herbaceo, foliis
 D 3 ovali-

ovalibus subtus tomentosis, umbellis nutantibus.
Hort. cliff. 78. *Virid. cliff.* 20.

Apocynum majus syriacum rectum. *Corn. canad.* 90.

Apocynum erectum latifolium incanum syriacum, floribus parvis obsolete purpurascens. *Herm. par.* 31.

Beid-el-offar. *Vest. ægypt* 28.

Habitat in Syria, & ad Jordanum prope Hiericho Palæstina.
 Hospitatur in Frigidario, rarius sub dio, perennis, florens.

Obs. Pedunculi in Apocynis exeunt ad latera caulis inter folia opposita non vero ex alis foliorum, ut in reliquis plantis; hi dein alternatim procedunt ad latera caulis. Muscæ haurientes mel sæpe pedibus alligantur tanquam visco, nec pedem extrahere valent.

3. **ASCLEPIAS** caule erecto fruticoso, foliis lancetatis, umbellis nutantibus, conceptaculis inflatis pilosis. *Hort. cliff.* 78.

Apocynum erectum africanum, villosa fructu, falcis folio. *Herm. parad.* 23. 24. t. 24.

Apocynum rectum elatius, falcis angusto folio, immaculatis flosculis in umbellam, folliculis pilosis. *Pluk. alm.* 36. t. 138. f. 2.

Habitat ad Caput bonæ spei.

Hospitatur in Caldario, frutex, fructificans, sempervirens.

Obs. Flores stillant nectar, quotidie in Caldario clauso, ut sub singulo nectarii cornu gutta globosa liquoris hæreat.

CYNANCHUM.

1. **CYNANCHUM** caule volubili, foliis cordato-lanceolatis glabris. *Hort. cliff.* 79.

Periploca prior. *Dod. pempt.* 408.

Apocynum 3. latifolium. *Clus. hist.* 1. p. 125.

Scammonia monspeliaca adfinis, foliis acutioribus. *Baub pin.* 294.

Habitat in Sicilia, Hispania, Astracan.

Hospitatur sub dio, & in Frigidario, perennis.

HERNIARIA.

1. **HERNIARIA** squammis nitidis flores superantibus. *Hort. cliff.* 41.

Paronychia hispanica. *Clus. hist.* 2. p. 183. *Tournef. inst.* 507.

Poly-

Polygonum minus candicans. *Baub. pin.* 281.

Habitat in *Hispania* & *Gallia-Narbonensi*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis, †.

* *HERNIARIA* calycibus bractea nudis. *Fl. Svec.* 207.
Hort. cliff. 111.

β. *Herniaria hirsuta.* *Baub. hist.* 3. 379.

Habitat in arenosis *Brabantiae*, *Galliae Narbonensis*, *Germaniae*, *Italiae*.

Hospitatur sub dio, annua, †.

C H E N O P O D I U M.

1. *CHENOPODIUM* fruticans, foliis linearibus teretibus carnosiss. *Hort. cliff.* 86.

Chenopodium fedi folio minimo, frutescens perenne.

Boerb. lugdb. 2. p. 91.

Habitat - - -

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

2. *CHENOPODIUM* foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis. *Hort. cliff.* 86.

Linaria scoparia. *Baub. pin.* 212.

Osyris. *Dod. pempt.* 101.

Belvedere. *Cæsalp. syst.* 159.

Herba studioforum. *Tabern. hist.* 2. p. 102.

Habitat in *Japonia*, *Græcia*.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Flores femineos vidi, non dum vero stamina, quæ alii inquireant.

3. *CHENOPODIUM* foliis filiformibus acutiusculis, caule recto.

Chenopodium altissimum, foliis succulentis. *Buxb. cent.*

1. p. 21. t. 31. f. 2.

Habitat ad *Astracan*.

Hospitatur sub dio, annua.

4. *CHENOPODIUM* foliis linearibus planis obtusis, caule ramoso, ramis deflexis.

Chenopodium maritimum, foliis fedi teretibus. *Buxb.*

cent. 1. p. 21. t. 31. f. 1.

Habitat ad *Astracan*.

Hospitatur sub dio, annua.

5. *CHENOPODIUM* foliis oblongis dentato-finuatis, racemis nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84.

Botrys ambrosioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.

Botrys. *Dod. pempt.* 34.

Pharm. BOTRIOS Herba, Semina.

Habitat in arenosis Galliae Narbonensis, Hetruria, Calabria.

Hospitatur sub dio, annua.

6. CHENOPODIUM foliis lanceolatis dentatis, racemis foliatis simplicibus. *Hort. cliff.* 85.

Botrys ambrosioides mexicana. *Bauh. pin.* 138. & 516.

Atriplex odorata suaveolens americana mexicanave.

Moris. hist. 2. p. 605. f. 5. t. 35. f. 8.

Epazotl. *Hernand. mex.* 158.

Habitat in Mexico.

Hospitatur sub dio, annua.

B E T A.

1. BETA. *Cæsalp. syst.* 159. *Hort. cliff.* 83.

α. Beta rubra. *Cam. epit.* 256.

Beta rubra, radice rapæ. *Bauh. pin.* 118.

Rapum rubrum. *Fuchf. hist.* 213.

Pharm. BETÆ RUBRÆ Herba.

Svecis Rôdbeta.

β. Beta alba vel pallescens, quæ Cicla officinis. *Bauh. pin.* 118.

Beta candida. *Dod. pempt.* 620.

Pharm. BETÆ ALBÆ Herba, Succus.

Svecis Mangolt.

Habitat in maritimis salis Britanniae, Belgii.

Hospitatur in Hortis oleraceis, prior vulgarior, biennis.

S A L S O L A.

1. SALSOLA foliis conico-subulatis mucronatis, calycibus corolliformibus obtusis coloratis crenatis.

Kali humile, alis purpureis florem rosaceam mentientibus. *Buxb. cent.* 1. p. 9. t. 14. f. 1.

Habitat in Oriente.

Hospitatur sub dio, annua, †.

2. SALSOLA foliis filiformibus inermibus mucronatis, caule ramosissimo.

Habitat in Astracan.

Hospitatur sub dio, vix florens, annua, †.

Obs. Planta juniperum magnitudine referens, brevi luxurians, ramis ramosissimis.

G O M P H R E N A.

GOMPHRENA caule erecto, foliis ovato lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis diphyllis. *Hort. cliff.* 86. *Fl. zeyl.* 115.

Amaranthoides indicum, foliis ocymastri, capitulis purpureis. *Herm. parad.* 14.

Amarantho affinis indiæ orientalis, floribus conglomeratis, ocymastri folio. *Breyn. cent.* 109. *t.* 51. *Comm. hort.* 1. *p.* 85. *t.* 45.

Habitat in utraque India.

Hospitatur in Caldarario, annua.

P H Y L L I S.

PHYLLIS. *Hort. cliff.* 87.

Bupleuroides, quæ arbor umbellifera. *Waltb. hort.* 11. *t.* 6.

Valerianella canariensis frutescens Simpla nobla dicta. *Dill. elth.* 405. *t.* 299. *f.* 386.

Simpla nobla canariensium planta. *Pluk. alm.* 347.

Habitat in Canariis.

Hospitatur in Tepidario, æstate apricatur, frutex sempervirens.

E R Y N G I U M.

ERYNGIUM foliis radicalibus ovalibus planis crenatis, capitulis pedunculatis. *Hort. cliff.* 87.

Eryngium latifolium planum. *Baub. pin.* 386.

Eryngium pannonicum latifolium. *Clus. hist.* 2. *p.* 158.

Habitat in Austria, Silesia, Polonia, Russia.

Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

S A N I C U L A.

SANICULA foliis septilobatis inæqualibus, flosculis masculis pedunculatis.

Sanicula flosculis masculis pedunculatis, hermaphroditis sessilibus. *Gron. virg.* 31. *Roy. lugdb.* 529.

Sanicula marilandica, caule & ramis dichotomis, echin-
nis minimis in eodem communi pediculo ternis. *Raj. suppl.* 26c.

Lappula fere umbellata, astrantiæ foliis, virginiana. *Pluk. mant.* 114.

Habitat in *Virginia* & *Marilandia*.

Hospitatur *sub dio* & in *Frigidario*, perennis.

T O R D Y L I U M.

1. **TORDYLIUM** involucris umbella longioribus.

Hort. cliff. 90.

Gingidium foliis pastinacæ latifoliæ. *Baub. pin.* 151.

Caucalis syriaca cum maximo semine. *Baub. hist.* 3.

p. 86.

Habitat in *Syria*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

2. **TORDYLIUM** involucris partialibus longitudine petalorum, foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff.* 90.

Seseli creticum minus. *Baub. pin.* 161.

Seseli creticum. *Dod. pempt.* 314.

Pharm. SESELI CRETICI Semina.

Habitat *Monspeli*, *Romæ*, *Messanæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua, raro semina maturans.

C A U C A L I S.

1. **CAUCALIS** umbella trifida, umbellis trispermis, involucris triphyllis. *Hort. cliff.* 91.

Caucalis monspeliaca echinata, magno fructu. *Baub. pin.* 153.

Echinophora altera asperior platycarpus. *Col. ecphr.* 11 *p.* 95. *t.* 94.

Habitat *Monspeli* & in *Italia*.

Hospitatur *sub dio*, annua, cieur.

2. **CAUCALIS** umbellulis sessilibus simplicibus. *Hort. cliff.* 91.

Caucalis nodosa, echinato semine. *Baub. pin.* 153; *prodr.* 80.

Caucalis nodoso echinato semine. *Baub. hist.* 3. *p.* 83.

Caucalis ad alas florens. *Riv. pent.* 36.

Habitat in aggeribus *Angliæ*, *Galliæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua, †.

Obs. Semina exteriora s. lateralibus umbellulæ pilosa sunt: umbella universaliter nulla, sed stosculi ad alas foliorum conferti.

A R T E D I A.

1. **ARTEDIA** feminibus squamatis. *Hort. cliff.* 89.

Tapfia orientalis, anethi folio, semine eleganter creonato, *Tournef. cor.* 22. *it.* 3. *p.* 298.

Gina

Gingidium. *Rauv. itin.* 287. t. 287. *Comm. hort.* 61. t. 12. *Dalech. app.* 34.

Gingidium folio foeniculi. *Baub. pin.* 51.

Habitat in *Libano*, & *Tocat*.

Hospitatur in *Tepidario*, floruit. †.

D A U C U S.

DAUCUS feminibus hispidis. *Fl. suec.* 223.

Daucus sativus, radice lutea. *Tournef. inst.* 307.

Pastinaca tenuifolia sativa, radice lutea. *Baub. pin.* 151.

Carota. *Cæsalp. syst.* 288.

Pharm. DAUCI SATIVI Semina.

Daucus sativus radice alba. *Tournef. inst.* 307.

Daucus sativus, radice atro rubente. *Baub. pin.* 151.

Svecis Morot.

Habitat in *Europa*.

Hospitatur ubique in *Hortis* oleraceis biennis, γ. δ. rariores sunt.

A M M I.

AMMI foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, superioribus multifidis linearibus.

Ammi laciniis foliorum caulis lanceolatis. *Hort. cliff.* 89.

Ammi majus, *Baub. pin.* 159.

Ammi vulgare. *Dod. pempt.* 301. *Lob. ic.* 721.

Habitat in vineis agris pinguibus *Sicilia*, *Italia*, *Hispania*.

Hospitatur sub dio, annua.

S E L I N U M.

SELINUM radice filiformi multiplici. *Hort. cliff.* 93.

Apium sylvestre, lacteo succo turgens. *Baub. pin.* 153.

Thyffelinum plinii. *Lob. ic.* 711.

Habitat in *Germania* & *Gallia* paludosis nemorosis.

Hospitatur sub dio, perennis.

SELINUM foliis radicalibus ovatis inæqualiter serratis. *Hort. cliff.* 92.

Oreoselinum, apii folio, majus. *Tournef. inst.* 318.

Daucus montanus, apii folio, major. *Baub. pin.* 150.

Dauci tertium genus. *Fuchs. hist.* 233.

Cervaria. *Riv. pent.* 12.

Habitat in Montibus *Helvetia*, *Alsatia*, *Sabaudia*, *Geneve*, *Gallo-provincia*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis;

3. SELI-

3. SELINUM foliis simpliciter pinnatis inciso-angulatis

Habitat in Sibiria.

Hospitatur sub dio, perennis.

Descr. Radix alte descendens. Caulis pedalis, s. bipedalis, erectus, teres vix manifeste striatus, simplicissimus. Folia alterna, simpliciter pinnata, petiolis inferne membraceis, superne parum canaliculatis, basi amplexantibus, non vero vaginantibus. Foliola septem vel novem, cuneiformia, angulata, incisa, lævia, venosa: impari tripartito; adeoque facie inter Pimpinellam maximam & Pastinacam media, umbellæ aliquot ramos terminantes. Umbella parum convexa, patens, e radiis numerosissimis. Involucrum universale ex foliolo uno alterove angusto: Partialia vero ex foliolis decem circiter subulatis. Corollæ fere regulares, exterius rubræ, interius albæ, hermaphroditæ. Stamina alba, corollula longiora. Styli albi, truncati. Pedunculus umbellæ striato-angulatus.

ATHAMANTA.

1. ATHAMANTA foliolis capillaribus, feminibus glabris striatis. Hort. cliff. 93.

Meum foliis anethi. Baub. pin. 148.

Meum. Dod. pempt. 305.

Daucus creticus. Fuchs. hist. 230.

Pharm. MEU Radix.

Habitat in altioribus montibus Angliæ, Galliæ, Italiæ,

Hospitatur sub dio, perennis.

2. ATHAMANTA foliis inferioribus nitidis, umbellis primordialibus subsessilibus, feminibus pilosis.

Athamanta foliolis multifidis planis, feminibus villosis. Hort. cliff. 93.

Libanotis foliis multifidis planis. Hall. gott. 41

Daucus secundus ficulus, folio sophiæ. Zan. hist. 80

Pluk. alm. 129.

Myrrhis ficula elatior, tenuioribus foliis. Moris. hist. 3. p. 302

Chærophyllo ficulum, foliis sophiæ, villoso semine. Tournef. inst. 314.

Habitat in Sicilia.

Hospitatur sub dio, & in Frigidario, perennis.

Descr. Folia supradecomposita: inferiora nitida: superiora subvillosa. Caules pubescentes. Involucrum universale uno alterove foliolo. Semina oblonga pilosa. Umbellæ primordiales subsessiles, tandem laterales evadunt.

PEUCEDANUM.

1. PEUCEDANUM foliis quinquies tripartitis linearibus subulatis integerrimis. Hort. cliff. 93.

Peuce

Peucedanum germanicum. *Baub. pin.* 149.

Peucedanum. *Lob. hist.* 453.

Habitat ad fossas Germaniæ, Angliæ, Galliæ.

Hospitatur sub dio, perennis, †.

CRITHMUM.

CRITHMUM foliolis lanceolatis carnosis. *Hort. cliff.* 94.

Crithmum f. Fœniculum marittimum minus. *Baub. pin.* 288.

Fœniculum marinum f. Empetrum, f. Calcifraga. *Lob. ic.* 392.

Habitat in rupibus marittimis Angliæ & australioris Europæ.

Hospitatur sub dio & in Frigidario, perennis.

FERULA.

FERULA foliolis linearibus longissimis simplicibus. *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 99.

Ferula femina plinii. *Baub. pin.* 148.

Ferula. *Dod. pempt.* 321. *Lob. ic.* 778.

Habitat in Gallia Narbonensi, Italia, Sicilia, Apulia.

Hospitatur in Frigidario, perennis.

FERULA foliolis laciniatis: lacinulis tridentatis inæqualibus. *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 99.

Ferula tingitana, folio latissimo lucido. *Herm. par.* 165. t. 165.

Habitat in Hispania & agro Tingitano.

Hospitatur in Frigidario, perennis.

FERULA lucida canadensis. *Gron. virg.* 147.

Habitat in Virginia.

Hospitatur sub dio.

Obs. Adhuc parva, nec caulescens, non determinatur itaque. Foliola ramosa, linearia, nitida sunt.

FERULA foliorum alis utrinque acutis, foliolis linearibus integerrimis, umbellis terminalibus subsessilibus. *Roy. lugdb.* 100.

Ferula minor ad singulos nodos umbellifera. *Tournef. inst.* 321.

Libanotis ferulæ folio & semine. *Baub. pin.* 158.

Libanotis quibusdam, flore luteo, semine ferulæ. *Baub. hist.* 3. pp. 41. *Raj. hist.* 421.

Panax

Panax Asclepium, ferulæ facie. *Lob. ic.* 783.

Habitat in *Istria*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

LIGUSTICUM.

1. *LIGUSTICUM* foliis multiplicibus, foliolis superne incis. *Hort. cliff.* 97.

Ligusticum vulgare. *Baub. pin.* 157.

Levisticum vulgare. *Dod. pempt.* 311.

Pharm. LEVISTICI Radix, Herba Semina, *Oleum*.

Svecis Libb - sticka.

Habitat in *Baldo* & *Appenninis*.

Hospitatur ubique in arvis rusticorum, perennis.

2. *LIGUSTICUM* foliis multiplicato-pinnatis, foliolis pinnatim incis. *Hort. cliff.* 97. *Hall. helv.* 434. *Roy. lugdb.* 104.

Cicutaria latifolia fœtida. *Baub. pin.* 161.

Cicuta fœtida. *Tabern. hist.* 2. p. 465.

Habitat in *Alpibus Rhæticiis*, *Peloponesiacis*.

Hospitatur sub dio & in *Frigidario*, perennis.

ANGELICA.

1. *ANGELICA* foliolis æqualibus ovatis inciso-ferratis. *Hort. cliff.* 97.

Angelica lucida canadensis. *Corn. can.* 196. t. 197. *Morif. hist.* 3. p. 281. f. 9. t. 3. f. 8.

Imperatoria lucida canadensis? *Tournef. inst.* 317.

Habitat in *Canada*.

Hospitatur sub dio, perennis.

SIUM.

1. *SIUM* foliis pinnatis, floralibus ternatis. *Hort. cliff.* 98.

Sisarum germanorum. *Baub. pin.* 155.

Sisarum majus. *Dalech. hist.* 723.

Svecis Socker - rot.

Habitat forte in *China?*

Hospitatur in *Hortis oleraceis*, perennis.

BUBON.

1. *BUBON* foliolis rhomboideo-ovatis incis, umbellis numerosissimis. *Hort. cliff.* 95.

Apium macedonium. *Baub. pin.* 154.

Petro-

Petroselinum macedonicum. Lob. ic. 708. Dod. pempt. 697.

Pharm. PETROSELINI MACEDONICI Semina.

Habitat forte in *Macedonia*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

S I S O N

SISON foliis pinnatis, umbellis pendulis. Roy. lugdb.

105.

Sison foliis pinnatis. Hort. cliff. 98.

Sium terrestre, umbellis rarioribus. Moris. hist. 3.

p. 283. f. 9. t. 5. f. 6.

Sium arvense seu segetum. Tournef. inst. 308.

Selinum fii foliis. Raj hist. 443.

Habitat inter *Segetes Angliæ*.

Hospitatur in *Frigidario*, biennis, †.

SISON foliolis subcapillaribus.

Ammi lacinulis foliorum caulis capillaribus. Hort. cliff. 89.

Ammi parvum, foliis fœniculi. Bauh. pin. 159.

Ammi. Cam. epit. 522. Riv. pent. 92.

Foeniculum annum, odore origani. Tournef. inst. 312.

Pharm. AMMIOS VERI Semina.

Habitat in *Apulia & Ilva monte*.

Hospitatur *sub dio*, annua, florens, non fructum ferens, †.

O E N A N T H E.

OENANTHE umbellularum pedunculis marginalibus longioribus ramosis masculis.

Oenanthe flosculis radiantibus umbellarum proliferis.

Hort. cliff. 99.

Oenanthe cretica. Pon. bald. (ital) 213.

Oenanthe prolifera apula. Bauh. pin. 163. Moris.

hist. 3. p. 289. f. 9. t. 7. f. 5.

Habitat in *Apulia*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

Obf. Umbella Universalis radiis sæpius quatuor, patentissimis. Umbellulæ flosculis in disco convexo sessilibus, hermaphroditis: in radio flosculis masculis extrorsum radiatis, pedunculo ramoso multifloro insidentibus.

C O R I A N D R U M.

CORIANDRUM fructibus globosis. Hort. cliff. 100.

Coriandrum majus. Bauh. pin. 158.

Corian-

Coriandrum. *Dod. pempt. 302.*

Pharm. CORIANDRI Semina, *Confectio.*

Svecis. Coriander.

Habitat inter Segetes *Germaniæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

B U P L E U R U M.

1. BUPLEURUM involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis.

Bupleurum foliis ovatis perfoliatis. *Hort. cliff. 104.*

Hall. helv. 437.

Perfoliata vulgatissima arvensis. *Baub. pin. 277.*

Perfoliata. *Dod. pempt. 104.*

Pharm. PERFOLIATÆ Herba, Semina.

Habitat inter segetes *Italiæ, Galliæ, Angliæ, Germaniæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

S C A N D I X.

1. SCANDIX feminibus rostro longissimo. *Hort. cliff.*

101.

Scandix, femine rostrato, vulgaris. *Baub. pin. 152.*

Scandix f. Pecten veneris. *Dod. pempt. 701.*

Pecten veneris. *Cam. epit. 302.*

Habitat inter segetes *Germaniæ, Belgii, Angliæ, Galliæ, Italiæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

2. SCANDIX feminibus fulcatis angulatis. *Hort. cliff.*

101.

Myrrhis major, Cicutaria odorata. *Baub. pin. 160.*

Myrrhis. *Dod. pempt. 701.*

Svecis Spansk-kyrsvell.

Habitat in montibus *Alvornia;*

Hospitatur ubique in hortis oleraceis, perennis.

C H Æ R O P H Y L L U M.

1. CHÆROPHYLLUM foliis supra decompositis, caulinis articulis lævibus: superne incrassatis.

Chærophyllum radice turbinata carnosâ. *Hort. cliff.*

102.

Cicutaria bulbosa. *Baub. pin. 161.*

Myrrhis foetens. *Riv. pent. 49.*

Habi-

Habitat in *Alsatia, Hungaria, Helvetia.*

Hospitatur *sub dio*, biennis.

Descr. Radix *napiformis*. Caulis *humanae altitudinis, laevis, infimo articulo scabro, articulis versus apicem ventricosus, praesertim in superioribus. Folia supradecomposito-pinnata, glabra, in summis foliis linearia. Umbellulae intermediae masculae, dimidio breviores, exterioribus hermaphroditis.*

IMPERATORIA.

IMPERATORIA. Riv. pent. 7. Hort. cliff. 103.

Imperatoria major. Baub. pin. 156.

Magistrantia. Cam. epit. 592.

Ostruthion. Dod. pempt. 514.

Pharm. IMPERATORIAE Radix.

Svecis Mæstar-ört.

Habitat in pratis ad radices Alpium Helveticarum, Austriacarum, Styriacarum.

Hospitatur *sub dio*, perennis, cicur.

Obs. Rusticis ut specificum in tertiana inservit.

HERACLEUM.

HERACLEUM foliis pinnatis, foliolis quinque: intermediis sessilibus, floribus radiatis.

Heracleum foliis palmatis serratis. Hort. cliff. 103.

Panax sphondylii folio. f. Heracleum. Baub. pin. 157.

Panax Heracium. Dalech. hist. 740.

Panaces Heracium f. Sphondylium alterum. Dod. pempt. 307.

Habitat in Alpibus Apenninis, ego e Siberia habui.

Hospitatur *sub dio*, biennis, rarius perennis.

Descr. Caulis crassitie, quanta vix pollice & indice comprehendere queat prope radicem, rufescens, sulcatus una cum vaginis foliorum, quae ambo inferne pilis rigidiusculis reflexis scabra; altitudo fere humana. Folia alterna (vagina ampla ventricosa) insidentia petiolo brevissimo, mox triplici; laterali petiolo utrinque insidet Foliolum circumscriptione cordatum, acuminatum, triplici sinu ultra medium utrinque incisum & praetera profundius serratum & iterum tenuius serratum, lobis omnibus acutiusculis. Foliolum hoc parum rugosum, laeve, subtus vix manifeste tomentosum. Petiolo intermedio tria foliola insident, quorum lateralia sessilia, praecedentibus aequalia, sed latere exteriori angustiora. Quintum vero foliolum impar majus est, sed praecedentibus simile et profundius sinuatum. Umbellae ex singulis alis terminalibus altiores singulae. Involucrum universale paucis foliolis persistentibus, Partiale pluribus angustissimis brevibus. Umbella copiosa, ampla. Corollae albae, radiatae, magnae. Omnes Flosculi fertiles. Semina ovalia, parum convexa, utrinque lineis quatuor obscuris notata.

HERACLEUM foliis pinnatis: foliolis quinque: intermediis sessilibus, corollulis uniformibus.

Habitat in *Siberia* ? certe semina missa ab amiciss. Viro.

Hospitatur *sub dio*, biennis, perennisve.

Obs. Simillima precedenti, sed paullo minor & magis viridis, descriptio in omnibus eadem, sed corolla viridis vel viridi-lutea, nec radiata, uti precedentis, nec alba uti sylvestris Fl. Svec. 231. quæ etiam sine radio.

P A S T I N A C A,

1. PASTINACA foliis simpliciter pinnatis. Hort. cliff.

105.

Pastinaca sylvestris latifolia. Baub. pin. 155.

Pastinaca latifolia sylvestris. Dod. pempt. 680.

Pharm. PASTINACÆ Semina.

Svecis Palsternacka.

Habitat ad agrorum margines in Germania, Anglia, Italia.

Hospitatur ubique in Hortis oleraceis, biennis.

S M Y R N I U M.

1. SMYRNIUM foliis caulinis simplicibus amplexicaulibus. Hort. cliff. 104.

Smyrnum peregrinum, rotundo s. oblongo folio. Baub. pin. 158. 154. prodr. 82.

Perfoliata altera. Dalech. hist. 791.

Habitat in Creta, Sicilia, inque montibus Æquicolorum, Valvensium, Asprensium.

Hospitatur in Frigidario, perennis.

A N E T H U M.

1. ANETHUM fructu compresso. Hort. cliff. 106.

Anethum hortense. Baub. pin. 147.

Anethum. Dod. pempt. 298.

Pharm. ANETHI Herba, Aqua, Oleum, Flores, Semina, Oleum.

Svecis Dill.

Habitat inter segetes Hispaniæ & Lusitaniæ.

Hospitatur ubique in Hortis oleraceis, annua.

2. ANETHUM fructu ovato. Hort. cliff. 106.

Fœniculum dulce. Baub. pin. 147.

Fœniculum. Dod. pempt. 297.

Pharm. FOENICULI Radix, Herba, Aqua, Semina, Confectio, Aqua, Spiritus.

Svecis Fänkål.

Habitat in siccis Lugduni, Monspelii.

Hospitatur *sub dio*, annua, florens, vix fructum ferens.

A P I U M.

APIUM foliis caulinis linearibus. *Hort. cliff.* 108.
 Apium hortense vel Petroselinum vulgo. *Bauh. pin.*

153.

Apium hortense. *Dod. pempt.* 694.
Pharm. PETROSELINI Radix, Herba, Aqua, Semina, Oleum.

Svecis Perfillja.

Apium crispum. *Riv. pent.* 91.

Apium vel Petroselinum crispum. *Bauh. pin.* 153.

Svecis Krus-perfillja.

Apium radice esculenta. *vulgo.*

Svecis Rot-perfillja.

Habitat locis humentibus *Sardinia.*

Hospitatur *sub dio*, biennis.

APIUM foliolis caulinis cuneiformibus. *Fl. svec.* 248.

Hort. cliff. 107.

Apium dulce, Celeri italorum. *Tournef. inst.* 305.

Svecis Celleri.

Habitat in *Europa.*

Hospitatur *sub dio*, biennis, oleracea.

A N I S U M.

ANISUM foliis radicalibus simplicibus. *Hort. cliff.* 107.

Anisum herbariis. *Bauh. pin.* 159.

Anisum. *Fuchf. hist.* 62.

Pharm. ANISI Semina, Aqua, Spiritus, Oleum.

Svecis Anis.

Habitat in *Aegypto*, *Syria.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

ANISUM foliis radicalibus pinnatis. *Hort. cliff.* 107.

Apium peregrinum, foliis subrotundis. *Bauh. pin.* 153.

Selinum peregrinum 1. *Clus. hist.* 2. p. 199.

Daucus tertius dioscoridis, secundus plinio. *Column. ecphr.* 1. p. 108. t. 109.

Habitat in *Messanis*, *salmanticensibus*, *Campeclarensibus*, herbis sterilioribus.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

TRIGYNIA.

RHUS.

1. RHUS foliis pinnatis ferratis. *Hort. cliff.* 110.

Rhus angustifolium. *Baub. pin.* 414.

Sumach angustifolium. *Baub. prodr.* 158.

Pharm. SUMACH Flores, Semina.

Habitat in *Brasilia*.

Hospitatur in *Frigidario*, arbor †.

2. RHUS foliis pinnatis integerrimis. *Hort. cliff.* 111.

Toxicodendrum foliis alatis, fructu rhomboide. *Dill.*
elth. 390. *t.* 292. *f.* 377.

Arbor americana, alatis foliis, succo lacteo venenata.

Pluk. alm. 45. *t.* 145. *f.* 1.

Sitz vel Sitzdsiu. *Kæmpf. amœn.* 791. *t.* 792.

Pharm. VERNIX Resina.

Habitat in *Virginia*, *China*.

Hospitatur in *Tepidario*, arbor.

3. RHUS foliis ternatis: foliolis obverse cordatis sessilibus. *Hort. cliff.* 111.

Rhus africanum trifoliatum minus glabrum, splendente folio subrotundo integro. *Pluk. alm.* 319. *t.* 219. *f.* 9.

Vitex trifolia minor indica rotundifolia. *Comm. hort.* 2. *p.* 181. *t.* 93.

Habitat in *Aethiopia*.

Hospitatur in *Frigidario*, arbuscula.

4. RHUS foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis acutis pubescentibus: integris sinuatisque. *Gren. virg.* 149.

Toxicodendron triphyllum, folio sinuato pubescente.

Tournef. inst. 611.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

VIBURNUM.

1. VIBURNUM foliis cordatis acute crenatis venosis subtus tomentosis. *Virid. cliff.* 25.

Viburnum. *Hort. cliff.* 109. *Tournef. inst.* 607.

Vibur-

Viburnum vulgo. Bauh. pin. 429.

Lantana. Dod. pempt. 781.

Habitat in argillosis sepibus *Alsatiæ, Angliæ, Helvetiæ, Galliæ, Italiæ*
Hospitatur in *Frigidario*, arbuscula.

VIBURNUM foliis ovatis integerrimis.

Tinus. Hort. cliff. 109.

Tinus 1. 2. 3. Clus. hist. 1. p. 49.

Laurus sylvestris. Bauh. pin. 461.

Habitat in *Lusitania, Italia.*

Hospitatur in *Frigidario*, arbor sempervirens.

VIBURNUM foliis trilobis dentatis.

Opulus. Hort. cliff. 109. Fl. Svec. 249. Gron. virg. 149.

Sambucus aquatica flore globoso pleno. Bauh. pin. 456.

Sambucus rosea. Lob. ic. 451.

Svecis Snö-bäll.

Habitat in *Europa.*

Hospitatur *sub dio*, arbuscula.

S A M B U C U S.

SAMBUCUS caule arboreo ramoso, floribus umbellatis. *Fl. Svec. 250. Roy. lugdb. 243.*

Sambucus caule perenni ramoso. Hort. cliff. 109.

Sambucus laciniato folio. Bauh. pin. 456.

Sambucus foliis laciniatis. Dalech. hist. 268.

Habitat in *Oelandia, Scania.*

Hospitatur *sub dio*, arbor.

T A M A R I X.

TAMARIX pedunculis nudis, floribus pentandris.

Tamarix floribus pentandris. Hort. cliff. 14.

Tamarix altera, folio tenuiore, f. gallica. Bauh. pin. 485.

Pharm. TAMARISCI Lignum, Cortex, Folia.

Habitat in *Normannia, Gallia narbonensi, Hispania, Italia.*

Hospitatur in *Frigidario*, arbor, sempervirens.

S T A P H Y L Æ A.

STAPHYLÆA foliis pinnatis. *Hort. cliff. 112.*

Staphylodendron. Dalech. hist. 102.

Pistacia sylvestris. Bauh. pin. 401.

Nux vesicaria. Dod. pempt. 818.

Svecis, Pimper-nötter.

Habitat in spongiosis *Italiae*, *Helvetiae* & forte *Bahusiae*.

Hospitatur in *Frigidario*, at in *Australiori Svecia sub dio Arbor*.

TELEPHIUM.

I. TELEPHIUM.

Telephium foliis oblongo-ovatis, floribus laxè spicatis terminalibus. *Hort. cliff.* 73.

Telephium repens, folio non deciduo. *Bauh. pin.* 287.

Helianthes species. *Lob. adv.* 405. *Dalech. hist.* 869.

Habitat in *Gallo-provincia*, non procul *Aquis-sextiis* & in arduis jugis *Bonaventurae*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

CORRIGIOLA,

I. CORRIGIOLA.

Corrigiola caule fasciculis florum terminato. *Hort. cliff.* 112. *Hall. helv.* 391.

Polygonifolia per terram sparsa, flore scorpioides. *Raj. hist.* 215.

Polygonum littoreum minus, flosculis spadiceo albican-
tibus. *Bauh. pin.* 281. *prodr.* 131. *Raj. hist.* 213. *Moriss. hist.* 2. p. 593. f. 5. t. 29. f. 1.

Alfene palustris minor, folio oblongo, repens, flosculis parvis racemi modo junctis albis rosaceis. *Lindl. alsat.* 115. t. 2. f. C.

Habitat in littoribus arenosis *Germaniae*, *Galliae*.

Hospitatur in *Vaporariis*, sæpe etiam *sub dio*, annua, cicur.

PENTAGYNIA.

ARALIA.

I. ARALIA caule folioso inermi.

Aralia ex alis florifera. *Hort. cliff.* 113.

Aralia canadensis. *Tournef. inst.* 30.

Angelica baccifera. *Raj. hist.* 661.

Panaces carpimos racemosa canadensis. *Corn. canad.* 74 t. 75.

Habitat in *Canada*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

S T A T I C E.

1. **STATICE** foliis radicalibus alternatim pinnato-sinuatis: caulinis ternis triquetris subulatis decurrentibus.

Statice foliis caulinis decurrentibus. *Hort. cliff.* 116.

Limonium rauwolfianum. *Clus. cur.* 33. t. 33.

Limonium pulchrum. *Rauv. itin.* 314. t. 314.

Habitat in *Sicilia*, *Boetica*, *Syria*, *Africa*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis.

Obs. Pulchra planta, calyce cæruleo, corolla nivea, angulis caulis membranaceis, repandis, pilis scabris.

2. **STATICE** foliis lanceolatis mucronatis radicalibus, caule ancipiti dichotomo, stipulis simplicibus.

Limonium elatius, plantaginis foliis procumbentibus in aculeum terminatis, floribus albis in capitula congestis. *Amm. ruth.* 129.

Limonium elatius, plantaginis foliis procumbentibus in aculeum terminatis, floribus albis spicatis. *Amm. ruth.* 130.

Limonium orientale, plantaginis folio, floribus umbellatis. *Tournef. cor.* 25. *Boerb. lugdb.* 1. p. 76. t. 36.

Limonium flosculis elegantissimis. *Raj. hist.* 397.

Habitat in montosis *Dauria*.

Hospitatur in *Frigidario*, biennis †.

L I N U M.

1. **LINUM** foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus acuminatis angulatis, capsulis mucronatis.

Linum ramis foliisque alternis lineari-lanceolatis, radice annua. *Hort. cliff.* 114.

- β. **Linum fativum.** *Baub. pin.* 214.

Linum. *Fuchf. hist.* 471.

Pharm LINI SATIVI Semina, Oleum.

Svecis Lin. *Gothis* Hör.

- γ. **Linum fativum humilius**, flore magno. *Boerb. lugdb.* 1. p. 284.

- δ. **Linum fativum latifolium africanum**, fructu majore. *Tournef. inst.* 339.

Habitat in *Africa*, nunc in *Hispania*, *Pannonia*, *Anglia*.

Hospitatur β in agris, annua planta.

2. LINUM foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus apice obtusis, capsulis muticis.

Linum perenne, ramis foliisque alternis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 114.

Linum perenne majus cæruleum, capitulo majore. *Morif. hist.* 2. p. 573.

Linum sylvestre cæruleum perenne erectius, flore & capitulo majore. *Raj. syn.* 3. p. 362.

Habitat in Sibiria.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. *Facies* Lini præcedentis, sed duplo major planta; flores majores & caulis magis ramosus; radix dein perennis. Foliola calycina quinque non angulata, aut carinata, quorum duo exteriora paulo minora, parum mucronata, reliqua tria concava, obtusissima, margine membranaceo, nec acuminibus patula. Capsulæ globosæ, nec acuminatæ. Corollæ cærulea, striata, ut in vulgari, sed integerrima.



C L A S S I S. VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

BROMELIA.

1. BROMELIA foliis spinosis, fructibus coalitis caulem cingentibus. *Hort. cliff.* 129.

Carduus brasiliensis, foliis aloës. *Bauh. pin.* 384.

Ananas acostæ. *Comm. hort.* 1. p. 109. t. 57.

Ananas aculeatus, fructu ovato: carne albida. *Plum. spec.* 20.

Svecis Ananas.

Habitat in *Nova Hispania*, *Surinama*.

Hospitatur in *Caldario* & *Vaporario*, sempervirens.

2. BROMELIA foliis spinosis oblique recurvis, fructibus dispersis racemosis.

Karatas foliis altissimis angustissimis & aculeatis, *Plum. gen.* 10. *Barr. æquin.* 64.

Habitat in *Gallia æquinoctiali*.

Hospitatur in *Caldario* & *Vaporario*, sempervirens.

TRADESCANTIA.

1. TRADESCANTIA. *Hort. cliff.* 127. *Gron. virg.* 36.

Moly f. Phalangium virginianum. *Rudb. elys.* 2. p. 166. f. 18.

Allium f. Moly virginianum. *Bauh. pin.* 516.

Ephemerum virginianum Joh. Tradescanti, *Pluk. alm.* 134.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Frigidario*, & sæpe sub dio, perennis.

GALANTHUS.

1. GALANTHUS. *Hort. cliff.* 134.

Leucojum bulbosum trifolium minus. *Bauh. pin.* 56. *Rudb. elys.* 2. p. 96. f. 4.

LeucoNarcisso - Lirion minimum. *Lob. hist.* 64.

Erangelia. *Reuealm. spec. 97. t. 96.*

Habitat in *Pannonia*, in saltibus *Viennensibus* ad radices *Alpium* inter *Tridentum* & *Venetias*.

Hospitatur *sub dio*, prima veris nuntia, sæpe florem e nive promens, martio mense, bulbosa.

LEUCOJUM.

1. LEUCOJUM. *Hort. cliff. 135.*

Leucojum bulbosum vulgare. *Baub. pin. 55. Rudb. elys. 2. p. 95. f. 1.*

Leucojum bulbosum hexaphyllum. *Dod. pempt. 230.*

Habitat in *Pannonia*, *Helvetia*, *Italia*.

Hospitatur *sub dio*, primo vere florens, bulbosa.

NARCISSUS.

1. NARCISSUS scapo unifloro, nectarii limbo rotato brevissimo.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario rotato brevissimo. *Hort. cliff. 134.*

Narcissus albus, circulo purpureo. *Baub. pin. 48.*

Narcissus medio purpureus. *Dod. pempt. 223.*

β. Narcissus medio purpureus multiplex. *Baub. pin. 54.*

Narcissus pleno flore. VI. *Clus. hist. 1. p. 161.*

Svecis Narciss.

Habitat in *Gallia Narbonensi* & *Italia*.

Hospitatur *sub dio*, cicur, bulbosa.

2. NARCISSUS scapo unifloro, nectarii limbo campanulato erecto, petala æquante.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario longitudine petalorum. *Hort. cliff. 134.*

Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. *Baub. pin. 52. Rudb. elys. 2. p. 71. f. 11.*

Narcissus luteus sylvestris. *Dod. pempt. 227. f. 1. 2.*

Svecis Påsk-lilja.

Habitat in umbrosis nemorosis *Angliæ*, *Italiæ*, *Hispaniæ*.

Hospitatur *sub dio*, cicur, bulbosa.

3. NARCISSUS scapo multifloro, nectario campanulato, foliis planis.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario campanulato erecto petalis longè breviorē, *Hort. cliff. 134.*

Narciss-

Narcissus medio luteus, copioso flore: odore gravi.

Bauh. pin. 50. Rudb. elys. 2. p. 57. f. 11.

β. Narcissus flore pleno. 1. 2. *Clus. hist. 1. p. 50.*

Svecis Tazette.

Habitat in *Gallia Narbonensi* & *Hispania marittimis.*

Hospitatur in *Caldario*, bulbosa.

4. NARCISSUS scapo multifloro, nectario campanulato brevi, foliis subulatis.

Narcissus foliis subulatis, florum nectario brevissimo.

Hort. cliff. 134.

Narcissus juncifolius, oblongo calyce, luteus major,

Bauh. pin. 51.

Narcissus juncifolius luteus minor. *Bauh. pin. 51.*

Narcissus juncifolius stellatus minor, parvo calyce.

Rudb. elys. 2. p. 65. f. 10.

Narcissus juncifolius 2. *Clus. hist. 1. p. 60.*

Narcissus juncifolius minor. *Clus. hist. 1. p. 160.*

Svecis Jonquille.

Habitat in uliginosis inter *Hispalim* & *Gades*, inter *Guadalopam* & *Toletum.*

Hospitatur in *Caldario*, bulbosa.

AMARYLLIS.

1. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla inæquali, genitalibus declinatis. *Hort. cliff. 135.*

Amaryllis formosissima. Act. Stockb. 1742. p. 93.

Narcissus Jacobæus major. *Rudb. elys. 2. p. 89. f. 10.*

Lilio-Narcissus Jacobæus, flore sanguineo rutilante.

Dill. elth. 195. t. 162. f. 196.

Svecis Den sköna.

Habitat in *Mexico.*

Hospitatur in *Caldario*, bulbosa.

2. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis revolutis, genitalibus strictis.

Amaryllis spatha multiflora, corollis æqualibus patentissimis revolutis, genitalibus longissimis. Hort. cliff. 135.

Narcissus japonicus, rutilo flore. *Corn. canad. 157. t. 158. Rudb. elys. 2. p. 93. f. 14.*

Lilium

Lilium farniense. Dugl. monogr. t. 1. 2.

Habitat in *Japonia*.

Hospitatur in *Caldario*, sed sterilis, bulbosa.

P O L I A N T H E S.

1. POLIANTHES floribus alternis. *Hort. cliff. 126.*

Fl. zeyl. 125.

Hyacinthus indicus tuberosus, flore hyacinthi orientalis. *Baub. pin. 47. Rudb. elys. 2. p. 38. f. 3.*

Hyacinthus indicus, tuberosa radice. *Clus. hist. 1. p. 176.*

Hyacinthus indicus tuberosus, flore narcissi. *Baub. pin. 47. Rudb. elys. 2. p. 39. f. 4.*

Svecis Tuberos.

Habitat in *India Orientali*, & *occidentali*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis. †.

C R I N U M.

1. CRINUM. *Hort. cliff. 127.*

Lilio-Asphodelus americanus sempervivens minor albus. Comm. rar. 15. t. 5.

Habitat in *America*.

Hospitatur in *Caldario*, sempervirens.

A L L I U M.

1. ALLIUM scapo nudo, foliis lanceolato sessilibus, umbella fastigiata.

Alium foliis lanceolatis, umbella laxa. *Hort. cliff. 127.*

Allium foliis radicalibus sessilibus lanceolatis, floribus umbellatis. *Roy. lygdb. 57. Hall. all. 45. n. 20.*

Moly latifolium luteum, odore allii. *Baub. pin. 75. Rudb. elys. 2. p. 162. f. 4.*

Moly flavo flore. Swert. floril. 1. t. 60. f. 2.

Habitat in *Hungaria*, *Baldo*, & circa *Monspelim*.

Hospitatur sub dio, bulbosa.

2. ALLIUM caule planifolio bulbifero, radice composita, staminibus tricuspидatis.

Allium radice bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Hort. cliff. 137.*

Allium sativum. Baub. pin. 73.

Allium. Cam. epit. 328.

Allium

Allium staminibus alterne trifidis foliis gramineis,
radicibus in unum bulbum congruentibus. *Hall. all. 5.*

Pharm. ALLII Radix, *Aqua*, *Acetum*.

Svecis Hvit-lök.

Habitat in *Sicilia*.

Hospitatur *sub dio*, oleracea, bulbosa.

3. ALLIUM scapo nudo inferne ventricoso longiore,
foliis teretibus.

Allium staminibus alterne trifidis, caule ad terram
ventricoso. *Hall. all. 24. n. 10.*

Cepa scapo ventricoso foliis longiore, radice depressa
Hort. cliff. 137.

Cepa rotunda. *Dod. pempt. 687.*

Cepa. *Cam. epit. 324.*

Cepa vulgaris, floribus & tunicis purpurascentibus
aut albis. *Tornef. inst. 382.*

Pharm. CEPÆ Semina.

Svecis. Röd-lök.

Habitat - - -

Hospitatur *sub dio*, oleracea, bulbosa, biennis.

4. ALLIUM caule planifolio umbellifero, rudice tu-
nicata, staminibus tricuspидatis.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, flori-
bus sphaerice congestis, radice tunicata cauli circum-
nata. *Hall. all. 18. n. 6.*

Porrum radice ambiente tunicata oblonga solitaria.
Hort. cliff. 136.

Porrum commune capitatum. *Bauh. pin. 72.*

Porrum. *Dod. pempt. 688.*

Pharm. PORRI Semina.

Svecis. Purio.

Habitat - - -

Hospitatur *sub dio*, oleracea, bulbosa, biennis.

- * ALLIUM caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis,
vaginis ancipitibus.

Porrum capitulo bulboso erecto, foliis planis sub-
crenatis, vaginis ancipitibus. *Fl. svec. 266.*

- β. Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifero,
scapo ante maturitatem contorto. *Hall. all. 8. n. 2.*

Al-

Allium sativum alterum f. *Allio-Praſum* caulis ſummo circumvoluto. *Baub. pin.* 73.

Allii genus *Ophioſcorodon* dictum quibusdam. *Baub. hiſt.* 2. p. 559.

Porrum radice laterali cordata ſolida, pedunculo revoluta, capite bulbifero. *Hort. cliff.* 136.

Svecis Råcken-båll.

Habitat in *Europa*, cum ex alio proveniat & in eundem degeneret iterum torto caule.

Hospitatur *ſub dio*, bulbosa.

6. **ALLIUM** caule ſubteretifolio umbellifero: pedunculis inferioribus brevioribus, ſtaminibus tricuspidatis.

Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis fiſtuloſis, capite ſuave rubente ſphærico, non bulbifero, radice laterali. *Hall. all.* 22. n. 8. f. 1.

Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis fiſtuloſis, capite ſphærico non bulbifero atropurpureo. *Hall. all.* 23. n. 9 t. 1. f. 1.

Allium f. *Moly juncifolium* capite ſphærico, flore purpureo. *Rudb. elyſ.* 2. p. 160. f. 20.

Moly atropurpureum. *Rudb. elyſ.* 2. p. 165. f. 13.

Habitat in *Helvetia*.

Hospitatur *ſub dio*, bulbosa.

Obſ. *Radicum bulbi catenulati*, ſcendentes quotannis profundius.

7. **ALLIUM** ſcapo nudo folia adæquante, foliis teretibus venticofis.

Allium ſtaminibus ſimplicibus, caule medio ventricoſo. *Hall. all.* 27. n. 11.

Cepa ſcapo longitudine foliorum, foliis ventricoſis, radice oblonga. *Hort. cliff.* 136.

Cepa oblonga. *Baub. pin.* 71. *Dod. pempt.* 687.

Svecis Piplök.

Habitat - - -

Hospitatur *ſub dio*, bulbosa.

- * **ALLIUM** ſcapo nudo folia adæquante, foliis teretibus ſubulato-filiformibus.

Allium ſtaminibus ſimplicibus, foliis radicalibus teretibus, ſcapo longitudine. *Hall. all.* 28. n. 12.

Cepa

Cepa scapis foliisque subulatis teretibus fistulosis æqualibus, spathis globosis. *Fl. Svec.* 264. *It. oel.* 53. 64.

3. Cepa scapo longitudine figuraque foliorum, foliis subulatis filiformibus, spathis globosis. *Hort. cliff.* 136.

Porrum sectivum juncifolium. *Bauh. pin.* 72.

SchœnoPrasum. *Dod. pempt.* 689.

Svecis Gräs-lök.

Habitat in Oelandia, Ingria, Alpibus. &c. unde hæc culta.

Hospitatur sub dio, bulbosa.

9. ALLIUM quod Cepa foliis subulatis, radicibus oblongis conglobatis. *Hort. cliff.* 136.

Cepa sterilis. *Bauh. pin.* 72.

Cepa ascalonica. *Morif. hist.* 2. p. 383. f. 4. t. 14. f. 3.

Svecis Charlotter.

Habitat in Palæstina?

Hospitatur sub dio, bulbosa.

Obs. Nullus vidit aut descripsit florentem, quod mirum; forte in hybernaculis sedula cultura flos eliceretur.

10. ALLIUM quod Cepa fistilis. *Cam. epit.* 326.

Cepa sectilis. *Bauh. pin.* 72.

Svecis Johannis-lök.

Habitat - - - flores nunquam vidi.

Hospitatur sub dio, bulbosa.

11. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus subtus convexis, umbella subglobosa, staminibus subulatis.

Allium scapo ancipiti teretiusculo, foliis ensiformibus: hinc paullo convexioribus. *Gmel. sibir.* 53. t. 11. f. 2.

Allium foliis linearibus, florum umbella subglobosa.

Roy. lugdb. 39.

Allium radice senescente lignosa transversa, umbella erecta. *Hall. all.* 16.

Habitat in Sibiria.

Hospitatur sub dio, bulbosa.

Descr. Folia narcissi. Scapus teretiusculus, valde anceps. Umbella subglobosa. Corollæ patulæ, purpurascens, petalis tribus exterioribus minoribus, stamina erecta, quorum tria alterna basi latiora, minime tamen emarginata.

12. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis subtus angulatis, scapo subancipiti, umbella fastigata.

Cepa

Cepa scapo nudo subangulato farcto, foliis linearibus subtus angulosis, staminibus corolla brevioribus.

Gmel. sibir. 1. p. 58. t. 14. f. 2.

Habitat in *Siberia* humidiusculis.

Hospitatur *sub dio*, bulbosa.

Descr. Folia linearia, solida, canaliculata, margine acuta, subtus parum angulata, erecta, obliqua. Scapus nudus, plusquam pedalis, erectus, teres, parum anceps, viridis, solidus. Spatha obtusa, ut in specie quinta Umbella erecta, disco hemisphærico, convexo. Corollæ ovato-erectæ, subcærulescentes, petalis acuminatis, interioribus alternis apice reflexis, exterioribus erectis. Stamina simplicia. Antheris obscuriusculis. Antecedenti simillima planta.

13. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus planis, filamentis tricuspидatis.

Porrum scapo nudo ancipiti antequam floruerit nutante, foliis ensiformibus, hinc paullo convexioribus.

Gmel. sibir. 1. p. 55. t. 18.

Habitat in *Siberia*.

Hospitatur *sub dio*, bulbus.

Descr. Folia fere *Narcissi*, sed digitum transversum lata, pedem fere longa, obtusa, glabra, plana, ancipitia. Caulis anceps, acutus, utrinque lateribus valde convexis, ante florescentiam a medio deorsum valde arcuatus, nutans, sed erigitur sub florescentia. Spatha subrotunda: Umbella subglobosa. Corolla patens, nivea: petalis concavis, obtusis, Stamina erecta, alba, quorum tria exteriora subulata, extrorsum flexa, tria vero interiora erectiora, inferne lata, acute trifida. Antheræ pallidæ. Stylus brevis.

L I L I U M.

1. LILIUM floribus sparsis oblongis, corollis campanulatis: intus glabris. *Hort cliff. 120.*

Lilium album, flore erecto, vulgare. *Baub. pin. 76. Rudb. elys. 2. p. 67. f. 1.*

Lilium candidum. *Dod. pempt. 197.*

Pharm. LILII ALBI Radix, Flores, Conserva, Aqua, Oleum, Antheræ.

Svecis Hvita Liljor.

Habitat in subhumidis *Syriæ*,

Hospitatur *sub dio*, squamato-bulbosa.

2. LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis erectis: intus scabris. *Hort. cliff. 120. Gmel. sibir. 1. p. 41.*

Lilium purpureo-croceum majus. *Baub. pin. 76.*

Lilium purpureum majus. *Dod. pempt. 198.*

β. Lilium bulbiferum. 1. 2. 3. 4. *Baub. pin. 77.*

Lilium bulbiferum minus. *Rudb. elys. 2. p. 171. f. 3.*

Lilium

Lilium cruentum secundum caulem bulbulis donatum.

Lob. ic. 166.

Svecis Brandgula Liljor.

Habitat in arvis *Italiae*, *Austriæ*, *Stiriæ*, *Sibiria*,

Hospitatur *sub dio*, squamato-bulbosa.

3. *LILIUM* foliis sparsis, floribus reflexis, corollis revolutis *Hort. cliff.* 120.

Lilium, floribus reflexis, angustifolium. *Baub. pin.* 78.

Lirium radice (*tunicata*), foliis sparsis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Gmel. sibir.* 1. p. 42.

Lilium reflexum montanum humile angustifolium aurantium. *Amm. ruth.* 105.

Lilium rubrum præcox. *Clus. hist.* 1. p. 133. opt.

Hemerocallis calcedonica purpureo-sanguinea polyanthos. *Lob. ic.* 169.

Habitat in *Asia*, in *Tataria* inter montes *Uralenses*, inque *Dauria*.

Hospitatur *sub dio*, squamato-bulbosa.

4. *LILIUM* foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Gmel. sibir.* 1. p. 44.

Lilium, floribus reflexis, latifolium. *Baub. pin.* 77.

Lilium sylvestre. *Dod. pempt.* 201.

3. *Lilium* floribus reflexis montanum, flore albicante. *Tournef. inst.* 370.

Svecis Kroll-Liljor.

Habitat in umbrosis *Austriæ*, *Hungariæ*, *Harcyniæ*, *Helvetiæ*.

Hospitatur *sub dio*, squamato-bulbosa.

FRITILLARIA.

1. *FRITILLARIA* foliis omnibus alternis.

Fritillaria e florum alis florens. *Hort. cliff.* 119.

Fritillaria præcox purpurea variegata. *Baub. pin.* 64.

Meleagris. *Dod. pempt.* 233. *Renealm. spec.* 147. t. 146.

3. *Fritillaria alba variegata.* *Baub. pin.* 64.

4. *Fritillaria alba præcox.* *Baub. pin.* 64.

Habitat in *Pyrenæis*, *Aquitania*, ad *Iberim* flumen.

Hospitatur *sub dio*, bulbosa.

Obs. *Hæc in præto Regio Upsaliensi copiose & sponte provenit hodie.*

1. *FRITILLARIA* foliis infimis oppositis.

Fritillaria flore minore. *Baub. pin.* 64.

- Frillaria flore minore. *Clus. hist. 2. p. 256. posth. 10.*
 Habitat in *Pyrenæis*.
 Hospitatur sub dio, bulbosa.
 Obs. Est hæc polyanthos. Folia 2. s. 3. s. 4. inferiora sunt opposita.
3. FRITILLARIA racemo nudiusculo, foliis obliquis.
 Fritillaria racemo nudo terminante. *Hort. cliff. 119.*
 Lilium persicum. *Baub. pin. 79.*
 Lilium fusianum. *Clus. hist. 1. p. 130.*
 Habitat in Oriente, a *Susis* enim in *Europam* venit.
 Hospitatur sub dio, bulbosa.
4. FRITILLARIA racemo comoso: inferne nudo.
 Petilium foliis lanceolatis. *Hort. cliff. 118.*
 Lilium s. Corona imperialis. *Baub. pin. 79.*
 Corona imperialis. *Dod. pempt. 202.*
Svecis Käjfar-krona.
 Habitat in *Persia*, unde *Constantinopolin*, & inde in *Europam* venit.
 Hospitatur sub dio, bulbosa.

TULIPA.

- * TULIPA scapo triphylo, foliis ovato-lanceolatis.
 Tulipa. *Hort. cliff. 118. Fl. svec. 262.*
- β. Tulipæ totum genus. *Baub. pin. 57. Clus. hist. 1. p. 138-151. Rudb. elys. 2. p. 98-112. f. 40. simul.*
- γ. Tulipa flore luteo-rubro variegato, petalis laciniatis.
Rudb. elys. 2. p. 108. f. 1.
 Monstrosa hæc *Hortulanis* audit varietas.
Svecis. Tulpan.
 Habitat in *Cappadocia*, unde in *Europam* venit 1559, nunc spontanea in
 plerisque regionibus.
 Hospitatur sub dio, bulbosa.
 Obs. Varietates hujus pulcherrimas numerosissimasque enumerare supervacaneum
 esset,

ERYTHRONIUM.

1. ERYTHRNIUM. *Lob. hist. 105. Hort. cliff. 119.*
Gmel. sibir. 1. p. 119.
 Dens canis latiore rotundioreque folio. *Baub. pin. 87.*
 Dens canis purpurascente flore. *Clus. hist. 1. p. 266.*
 Habitat in montibus *Liguria*, *Allobrogum*, *Styria*, *Tataria*.
 Hospitatur in *Frigidario* & sub dio, bulbosa.

ASPHODELUS.

1. ASPHODELUS caule simplici folioso, foliis trigonis fistulosis. *Hort. cliff.* 127.

Asphodelus luteus flore & radice. *Bauh. pin.* 28.

Asphodelus luteus. *Bauh. hist.* 2. p. 632.

Asphodelus femina. *Cam. epit.* 372.

Habitat in *Sicilia*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

2. ASPHODELUS caule nudo ramoso, foliis strictis subulatis striatis fistulosis.

Asphodelus caule nudo, foliis strictis. *Roy. lugdb.* 34.

Asphodelus foliis fistulosis. *Bauh. pin.* 29.

Asphodelus minor. *Clus. hist.* 1. p. 197.

Habitat in *Gallia Narbonensi*, *Gallo-provincia*, *Hispania*, *Creta*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

Deser. Caulis teres, ramosus, lævis. Folia scabriuscula, in aliis teretia, aliis introrsum s. superiori latere planiuscula. Stamina oblonga, gibba: alterna breviora. Vascularia Nectarii ut in præcedenti & Campanulis.

ANTHERICUM.

1. ANTHERICUM foliis carnosio-subulatis planiusculis.

Bulbine acaulis. *Hort. cliff.* 123.

Phalangium capense sessile, foliis aloëformibus pulposis. *Dill. elth.* 312. t. 232. f. 300.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Tepidario*, æstivat in *Apricario*, sempervirens, succulenta.

2. ANTHERICUM foliis carnosio-subulatis semi-teretibus striatis.

Habitat forte in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Tepidario*, succulenta, sempervirens.

Obs. Folia e radice numerosa, fere pedalia, subulata, supra planiuscula, angusto acuminata. Scapus foliis decuplo crassior, undique floribus luteis, staminibus barbatis instructis, imbricatis. Facies omnino Asphodeli.

3. ANTHERICUM foliis carnosio-subulatis teretibus.

Habitat in *Æthiopia*?

Hospitatur in *Tepidario*, æstivat in *Apricario*, sempervirens succulenta.

Obs. Plantæ præcedenti simillima, sed primo anno florens caule & foliis ternerrimis ut in *Cepa sectili*, *Differenatia* alias nulla.

4. ANTHERICUM foliis planis, caule simplicissimo.

Phalangium parvo flore, non ramosum. *Bauh. pin.* 29.

Moris. hist. 2. p. 333. f. 4. t. 1. f. 10.

Phalangium pulchrius non ramosum. *Bauh. hist.* 2. p. 635. *Raj. hist.* 1193.

Phalangium non ramosum. *Dod. pempt.* 106. *Lob. ic.* 48. *Dalech. hist.* 551.

Habitat in *Pyrenæis*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

SCILLA.

1. SCILLA radice tunicata. *Hort. cliff.* 122.

Scilla vulgaris, radice rubra. *Bauh. pin.* 73.

Scilla hispanica. *Clus. hist.* 1. p. 171.

Pharm. SCILLÆ Radix, *Acetum*.

Habitat in littoribus arenosis *Hispaniæ* & *Lusitaniæ*.

Hospitatur in *Tepidario*, bulbosa †.

ORNITHOGALUM.

1. ORNITHOGALUM fructificationibus secundis pendulis, filamentibus omnibus latis emarginatis. *Hort. cliff.* 124.

Ornithogalum exoticum, magno flore minore innato. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elys.* 137. f. 12.

Ornithogalum neapolitanum. *Clus. app.* 2. p. 9. t. 9.

Habitat in agro *Neapolitano*.

Hospitatur *sub dio*, bulbosa.

2. ORNITHOGALUM floribus corymbosis, pedunculis scapum superantibus, filamentis alternis emarginatis. *Hort. cliff.* 124.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium. *Bauh. pin.* 70.

Bulbus leucanthemos minor. *Dod. pempt.* 221.

Eliocarmos. *Renealm. spec.* 88. t. 87.

Habitat *Dresdæ*, *Pataviæ*, *Lugduni* & in *Germania* passim.

Hospitatur *sub dio*, bulbosa.

ASPARAGUS.

* ASPARAGUS foliis setaceis, caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 28. *Hort. cliff.* 120. *Fl. suec.* 272. *Gmel. sibir.* 1. p. 37.

β. Asparagus sativa. *Bauh. pin.* 489.

Asparagus sativus. *Dalech. hist.* 610.

Asparagus hortensis. *Dod. pempt. 703.*

Habitat in arenosis *Galliae, Angliae, Belgii, Germania, Scania*, sed cultus multa stercoreatione altius fit in hortis nostris.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

HYACINTHUS.

1. HYACINTHUS corollis infundibuliformibus semisextidis basi ventricosus. *Hort. cliff. 125. Roy. lugdb. 27.*

Hyacinthus orientalis. (*species 1-15.*) *Baub. pin. 44.*

Hyacinthus orientalis major & minor. *Dod. pempt. 216.*

Habitat in *Asia*, &c.

Hospitatur in *Tepidario* & in domibus, bulbosa.

2. HYACINTHUS corollis campanulatis semisextidis.

Hyacinthus, oblongo cæruleo flore, minor. *Baub. pin.*

44. Rudb. elys. 2. p. 27. f. 8.

Habitat in oriente, missa a Cl. Gmelino.

Hospitatur *sub dio*, bulbosa.

Obs. *Planta bulbosa, foliis linearibus, longitudine caulis. Scapus Hyacinthi orientalis sed minor. Corollæ cæruleæ hyacinthi orientalis magnitudine, sed basi nec ventrosæ, nec oris ita revolutis, quamvis patulis, ad dimidium tantum sectæ.*

3. HYACINTHUS corollis ovatis. *Hort. cliff. 126.*

Hyacinthus racemosus moschatus. *Baub. pin. 43. Rudb. elys. 2. p. 25. f. 8.*

Muscari obsoletiore flore. *Clus. hist. 1. p. 178.*

Habitat in *Asia* ultra *Bosphorum*.

Hospitatur *sub dio*, bulbosa.

4. HYACINTHUS corollis globosis. *Hort. cliff. 126.*

Hyacinthus racemosus cæruleus major. *Baub. pin. 42.*

Rudb. elys. 2. p. 23. f. 1.

Hyacinthus botryoides cæruleus amœnus. *Lob. ic. 108.*

Muscari cæruleum majus. *Tournef. inst. 347.*

Habitat in *Italia*.

Hospitatur *sub dio*, bulbosa.

A L O E.

1. ALOE foliis lanceolatis planis erectis radicatis. *Hort. cliff. 132. Fl. zeyl. 130.*

Aloe zeylanica pumila, foliis variegatis. *Comm. hort.*

2. p. 41. t. 21. Pluk. alm. 19. t. 256. f. 5.

Habitat in *Zeylona*.

Hospitatur in *Caldario*, sempervirens succulenta.

2. ALOE foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus. *Hort. cliff.* 131.

α. Aloë africana caulescens, foliis glaucis brevissimis. *Comm. præl.* 73. *t.* 22. *rar.* 45. *t.* 45.

β. Aloë africana caulescens, foliis glaucis caulem amplectentibus. *Comm. hort.* 2. *p.* 27. *t.* 14.

γ. Aloë africana caulescens, foliis spinosis maculis ab utraque parte albicantibus notatis. *Comm. hort.* 2. *p.* 9. *t.* 5.

Aloë africana mitræformis spinosa. *Dill. elth.* 21. *t.* 17. *f.* 12.

Habitat in rupibus *Africae*.

Hospitatur in *Caldario*, sempervirens succulenta.

3. ALOE foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. cliff.* 130.

Aloë vera vulgaris. *Baub. pin.* 386.

Aloë. *Dod. pempt.* 359. *Clus. hist.* 2. *p.* 160.

Pharm ALOES HEPATICÆ Succus, lotus, *Tinctura*, *Extractum*.

Svecis Semperviv.

Habitat in Campestribus aridis saxosis *Jamaicae*, *Barbados*, *Brasilæ*, *Malabaricae*, *Succotræ* insulæ, *Palæstinae*.

Hospitatur in *Caldario*, sempervirens, succulenta.

4. ALOE foliis lingviformibus patulis distichis. *Hort. cliff.* 132.

Aloë africana, flore rubro, foliis maculis albicantibus ab utraque parte notato. *Com. hort.* 2. *p.* 15. *t.* 8.

Aloë africana sessilis, foliis carinatis verucosis. *Dill. elth.* 22. *t.* 18. *f.* 20.

Habitat in rupibus saxosis *Africae*.

Hospitatur in *Caldario*, sempervirens, succulenta.

Obs. Foliorum margo ad altera parte tenuis, ab altera vero latus.

5. ALOE foliis ovato-lanceolatis carnosissimis, apice triquetris: angulis inerme dentatis. *Hort. cliff.* 131.

α. Aloë africana atro-viridis, spinis herbaceis numerosis ornata. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 131. *t.* 131.

β. Aloë africana humilis arachnoidea. *Comm. præl.* 78. *t.* 27.

Habitat in Campis *Africae*,

Hospitatur in *Caldario*, sempervirens succulenta.

6. ALOE foliis rhomboidalibus crassis quinque fariam positis radicatis: apice triquetris plano exstantibus.

Hort. cliff. 133.

Aloë africana brevissimo crassissimoque folio, flore viridi. *Comm. hort.* 2. p. 11. t. 6. *Till. pis.* 6. t. 5.

Habitat in argillofis *Africa*.

Hospitatur in *Caldario*, sempervirens succulenta.

7. ALOE foliis ovatis acuminatis caulinis quinque fariam imbricatis. *Hort. cliff.* 132.

Aloë africana erecta rotunda, folio parvo & in acumen acuminatissimum abeunte. *Comm. præl.* 83. t. 32. *Dill. elth.* 116. t. 13. f. 14.

Habitat in Campestribus *Africa*.

Hospitatur in *Caldario*, sempervirens succulenta.

8. ALOE foliis caulinis trifariam imbricatis, caulinis apice reflexo-patulis. *Hort. cliff.* 132.

Aloë africana erecta, triangularis & triangulari folio viscoso. *Comm. præl.* 82. t. 31. *Till. pis.* 6. t. 5. *Dill. elth.* 15. t. 13. f. 13.

Habitat in campestribus *Africa*.

Hospitatur in *Caldario*, sempervirens succulenta.

9. ALOE foliis canaliculatis trifariam imbricatis radicatis erectis: angulis ternis cartilagineis. *Hort. cliff.* 132.

Aloë africana humilis, foliis ex viridi & albo variegatis. *Comm. præl.* 79. t. 28. *rar.* 47. t. 47. *Till. pis.* 7. t. 7.

Habitat in argillofis *Africa*.

Hospitatur in *Caldario*, sempervirens succulenta.

A G A V E.

1. AGAVE foliis spinoso dentatis mucronatisque.

Aloë foliis lanceolatis dentatis, spina cartilaginea terminatis radicalibus. *Hort. cliff.* 131.

Aloë foliis in oblongum aculeum abeunte. *Bauh. pin.* 286.

Aloë ex america. *Clus. hist.* 2. p. 160. *Dod. pempt.* 359.

Habitat in *America Calidior*.

Hospitatur in *Frigidario*, sempervirens succulenta.

Obs. Re diu & bene pensitata non licet aloës Americanas Asiaticis vel Africanis miscere, cum in his corollæ regulares, stamina longiora, germen infra receptaculum floris; quod in Africanis non obtinet.

Ideoque novo confecto genere, novum nomen inponatur. Africanæ & Asiaticæ utpote officinales, diutius notæ retineant nomen officinale &

nitatissimum; aliud his imponatur, inter synonyma nullum dignum occurrit, licet antiquo generi antiquum nomen competeret, ideoque dixi *Agave* quasi plantam admirabilem.

Y U C C A.

1. YUCCA foliis margine integerrimis. *Hort. cliff.* 130.

Yucca foliis aloes. *Baub. pin.* 91.

Yucca peruviana. *Raj. hist.* 1201.

Habitat in *Canada*, *Peru*.

Hospitatur *sub dio*, per hyemem in *Tepidario*, sempervirens subsucculenta.

2. YUCCA foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130.

Yucca draconis folio serrato reflexo. *Dill. elth.* 437.

t. 324. *f.* 417.

Aloe americana, *draconis* folio serrato. *Comm. præl.* 42.

67. *t.* 16.

Draconi arbori affinis americana. *Baub. pin.* 506.

Habitat in *America*.

Hospitatur in *Tepidario*, æstivat in *Apricario*, sempervirens subsucculenta.

H E M E R O C A L L I S.

1. HEMEROCALLIS scapo ramoso, corollis monopetalis.

Hemerocallis radice tuberosa, corollis monopetalis.

Hort. cliff. 128.

- α. *Lilio-Asphodelus puniceus.* *Clus. hist.* 1. p. 137.

Lilium rubrum, *asphodeli* radice. *Baub. pin.* 80.

- β. *Hemerocallis* radice tuberosa, corollis monopetalis luteis. *Gmel. sibir.* 1. p. 37.

Lilio-Asphodelus luteo flore. *Clus. hist.* 1. p. 137.

Lilium luteum, *asphodeli* radice. *Baub. pin.* 80. *Rudb. elys.* 2. p. 184. *f.* 1.

Habitat α in uliginosis prætis *Hungariæ*; β in campis *Sibiria*.

Hospitatur *sub dio*, cicur, tuberoso-perennis.

Obs. Varietas α gaudet corolla duplo majore, fulva, petalis magis lateribus undulatis & venosis; planta etiam duplo major est. β. Gaudet corolla duplo minore, flava, petalis ad latera nec undatis nec venosis, odore alio, stylo incurvo cum in α sepius rectior, licet declinatus sit, ut quivis facile differentiam observet, at specificam differentiam dare difficile est.

H Æ M A N T H U S.

1. HÆMANTHUS foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 127.

Hæmanthus colchici foliis, perianthio herbaceo. *Dill. elth.* 167. *t.* 140. *f.* 167.

Hya-

Hyacintho affinis africana, bulbosa radice. *Seb. thes.*

1. p. 20. t. 12. f. 1. 2. 3.

Orchis f. Satyrium e guinea. *Swert. flor.* 1. p. 62. f. 3.

Moris. hist. 3. p. 491. f. 12. t. 12. f. 11.

Satyrium ex guinea. *Rudb. elys.* 2. p. 210. f. 3.

Habitat in *Æthiopia* & *Guinea*.

Hospitatur in *Caldario*, bulbosa.

TRIGYNIA

RUMEX.

1. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis integerimis, granulo notatis. *Hort. cliff.* 138.

Lapathum folio acuto rubente. *Bauh. pin.* 115.

Lapathum sanguineum f. Sanguis dracionis herba. *Bauh. hist.* 2. p. 988.

Lapathum rubens. *Dod. pempt.* 650. *Cam. epit.* 229.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur sub dio, biennis.

2. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis hastatis. *Hort. cliff.* 138.

Acetosa rotundifolia hortensis. *Bauh. pin.* 114.

Oxalis rotundifolia. *Dod. pempt.* 649.

Pharm. ACETOSÆ ROTUNDIFOLIÆ Herba.

Svecis Romersk Syra.

Habitat inter acervos lapidum *Helvetiæ*, *Gallo-provinciæ*.

Hospitatur sub dio, perennis, oleracea.

3. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis trifido setaceis, unica granulo notatis.

Lapathum ægyptiacum annuum, parietariæ foliis, capsula feminis longius barbata. *Till. pis.* 43. t. 37. f. 1.

Lapathum ægyptiacum, capsula feminis alba & cretata. *Dill. elth.* 191. t. 158. f. 191.

Habitat in *Ægypto*.

Hospitatur sub dio, annua, †.

4. RUMEX floribus androgynis, calycibus femineis monophyllis: valvulis exterioribus reflexo-uncinatis.

Rumex floribus androgynis, calycibus fructus uncinatis. *Hort. cliff.* 139.

Beta cretica, femine aculeato. *Bauh. pin.* 118. *prodr.* 57.

Beta cretica, semine spinoso. *Bauh. hist.* 2. p. 962.

Spinachia cretica supina, capsula feminis aculeata.

Tournef. inst. 533.

Habitat in Creta & Sicilia.

Hospitatur sub dio, annua.

5. RUMEX floribus hermaphroditis geminatis, valvularum alis maximis membranaceis reflexis. *Hort. cliff.* 139. *Roy. lugdb.* 230.

Acetosa americana, foliis longissimis pediculis donatis. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 54. *Morif. hist.* 2. p. 583. f. 5. t. 28. f. 7.

Habitat in Africa & in America.

Hospitatur sub dio, annua.

- * KUMEX floribus dioicis, foliis oblongo-sagittatis. *Virid. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 139. *Fl. Lapp.* 130. *Fl. svec.* 295.

Acetosa hispanica maxima. *Rupp. Hall.* 58.

Acetosa hispanica. *Comm. hort.* 4.

Svecis Spank Syra.

Habitat in *Lapponia* alpibus.

Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

7. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis nudis tridentatis, pedicellis planis reflexis.

Rumex fructibus dentatis, calyce reflexis, caput bovinum referentibus. *Hort. cliff.* 139.

Acetosa, ocymi folio, neapolitana. *Bauh. pin.* 114.

Morif. hist. 2. p. 584. f. 5. t. 28. f. 14.

Acetosa, ocymi folio, bucephalophoros. *Column. ecphr.*

1. p. 150.

Habitat Neapoli.

Hospitatur sub dio, annua.

COLCHICUM.

1. COLCHICUM foliis lanceolatis planis erectis. *Hort. cliff.* 140.

Colchicum commune. *Bauh. pin.* 67.

Colchicum. *Fuchs. hist.* 356.

Svecis Nakna Jungfrur.

Habitat in pingvibus graminosis *Anglia*, *Austria*, *Lusitania*.

Hospitatur sub dio, perennis, floret mense septembri, fructum proximo vere promit & æstate maturat.

M E N I S P E R M U M.

1. MENISPERMUM foliis peltatis angulosis. *Hort. cliff.* 140, *Gron. virg.* 153.

Menispermum canadense scandens, umbilicato folio. Tournef. art. 1705. p. 311.

Hedera monophyllos, convolvuli foliis, virginiana. Pluk. alm. 181. t. 36. f. 2.

Habitat in *Virginia, Canada*

Hospitatur in *Frigidario*, perennis, Volubilis.

S A U R U R U S.

1. SAURURUS foliis cordatis petiolatis, spicis solitariis recurvis.

Saururus foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, spicis solitariis propendentibus, folio brevioribus. Roy. lugdb. 8.

Saururus foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, spicis solitariis, folio longioribus. Hort. cliff. 139. *Gron. virg.* 40.

Saururus marilandicus, folio cordato. Raj. hist. 642.

Serpentaria repens, floribus stamineis spicatis, bryoniæ nigræ folio ampliore pingui, virginensis. Pluk. alm. 343. t. 117. f. 4.

Serpentaria f. Persicaria virginiana, foliis cordatis, floribus spicatis, femineis albis. Eichr. carolsrb. 41.

Habitat in madidis aquosis *Virginia, Marilandia.*

Hospitatur in *Caldario*, perennis, repens, luxurians & florens, modo propagentur radices, ne minus dense crescant.

T E T R A G Y N I A.

P E T I V E R I A.


1. PETIVERIA. *Hort. cliff.* 141. *Act. stockh.* 1744. p. 287. t. 7.

Petiveria solani foliis, loculis spinosis. Plum. gen. 50.

Verbenæ aut Scorodoniæ affinis anomala, flore albidō, calyce aspero, allii odore. Sloan. flor. 64. *hist.* 1. p. 172. *Raj. suppl.* 287.

Habitat in Sylvis umbrosis *Jamaica.*

Hospitatur in *Caldario*, ubi naturificata, quotannis semina perficit & ferit, frutex sempervirens.



CLASSIS. VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

ESCULUS.

I. ESCULUS floribus heptandris.

Esculus. *Hort. cliff.* 142.

Hippo-castanum vulgare. *Tournef. inst.* 612.

Castanea folio multifido. *Baub. pin.* 419.

Castanea equina. *Clus. hist.* 1. p. 7. *Dalech. hist.* 33.

Svecis Hæst-Castanier.

Habitat in *oriente*, unde *Europæ* innotuit non ante 1550.

Hospitatur *sub dio*, sæpe in magnas arbores enata & naturificata.



CLASSIS VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

TROPÆOLUM.

1. TROPÆOLUM foliis subquinelobis, petalis obtusis.

Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff.* 143.

Cardamindum ampliore folio & majori flore. *Tournef. inst.* 430. *Fevill. peruv.* 3. p. 14. t. 8.

Viola indica scandens, nasturtii sapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628. t. 629.

Pharm. NASTURTII INDICI Herba.

Svecis Indianisk krasse.

Habitat in Peru unde cura *Beverningii* in Europam translatum. 1684.

Hospitatur sub dio, hinc annua.

2. TROPEOLUM foliis integris, petalis acuminato-setaceis.

Cardamindum minus & vulgare. *Tournef. inst.* 430. *Fevill. peruv.* 3. p. 14. t. 8.

Nasturtium indicum minus. *Bauh. pin.* 306.

Nasturtium indicum. *Lob. ic.* 166. f. 2. 1. *Dod. pempt.* 397. *Dalech. hist.* 657.

Habitat in Peru & Lima.

Hospitatur plerumque in *Frigidario*, nobis annua.

A C E R.

1. ACER foliis quinelobis acutis obtuse ferratis, petiolis canaliculatis.

Acer foliis palmatis obtuse ferratis, floribus subapetalis racemosis. *Hort. cliff.* 143. n. 1.

Acer montanum candidum. *Bauh. pin.* 430.

Acer majus. *Dod. pempt.* 840. *Lob. hist.* 614.

Habitat in montibus altissimis humectis *Helvetiae*, *Austriæ*.

Hospitatur sub dio, sæpe in magnas arbores enata.

2. ACER

2. ACER foliis quinquelobis acuminatis acute ferratis, petiolis teretibus.

Acer foliis palmato-angulatis, floribus subapetalis sessilibus, fructu pedunculato corymboso. *Gron. virg.* 41.

Acer virginianum, folio subtus incano, flosculis viridi rubentibus. *Herm. parad.* 1. t. 1.

Acer virginianum, folio majore: subtus argenteo, supra viridi-splendente. *Pluk. alm.* 7. t. 2. f. 2. *Catesb. carol.* 1. p. 62. t. 32.

Acer occidentale, folio minore subtus incano: supra atrovirente. *Raj. hist.* 1701.

Habitat in Virginia, Carolina Noveboraco.

Hospitatur in Frigidario, Arbor †.

Obs, Petioli teretes, ut in prima specie, sed supra non canaliculati. Folia acute & confertim serrata. Corolla a perianthio non distinguenda. E singula gemma flores quinque primo sessiles, demum pedunculati.

O E N O T H E R A.

1. OENOTHERA foliis ovato lanceolatis planis. *Virid. cliff.* 33. *Roy. lugdb.* 251. *Gron. virg.* 254.

Oenothera foliis ovato-lanceolatis denticulatis, floribus lateralibus in summo caulis. *Hort. cliff.* 144.

Lyfimachia lutea corniculata. *Baub. pin.* 245. 516.

Lyfimachia lutea corniculata non papposa virginiana major. *Morif. hist.* 2. p. 271. f. 3 t. 11. f. 7.

Habitat in Virginia, circa 1620, in Europam translata, nunc in Belgio, Italia, Gallia, Germania spontanea.

Hospitatur sub dio, biennis, cicur.

D A P H N E.

1. DAPHNE floribus racemosis lateralibus, foliis lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 147. *Roy. lugdb.* 208.

Laureola sempervirens, flore viridi, quibusdam Laureola mas. *Baub. pin.* 462.

Daphnoides f. Laureola. *Dalech. hist.* 211. *Lob. hist.* 200. *Pharm.* MEZEREI Cortex.

Habitat in Sepibus Angliæ, Italiæ.

Hospitatur in Frigidario, frutex.

DIGYNIA.

MOERHINGIA.

1. MOERHINGIA pedunculis unifloris.
 Alfine tetrapetala, foliis perangustis longissimis. *Hall. helv.* 390.
 Alfine montana, capillaceo folio. *Baub. pin.* 251. *Pluk. alm.* 23. t. 75. f. 1.
 Alfine saxifraga angustifolia minima montana. *Col. ecphr.* 1. p. 292. t. 290.
 Alfine tenuifolia muscosa. *Baub. pin.* 251. *Moris. hist.* 2. p. 551. f. 5. t. 23. f. 12.
 Habitat in Alpibus *Helvetiae*.
 Hospitatur sub dio, †.

TRIGYNIA.

BISTORTA.

1. BISTORTA foliis ovato-oblongis acuminatis. *Hort. cliff.* 150.
 Bistorta major, radice magis intorta. *Baub. pin.* 192.
 Bistorta. *Cam. epit.* 683.
Pharm. BISTORTÆ Radix.
 Habitat in montibus *Monspeli*, *Geneva*, *Austria*, *Stiria*, *Helvetiae*.
 Hospitatur sub dio, cicur, perennis.

POLYGONUM.

1. POLYGONUM caule fruticoso, foliolis calycinis duobus reflexis.
 Atraphaxis inermis, foliis planis. *Hort. cliff.* 138.
 Lapathum orientale frutex humilis, flore pulchro. *Tournef. cor.* 38.
 Lapathum dauricum montanum fruticans, ramis late sparsis, folio oblongo angusto plano rigidiusculo arrecto, semine in longis flagellis magno. *Amm. ruth.* 227.
 Habitat in *Sibiria*, *Dauria*.
 Hospitatur in *Frigidario*, & interdum sub dio, frutescens.
 Obs. Corolla quinquepartita laciniis duabus viridibus reflexis: reliquis tribus patentibus coloratis. Stigmata tria. Styli nalli, stamina octo.

H E L X I N E.

1. HELXINE caule erectiusculo inermi, foliis cordato-sagittatis, feminibus subdentatis.

Helxine caule erecto inermi, foliis cordatis sagittatis, feminum angulis dentatis. *Hort. cliff.* 151.

Fagopyrum erectum, fructu aspero. *Amm. ruth.* 242.

1e Fagopyrum erectum, fructu ex calyce eminento serrato. *Hall. gotting.* 590.

Fago-triticum sibiricum. *Act. stockh.* 1744. p. 117. t. 4.

Svecis Siberisk Bohvete.

Habitat in *Tartaria* ad Argunienfes officinas.

Hospitatur *sub dio*, annua.

2. HELXINE caule erectiusculo inermi, foliis cordato-sagittatis, feminibus integerrimis.

Helxine caule erectiusculo inermi, foliis cordato-sagittatis. *Hort. cliff.* 151. *Fl. Svec.* 217.

- β. Erysimum cereale, folio hederaceo. *Baub. pin.* 27. *theatr.* 538.

Ochymum cereale. *Tabern. hist.* 276.

Svecis. Bohvete.

Habitat in *Asia*.

Hospitatur *sub dio*, annua, seritur copiose in *scania campestri*.

3. HELXINE foliis ovatis, caule recto inermi.

Perficaria florum staminibus sex plurisve, stylo duplici. *Hort. cliff.* 42.

Perficaria orientalis, nicotianæ folio, calyce florum purpureo. *Tournef. cor.* 38. *itin.* 316. *Comm. rar.* 43.

t. 43

Habitat in *Oriente*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

Obs. Habet Flos glandulas nectariferas, proin genuina species Helxines est.

4. HELXINE foliis lanceolatis, caule diffuso.

Fagopyrum orientale ramosum & multiflorum, perficariæ folio. *Tournef. cor.* 39. *Buxb. cent.* 2. p. 31. t. 31.

Perficaria montana, foliis longioribus & angustioribus, floribus racemosis. *Amm. ruth.* 167.

Perficaria alpina altera saxatilis, foliis durioribus acutis. *Bocc. mus.* 2. p. 108. t. 83.

Habi-

Habitat in *Corsicæ*, *dæ*, *Ingodæ*, *Nagaicæ montosis*.

Hospitatur *sub dio*, perennis, cicut.

Obf. Glandulæ nectariferæ demonstrant et hanc genuinam esse speciem *Helxines*.

P A U L L I N I A.

1. PAULLINIA foliis simplicibus lanceolatis ferratis.
Lupulus sylvestris americana, claviculis donata. *Pluk.*
alm. 229. *t.* 201. *f.* 4.

coryli f. avellanæ folio oblongo Frutex convolvula-
ceus, capreolatus americanus. *Pluk. phyt.* 162. *f.* 3.

Habitat in *Barbados*.

Hospitatur in *Caldario*, duobus annis egregie scandens, non dum vero flo-
rens; semina misit clariss. B. Jussæus.

C A R D I O S P E R M U M.

1. CARDIOSPERMUM. *Hort. cliff.* 151. *Fl. zeyl.* 142.
Halicacabus peregrinus. *Dod. pempt.* 455.

Pisum vesicarium, fructu nigro alba macula notato.
Bauh. pin. 143.

Corindum ampliore folio, fructu majore. *Tournef. inst.*
431.

Habitat in *India Occidentali* & *Orientali*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.



CLASSIS. IX.

ENNEANDRIA

MONOGYNIA.

LAURUS.

1. LAURUS foliis lanceolatis venosis perennantibus,
corollis quadrifidis. *Hort. cliff.* 155.

Laurus vulgaris. *Baub. pin.* 460.

Laurus. *Dod. pempt.* 849. *Dalech. hist.* 351.

Pharm. LAURI Baccæ, *Aqua*, *Oleum*, *Oleum*, *Folia*
Svecis Lager.

Habitat in *Italia*, in Monte *Atbo*.

Hospitatur in *Frigidario* per hyemes; *sub dio* æstate; Arbor.

TRIGYNIA.

RHEUM.

1. RHEUM foliis glabris.

Rheum. *Hort. cliff.* 155.

Rhaponticum. *Alp. rhap.* 1. t. 1.

Rhaponticum folio lapathi majoris glabro. *Baub. pin.* 1100.

Rhabarbarum rotundifolium verum. *Munt. brit.* 97..

Pharm. RHAPONTICI Radix.

Svecis Munk - rabarbar.

Habitat in *Thracia*, *Scythia*.

Hospitatur *sub dio*, perennis cicur.

2. RHEUM foliis subvillosis.

Rhabarbarum finense, folio crispo, flagellis rarioribus & minoribus. *Amm. herb.* 206.

Lapathum bardanæ folio undulato glabro. *Hort. chels.*

Pharm. RHABARBARI VERI Radix, *Essentia*, *Extractum*

Svecis Æcta Rhabarber.

Habitat in *China*.

Hospitatur *sub dio*, perennis, cicur.

Obs. Vix specie differt apriori, ita similis; folia tamen magis oblonga, magis ad margines undulata, & magis villosa. Caulis florens magis altus, magis angustus floribusque minus densis, cætera eadem cum præcedente.

CLASSIS. X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

CERCIS.

1. CERCIS foliis cordato-orbiculatis glabris. *Hort. cliff.* 156.

Siliqua sylvestris rotundifolia. *Baub. pin.* 402.

Arbor Judæ. *Dod. pempt.* 786.

Habitat in *Gallia Narbonensi, Hispania, Italia.*

Hospitatur in *Frigidario*, arbor.

2. CERCIS foliis cordatis pubescentibus. *Hort. cliff.* 156.
Gron. virg. 41.

Siliquastrum canadense. *Tournef. inst.* 647.

Siliqua sylvestris rotundifolia canadensis. *Tournef. schol.* 26.

Ceratia agrestis virginiana, folio rotundo minori.

Raj. dendr. 100. *Pluk. alm* 95.

Arbor judæ americana. *Raj. hist.* 1718.

Habitat in *Virginia, Canada.*

Hospitatur in *Frigidario*, arbor.

BAUHINIA.

1. BAUHINIA foliis cordato-subrotundis: lobis rotundatis. *Hort. cliff* 157. *Fl. zeyl.* 147.

Bauhinia folio subrotundo, flore flavescente striato.

Burm. zeyl. 44. t. 18.

Mandaru maderaspatense, foliis firmioribus bisulcis glabritie splendentibus, ad surculum densius stipatis. *Pluk. alm.* 240. t. 44. f. 6.

Habitat in utraque *India.*

Hospitatur in *Caldario*, non dum floruit, Arbor.

PARKINSONIA.

1. PARKINSONIA. *Hort. cliff.* 157. t. 13.

Parkinsonia aculeata, foliis minutis uni costæ adnexis.

Plum. gen. 25.

Parkinsonia aculeata, foliis mimosæ uni costæ adfixis.

Walth. hort. 6. t. 13.

Habitat in *America Calidior*e.

Hospitatur per totum annum in *Caldario*, Arbor.

Descr. Frutex humanæ altitudinis, sæpe e singula Gemma seu costa brevissima promit quatuor (non duo) folia partialia pinnata, cum tenerior tantum duo ejusmodi folia producat, uti in figura Horti Cliffortiani videre est.

CASSIA.

1. CASSIA foliolis trium parium ovatis glabris: inferioribus rotundioribus minoribus, interjecta glandula globosa. *Hort. cliff.* 159. n. 11. *Roy. lugdb.* 468.

Cassia hexaphylla, filiqua bicapsulari. *Plum. spec.* 18.

Habitat in *America Calidior*e.

Hospitatur per totum annum in *Caldario* ubi Frutex humanæ altitudinis nondum floruit.

2. CASSIA foliolis octo parium ovali-oblongis: inferioribus minoribus, petiolis glandula destitutis, stipulis patulis. *Hort. cliff.* 158.

Cassia sylvestris foetida, filiquis alatis. *Plum. spec.* 18.

Zoote-boonen-bom. *Merian. surin.* 58. t. 58.

Habitat in *Surinamo*.

Hospitatur in *Caldario*, arbor.

3. CASSIA foliolis trium parium obverse ovatis, glandula subulata inter infima. *Roy. lugdb.* 468. *Fl. zeyl.* 152.

Cassia humilis, filiquis fœneu græci. *Plum. spec.* 18.

Cassia filiqua quadrangulâri. *Dill. elth.* 72. t. 63. f. 73.

Habitat in *India orientali*.

Hospitatur in *Caldario*, annua apud nos.

4. CASSIA foliolis septem parium lanceolatis: extimioribus fere minoribus, glandula supra basin petiolorum. *Hort. cliff.* 199. *Gron. virg.* 47.

Senna ligustri folio. *Plum. spec.* 10. *Dill. elth.* 350. 269. f. 338.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Tepidario*, æstate sub dio.

5. CASSIA foliolis octo parium ovato-oblongis æqualibus, glandula baseos petiolorum. *Hort. cliff.* 159.

Cassia

Cassia marilandica, pinnis foliorum oblongis, calyce floris reflexo. *Mart. cent.* 23. t. 23.

Cassia mimosæ foliis, filiqua hirsuta. *Dill. elth.* 351. t. 260. f. 339.

Habitat in *Terra Mariana*.

Hospitatur in *Caldario*.

6. *CASSIA* foliolis numerosis, glandula petioli pedicellata, stipulis subulatis.

Cassia foliolis plurimorum parium linearibus, stipulis subulatis. *Hort. cliff.* 158.

Senna occidentalis, filiqua multiplici, folio herbæ mimosæ. *Sloan. flor.* 143. *hist.* 2. p. 51. *Raj. supplement.* 482.

ChamæCrista pavonis major *Comm. hort.* p. 53. t. 27.

ChamæCrista pavonis americana, filiqua multiplici. *Breyn. cent.* 24. t. 24.

Habitat ad viarum margines *Jamaica*, *Barbados*, *Curacao*, *Virginia*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

7. *CASSIA* calycibus acutis, floribus pentandris. *Hort. cliff.* 497. t. 36.

Senna spuria virginiana, mimosæ foliis, floribus parvis nictitantibus. *Pluk. alm.* 341. t. 314. f. 3.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Vaporariis*, annua.

P O I N C I A N A.

1. *POINCIANA* aculeis geminis.

Poinciana floribus duplicato-pinnatis, foliolis oblongo-ovalibus, caule inermi. *Hort. cliff.* 158 *Fl. zeyl.* 159.

Poinciana flore pulcherrimo. *Tournef. inst.* 619.

Flos pavonis. *Merian. surin.* 45. t. 45.

Tsietti-mandarum. *Rhed. mal.* 6. p. 1. t. 1.

Habitat in utraque *India* calidiori.

Hospitatur in *Caldario* toto anno, frutex †.

G U I L A N D I N A.

1. *GUILANDINA* aculeata, foliolis ovalibus cum acumine. *Fl. zeyl.* 156.

Bonduc vulgare minus polyphyllum. *Plum. gen.* 25.

Lobus echinatus, fructu cæcio, foliis longioribus. *Herm. prodr.* 348.

Caretti. *Rheed. mal.* 2. p. 35. t. 22.

Habitat in utraque *India*.

Hospitatur in *Caldario*, †, frutex.

CÆSALPINA.

1. CÆSALPINA aculeis recurvis: foliolis ovatis. *Fl. zeyl.* 157.

Acacia gloriosa, lentisci folio, spinosa, flore spicato luteo, filiqua magna. *Pluk. alm.* 4. t. 2. f. 2.

Crista pavonis, glycyrrhizæ folio, minor repens spinosissima, flore luteo spicato minimo, filiqua latissima echinata, semine rotundo cinereo: lineis circularibus cincto majore. *Breyn. fil.* 58. t. 28.

Habitat in *India orientali*.

Hospitatur in *Caldario*, non dum florens, arbuscula.

ANACARDIUM.

1. ANACARDIUM. *Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 165.

Anacardii alia species. *Baub. pin.* 512.

Caschou. *Mer. surin.* 16. t. 16.

Pharm. ANACARDII OCCIDENTALIS NUX.

Habitat in *America calidiore*.

Hospitatur in *Caldario*, Arbor †.

DICTAMNUS.

1. DICTAMNUS. *Hort. cliff.* 161.

Dictamnus albus vulgo f. Fraxinella. *Baub. pin.* 222.

Fraxinella. *Clus. hist.* 1. p. 99. *Renealm. spec.* 122. t. 121

- β. Fraxinella flore niveo. *Tournef. inst.* 430.

Pharm. DICTAMNI ALBI RADIX.

Habitat in Collibus lutosi saxosis *Germaniæ*, *Galliæ - Narbonensis*, *Italiæ* & circa *Tanaim*.

Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

RUTA.

1. RUTA foliis decompositis. *Hort. cliff.* 145.

Ruta hortensis latifolia. *Baub. pin.* 336.

Ruta hortensis. *Lob. hist.* 506.

Peganum. *Cels. hierob.* 2. p. 251.

Pharm RUTÆ HORTENSIS Herba, Conserva, Aqua, Oleum, Oleum, Sal, Acetum, Semina.

Svecis Win-ruta.

Habitat in Sterilibus *Gallia Narbonensis, Italia, Hispania, Africa.*

Hospitatur in *Frigidario*, sæpe etiam *sub dio*, sed tum sæpe perit, perennis.

Z Y G O P H Y L L U M.

1. ZYGOPHYLLUM capsulis prismatico-pentaëdriis.
Zygophyllum foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 160.

Fabago belgarum f. Peplus parisiensium. *Dalech. hist.*
456. *Tournef. inst.* 259.

Capparis, Fabago. *Dod. pempt.* 747.

Habitat in *Syria, & Astracan.*

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

T R I B U L U S.

1. TRIBULUS foliolis sex parium subæqualibus. *Hort.*
cliff. 160.

Tribulus terrestris, ciceris folio, fructu aculeato, *Bauh.*
pin. 250.

Tribulus terrestris. *Dod. pempt.* 557.

Habitat ad arborum semitas in *Gallia Narbonensi & Italia.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

F A G O N I A.

1. FAGONIA foliolis lanceolatis planis lævibus.

Fagonia spinosa. *Hort. cliff.* 160.

Trifolium spinosum creticum. *Bauh. pin.* 330. *prodr.*
142. *Clus. hist.* 2. p. 242.

Habitat in *Creta.*

Hospitatur in *Frigidario*, biennis.

J U S S I Æ A.

1. JUSSIÆA erecta, floribus tetrapetalis octandris sessilibus. *Fl. zeyl.* 170.

Ludwigia capsulis oblongis. *Hort. cliff.* 491.

Lyfimachia viscosa glabra, parietariæ foliis, virginiana.
Pluk. alm. 235. t. 203. f. 4.

Jasminum catalonicum, flore luteo. *Seb. thes.* 1. p. 42.
t. 24. f. 3.

Habitat in *America.*

Hospitatur in *Caldario*, annua.

Descr. Caulis humanæ altitudinis, erectissimus. Folia lanceolata, utrinque
acuminata, integra, glabra, alterna. Flores axillares, solitarii, germine
oblon-

oblongo, tetragono. Calyx tetraphyllus, corolla longior, patens. Petala quatuor, lutea. Stamina octo.

Proportio (denti unica quinta parte) non distinguit genera. Dixi in memoria Illustrum Botanicorum Fratrum Jussiacorum, quorum Cl. Bernh. Jussieu præ omnibus de horto nostro & tota re herbaria optime meruit.

D I G Y N I A.

D I A N T H U S.

1. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164.

Caryophyllus hortensis. *Raj. hist.* 986.

Caryophyllus hortensis simplex, flore majore. *Baub. pin.* 208.

- β. Caryophyllus flore pleno. *Baub. pin.* 207.

Pharmac. TUNICÆ Flores, Conserva, Syrupus, Aqua, Acetum, Semina.

Svecis Næglicka.

Habitat - - -

Hospitatur sub dio, vel in frigidario ubi præstantior, perennis.

Obs. Variat immense colore & plenitudine. Petala suaveolentia faciunt hanc officinalem.

2. DIANTHUS floribus subfolitariis, squamis calycinis lanceolatis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164.

Tunica ramosior, flore candido cum corolla purpurea. *Dill. elth.* 400. t. 298. f. 348.

Habitat in Anglia.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Adeo affinis est hæc speciei Dianthi primi. *Flor. svec.* 342. ut demta magnitudine & colore difficile distinguantur: Corollæ subtus virescentes, supra albæ, annulo coccineo dentato. Antheræ cærulecentes. Caulis longior, erectior.

3. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis subulatis longitudine tubi patulis. *Hort. cliff.* 164.

Caryophyllus sinensis supinus, leucoji folio, flore unico. *Tournef. act.* 1705. p. 348. t. 5.

Habitat in China.

Hospitatur sub dio, perennis.

Desc. Radix vivax, parum repens. Caules pedales, erectiusculi, superne dichotomi, læves. Folia lanceolata, angusta, glabra, acuminata. Calycis squammæ æquales, fere tubi longitudine, erecto-patulæ, e lata basi lineares, acuminatæ. Corollæ crenatæ, subtus subvirescentes, supra sanguineæ, margine incarnato, annulo centrali nigro crenato, Antheræ cæruleæ. Styli inflexi.

4. DIAN-

4. **DIANTHUS** floribus subsolitariis, petalis multifidis basi canaliculatis.

Caryophyllus flore tenuissimo dissecto. *Baub. pin.* 209.

Caryophyllus plumarius, flore inodoro tenuissime dissecto. *Moris. hist.* 2. p. 562.

Caryophyllus sylvestris V. *Clus. hist.* 1. p. 283.

Habitat in Austria.

Hospitatur sub dio, vivax ad ornamenta marginum expetita, perennis, sempervirens,

Descr. Radix vivax. Stolones numerosi cespitem densam latamque foliorum constituentes. Folia viridia, glauca. Caules decumbentes, pedales, ramosi, divaricati, virides, rore glauco. Calycum squamæ subovatæ brevissimæ obtusæ cum angulo acuto; tubus sæpe rufescens. Corollæ petala ad medium multifida, concava, incarnato-alba, basi debiscentia. Antheræ pallidæ. Styli longi revoluti. Petala supra pilis vix manifestis remotis adpersa suavissime olent præsertim nocte.

Obs. Varietas est forte *Fl. Svec.* 344. sed Svecica magis ad basin petalorum barbata, cum hæc pilis vagis adpersa est, uti reliquæ antecedentes. Svecica minus cespitosa, folia latiora producit. Laciniæ petalorum angustissimæ remotæ profundiores in sylvestri sunt.

5. **DIANTHUS** floribus subaggregatis alternis subsessilibus, squamis calycinis patulis tubi longitudine.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. *Baub. pin.* 209.

Caryophyllus arvensis, calyculo florum numerofo. *Loef. pruss.* 39. t. 7.

Betonica coronaria f. Caryophyllus sylvestris vulgarissimus. *Baub. hist.* 3. p. 334.

Betonica sylvestris. *Fuchs. hist.* 352.

Hortulanis Caryophyllus carthusianorum.

Habitat in sterilibus apricis Germaniæ, Italiæ, Siciliæ.

Hospitatur sub dio, perennis.

Descr. Radix vivax. Caulis erectus, firmus. Folia lata-lanceolata, margine (cartilagineo serrato) scabro. Flores subaggregati primoribus sessilibus. Foliola calycina ovata in acumen linearem acuminatum longitudine tubi desinentia, subfusca, patentia, hinc calyces squarrosi. Petala rubra, crenata, lateribus reflexa, circa centrum obscurius rubra. Antheræ cæruleæ. Folia inferne caulem non vaginantia.

6. **DIANTHUS** floribus aggregatis, squamis calycinis subovatis: apice subulatis longitudine tubi. *Hort. cliff.* 165.

a. Caryophyllus barbatus hortensis latifolius. *Baub. pin.* 208.

Caryophyllus carthusianorum 1. *Tabern. hist.* 2. p. 2.

Thyrsis. *Renealm. spec.* 48. t. 47. f. 1.

β. Caryophyllus barbatus hortensis latifolius, flore albo.

γ. Caryophyllus barbatus hortensis latifolius, flore variegato.

δ. Caryophyllus barbatus, flore multiplici. *Bauh. pin.* 208.

Svecis Borst-Någlikor. *Gottlandis* Sarons-Blomster.

Habitat forte in *Austria*.

Hospitatur sub dio, fert hyemes optime, hinc vulgaris, perennis.

Obs. Singulari modo variat hæc corollis albis, rubris, variegatis, in eodem flore diversis coloribus, ut *Mirabilis*.

7. DIANTHUS floribus aggregatis, capitulo magno, squamis calycinis ovatis obtusis magnis. *Hort. cliff.* 165.

Caryophyllus barbatus sylvestris annuus, multis capfulis simul junctis donatus. *Morif. hist.* 2. p. 563.

Caryophyllus sylvestris prolifer. *Bauh. pin.* 209. *Segu. veron.* 26. t. 7. f. 1.

Habitat in *Germania*, *Helvetia*, *Gallia*, *Italia*, *Sicilia*. *Madera* siccioribus pascuis sterilibus.

Hospitatur sub dio, annua.

Descr. Radix biennis. Caulis pedalis, erectus, inferne ramosus. Folia linearia, angustissima, remota. Calyx glaber, oblongus, compositus s. aggregatus. Petala minima, non crenata sed parum emarginata, obtusissima.

S A P O N A R I A.

1. SAPONARIA calycibus monophyllis cylindracciss ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 165.

Saponaria major lævis. *Bauh. pin.* 206.

Saponaria vulgaris. *Cam. epit.* 152.

β. Saponaria flore pleno. *Corn. canad.* 209.

Pharm. SAPONARIÆ Radix, Herba.

Habitat in *Belgio*, *Anglia*, *Gallia* &c.

Hospitatur sub dio, perennis, cieur.

Obs. Petala integra, nectario ex unguibus acutis.

2. SAPONARIA calycibus monophyllis cylindracciss pilosis, caule diffuso.

Saponaria caule dichotomo, foliis lanceolatis petiolatis, floribus solitariis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 445.

Lychnis orientalis annua supina, antirrhini folio, flore minimo purpurascente. *Tournef. cor.* 24. *Dill. elth.*

205. t. 167. f. 204.

Habitat in *Oriente*.

Hospitatur sub dio, annua.

Descr.

Descr. Planta annua. Caulis dichotomus, subvillosus. Folia lanceolata. Calyces pedunculati, e dichotomiis solitarii, hirsuti. Petala bifida absque nectario.

Obs. Est hæc planta maxime affinis speciei congeneri, quæ *Lychnis* f. *Ocymoides repens montanum*. C. B. dicitur.

3. **SAPONARIA** calycibus monophyllis pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis sessilibus.

Hort. cliff. 166. *Roy. lugdb.* 443. *Guett. flor.* 2. p. 287.

Lychnis segetum rubra, foliis perfoliatis. *Bauh. pin.* 204.

Vaccaria. *Dod. pempt.* 104. *Bauh. hist.* 3. p. 357.

Thamæcnemon. *Trag. hist.* 130.

Habitat ubique inter segetes *Germaniæ*, *Galliæ*.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Petala emarginata absque nectario Calyx ovato-pyramidatus, angulis quinque, compressis, concavis, glabris.

4. **SAPONARIA** calycibus pentaphyllis, corymbis fastigiatis, foliis lanceolatis, caule ascendente.

Lychnis alpina linifolia multiflora, perampla radice.

Tournef. inst. 332. *Scheuch. alp.* 132.

Caryophyllus saxifragus, foliis gramineis, minor. *Bauh. pin.* 211.

Caryophyllus alpinus, crasso *linariæ* folio. *Bocc. mus.*

23. t. 5. f. 1. *Raj. app.* 483.

Habitat in alpibus *Helveticis*, in desertis sabulosis ad *Tanaïm*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Differt hæc a *Saponaria* *Fl. suec.* 340. magnitudine & foliis latioribus triplo quadruplo; cætera exacte eadem, ut fere dubitem, utrum specie vere distincta.

4. **SAPONARIA** calycibus pentaphyllis, floribus aggregatis, foliis mucronatis canaliculatis recurvis.

Caryophyllus saxatilis, *ericæ* foliis, umbellatis corymbis. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 105. *Raj. hist.* 1033.

Magn. monsp. 53. t. 5.

Habitat in monte *Vigon Galliæ* & *Monspeli* in descensu montis *Capouladon*.

Hospitatur sub dio, enata e seminibus clariss. *Sauvagesii*, mox perit.

Descr. Radix cespites constituens; rami numerosi, erecti. Folia triquetra, subulata, brevissima, recurva, canaliculata, acuta, inferiora propiora. Flores aggregati, caules terminales.

SAXIFRAGA.

1. **SAXIFRAGA** foliis lingulatis radicalibus: margine cartilagineo acute serratis, floribus paniculatis. *Fl. suec.* 355.

Saxi-

Saxifraga foliorum marginibus cartilagine crenatis.
Hort. cliff. 168.

- β. *Sedum ferratum album bicorne, folio brevior: marginibus argenteis.* *Morif. hist.* 3. p. 478. f. 12. t. 9. f. 19.
Cotyledon minor, foliis subrotundis ferratis. *Baub. pin.* 285. *prodr.* 133. *Raj. hist.* 1046.

Habitat in variis *Alpibus*.

Hospitatur *sub dio*, quotannis florens, perennis.

2. **SAXIFRAGA** foliis cuneiformibus retusis radicalibus, sinuato ferratis margine acutis caule paniculato.

Geum folio subrotundo minori, pistillo floris rubro.
Magn. hort. 88. t. 88. *Raj. suppl.* 508.

Habitat in alpibus *Cantabrigicis, Rheticis, Pyrenæis.*

Hospitatur in *sub dio*, quotannis florens, perennis.

TRIGYNIA.

MALPIGHIA.

1. **MALPIGHIA** foliis ovatis integerrimis glabris. *Hort. cliff.* 169.

Malpighia mali punici facie. *Plum. gen.* 46.

Cerasus jamaicensis, fructu tetragono. *Comm. hort.* 1. p. 145. t. 75.

Cerasus americana, myrti conjugatis foliis, fructu acerbo. *Pluk. alm.* 94. t. 157. f. 4.

Arbor baccifera, fructu subrotundo, fructu cerasino sulcato. *Sloan. flor.* 172. *hist.* 2. p. 106. t. 107. f. 2.
Raj. dendr. 174.

Ibipitanga. *Marcgr. bras.* 116. *Pis. bras.* 121. 187. *Raj. dendr.* 95.

Habitat in *Jamaica, Surinama, Curacao.*

Hospitatur in *Caldario*, arbor.

Desc. Arbor, caulebrachiato ramosissimo. Folia opposita, ovata, utrinque acuta, subsessilia. Flores laterales, solitarii. Calycēs pulchre poris melliferis instructi.

GARIDELLA.

1. **GARIDELLA.** *Hort. cliff.* 170.

Gari-

Garidella foliis tenuissime dissectis. *Tournef. inst.* 655.

Garid. provinc. 203 *t.* 39. *opt.*

Nigellastrum raris & fœniculaceis foliis. *Magn. hort.*

145. t. 143.

Habitat in Gallo-provincia.

Hospitatur sub dio, annua.

CUCUBALUS.

1. CUCUBALUS caule ramoso, floribus trigynis, fructu colorato globoso. *Hort. cliff.* 170.

Cucubalus plinii. *Dalech. hist.* 1429. *Tournef. inst.* 339.

Alfine scandens baccifera. *Baub. pin.* 250.

Alfine repens. *Dod. pempt.* 403.

Habitat in umbrosis sepibus Germaniæ, Galliæ, Italiæ, Tataria.

Hospitatur sub dio, sæpius perdurans hyemes.

Descr. Radix vivax. Caules procumbentes, diffusi, teretes, divaricati. Folia ovata, utrinque mucronata, vix corollata, sed ejus loco gibbositas corollæ prominens.

2. CUCUBALUS floribus trigynis erectis, petalis bifidis corollatis, calycibus fructus pendulis inflatis: angulis decem scabris.

Cucubalus floribus trigynis erectis, fructibus pendulis, calycibus striis decem crispis. *Hort. cliff.* 170.

Cucubalus floribus trigynis erectis, calycibus fructus pendulis angulosis. *Hort. cliff.* 171.

Lychnis supina ficula, calyce amplissimo striato. *Tournef. inst.* 336.

Viscago hirsuta ficula, lychnidis aquaticæ facie, supina. *Dill. elth.* 421. *t.* 312. *f.* 404.

Habitat in Creta.

Hospitatur sub dio, annua, †.

Obs. Radix annua. Facies Cucubali Fl. Svec. 361. sed diffusa & flores hermaphroditi. Calyces fructus penduli alterni inflati, angulis decem compressis, margine setulis truncatis crispo.

3. CUCUBALUS calycibus fructus ovatis erectis: angulis decem alternis venosis.

Lychnis noctiflora. *Baub. pin.* 205. *Raj. hist.* 994.

Ocymoides noctiflorum. *Cam. hort.* 109. *t.* 34.

Habitat in Germania.

Hospitatur sub dio, annua.

Descr. Radix annua. Caulis erectus pilosus viscidus. Folia lato-lanceolata, pilosa. Flores ex dichotomia caulis, solitarii, pedunculati, obliqui, albidii, calyci-

calycibus cylindricis. Petala bifida. Calyces fructus globoso-ovati, farcti, striati, reticulato-venosi, quinque-dentati, dentibus longitudine fere calycis. Flos nocte apertus, odoratus æstate, non autumno.

4. CUCUBALUS calycibus fructus (triginta striis) globosis acuminatis, foliis glabris.

Cucubalus calycibus conicis strictis. *Hort. cliff. 171.*

Lychnis sylvestris latifolia, calycibus turgidis striatis. *Bauh. pin. 205.*

Lychnis sylvestris secunda. *Clus. hist. 1. p. 228.*

Habitat inter segetes *Hispaniæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

Desc. Radix annua. Caulis piloso-viscidus. Folia lanceolata, glabra. Calyces fructus globosi, acuminati, striis 30 hispidis. Capsula globosa acumine cylindrico. Petala parva, indivisa, integra; Nectaria trifida acuta, & præterea ad marginem baseos corollæ utrinque denticulus.

5. CUCUBALUS calycibus fructus conicis: triginta striis, foliis mollibus.

Lychnis sylvestris angustifolia, calycibus turgidis striatis. *Bauh. pin. 205.*

Habitat inter segetes *Hispaniæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

Desc. Radix annua. Caulis tomentosus, aridus. Folia linearia, subtomentosa. Calyces fructus conici, minime ad globosam figuram accedentes, striis 30, parallelis, hispidis, adeoque differt in paucis a præcedenti. Præsertim cum nectaria & dentes laterales ut in præcedenti sese habeant.

6. CUCUBALUS foliis quaternis.

Silene foliis quaternis. *Gron. virg. 50.*

Lychnis caryophyllæus virginianus, gentianæ foliis glabris quatuor ex singulis geniculis caulem amplexantibus, flore amplo fimbriato. *Raj. hist. 1895.*

Habitat in *Virginia.*

Hospitatur in *Caldario.*

Desc. Radix fibrosa. Caulis erectus, obtuse tetragonus, glaber, articulatus. Folia quaterna, ovato-lanceolata, sessilia, glabra, acuminata, integerrima. Rami oppositi, breves. Flores paniculati.

S I L E N E.

1. SILENE floribus fastigiatis coronatis, foliis superioribus cordatis glabris.

Silene foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus terminatibus fasciculatis fastigiatis. *Hort. cliff. 172.*

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis. *Bauh. pin. 205.*

Muscipula f. Armoria altera. *Lob. ic.*

Armerius flos quartus. *Dod. pemp.* 176.

2. *Lychnis viscosa alba latifolia lævis.* *Tournef. inst.* 205.

Habitat *Monspeli.*

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

Descr. Radix annua. Caulis & tota planta glabra & erecta, articuli caulis superne viscosi. Folia oblonga, superiora cordata, glabra omnia. Flores terminales subcontigua dichotomia; petala emarginata, corollata, dentibus acuminatis patulis.

2. *SILENE* caule fruticoso foliato, foliis lineari-lanceolatis, fructu ovato. *Hort. cliff.* 171.

Lychnis sylvestris myrtifolia, Behen albo similis. *Bauh. pin.* 205.

Behen albo officinarum similis planta sempervirens. *Bauh. hist.* 3. p. 357.

Ocymoides fruticosum. *Cam. hort.* 109. t. 33.

Habitat in *Sicilia.*

Hospitatur in *Frigidario*, sempervirens.

3. *SILENE* petalis nudis bipartitis, floribus secundis, pedunculis oppositis solitariis erectis, caule simplicissimo.

Lychnis septentrionalium, foliis hyssopi, floribus uno versu positis albis. *Gerb. volg.* 159. *Hall. gott.* 33. desc.

Lychnis ruthenica frutescens & perennis, hyssopi foliis, flore ex albido. *Gerb. samar.* 177.

Habitat in *Tartaria.*

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Descr. Radix perennis. Caules tripedales, recti, erecti, teretes, geniculati, simplissimi. Folia opposita, linearia, acuminata, subcarinata. Ramulorum rudimenta ex alis. Pedunculi oppositi, solitarii, erecti, cauli adpressi, sæpius simplicissimi (rarius triflori), ad basin geniculati, stipulis duabus oppositis. Calyces secundi, oblongi, horizontales, sulcati. Petala quinque, limbis bifidis: laciniis linearibus, obtusis, albis, absque nectario.

4. *SILENE* floribus paniculatis, petalis linearibus bipartitis nudis, staminibus longis, foliis lato-lanceolatis.

Silene foliis ovatis utrinque acutis, caule paniculato, floribus nutantibus tenuissimis. *Roy. lugdb.* 446.

Lychnis viscosa altissima, flore muscoso, ocymastri facie. *Cupan. cathol.* 120.

Habitat in *Italia.*

Hospitatur *sub dio* & in *Frigidario*, perennis, serius florens.

Descr.

Descr. Radix vivax. Caulis tripedalis, brachiatus, ramosissimus, nudus, articulatus. Rami summi dichotomi. Pedunculi e dichotomia solitarii, uniflori, longi, tenuissimi. Calyces clavati, læves, purpurascentes. Corolla nuda limbo bipartito. Stamma alba, petalis fere longiora. Folia lanceolata ovata s. lato-lancelata, viridia, sed scabra.

Obs. Differt a Viscagine nocturna non viscosa herbaceo flore. Dill. elth. 425. t. 316. Corolla alba nec viridi, petalis angustis sed non linearibus, calyce rubro nec viridi.

5. SILENE floribus spicatis alternis solitariis subsessilibus erectis, corollis obsoletis nudis.

Lychnis segetum meridionalium annua hirta, floribus albis uno versu dispositis. Moris. hist. 2. p. 544. Raj. hist. 996.

Lychnis sylvestris alba, spica reflexa. Magn. monsp. 171. t. 170.

Habitat Monspeli.

Hospitatur sub dio, annua.

Descr. Radix annua. Caulis pedalis. Folia lanceolata, rami parvi. Flores alterni, sessiles vel subsessiles. Corolla vix ulla apparet, brevissima est, & petalis bifidis vix conspicuis.

Obs. Non vidimus spicam reflexam uti Magnolius eam habet, sed rectam ab altero latere tantam flores ferentem.

6. SILENE erecta lævis, calycibus erectis fulcatis, petalis emarginatis coronatis.

Lychnis viscosa, foliis inferioribus bellidi minoribus similibus, flore minimo carneo aut rubro. Magn. hort. 126.

Viscago foliis inferioribus bellidis, superioribus tunicae, calyce strictiore & turgidiore. Dill. elth. 422. t. 313. f. 404. 405.

Lychnis cretica angustifolia, floribus pediculis longissimis insidentibus, capsula pyramidata. Tournef. cor. 24.

Habitat in Creta.

Hospitatur sub dio, annua.

Descr. Radix annua. Caulis bipedalis, erectus, angustus, non hirsutus, infragenicula viscidus, strictus, ramis pedunculisque longis. Folia inferiora lanceolata, extrorsum latiora; superiora lineari-acuminata. Calyces læves oblongi, erecti, sulcis 10 profunde plicati, erecti. Corollae infundibuliformes, rubrae, nectario cylindraceo acute dentato, emarginatae, obtusae, respectu calicis breves.

7. SILENE erecta lævis, calycibus subglobosis glabris venosis, corollis inapertis coronatis.

Viscago lusitanica, flore rubello vix conspicuo. Dill. elth. 423. t. 313. f. 406. Lychn.

Lychnis sylvestris, flosculo rubro vix conspicuo.

Grisl. virid.

Habitat in *Lusitania*.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix annua. Caulis erectus, rectus, vix pedalis, non ramosus. Folia inferiora cuneiformia obtusa, superiora lanceolata; articulus supremus caulis longior. Flores conferti caulem terminant, dichotomi, tres vel septem. Calyces glabri cæsi subglobosi venosi. Corollæ rubræ, bifidæ, nectariferæ vix unquam apertæ, minutissimæ & vix conspicuæ.

8. *SILENE* petalorum limbis integerrimis subrotundis, fructibus erectis alternis. *Hort. cliff.* 171.

Lychnis hirsuta minor, flore variegato. *Tournef. inst.* 338.

Lychnis hirsuta, flore eleganter variegato. *Raj. hist.* 997.

Hortulanis *Vulnera* quinque Christi.

Habitat in *Hispania*.

Hospitatur sub dio, annua.

9. *SILENE* hirsuta, petalis emarginatis coronatis, floribus erectis, fructibus reflexis subsessilibus alternis.

Lychnis arvensis anglica. *Lob. illust.* 97.

Lychnis arvensis minor anglica. *Park. theatr.* 638.

Lychnis sylvestris parva. *Johns. cat.* 20.

Lychnis sylvestris, flore albo minimo. *Raj. hist.* 996.

Lychnis hirsuta minima, flore albicante. *Pluk. alm.* 230.

Lychnis sylvestris hirsuta annua, flore minore albo.

Vaill. paris. 121. t. 16. f. 12.

Viscago ceraatii foliis, vasculis pendulis, anglica. *Dill. elth.* 417. t. 309. f. 398.

Habitat in *Anglia* circa *Bockingham*.

Hospitatur sub dio, annua.

Descr. Radix annua. Planta parva, facie *Ceraatii*, diffusa. Folia lanceolata cuneiformia, parum villosa. Caules tomentosi; rami alterni. Flores ex alterna ala, solitarii, sessiles. Corollæ minimæ, carinata, albæ striis purpureis. Calyces fructus horizontales, vel nutantes omnino, & divaricati, pilosi, sulcati.

10. *SILENE* hirsuta, petalis dentatis coronatis, floribus erectis, fructibus reflexis subsessilibus alternis.

Lychnis sylvestris, stellato flore. *Gris. lusit.*

Viscago hirsuta lusitanica, stellato flore. *Dill. elth.* 420.

t. 311. f. 401.

Habitat in *Lusitania*.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Differt a priori petalis emarginatis crenatis, cæterum conveniunt, & vix specie diversæ sunt. Calyces valde hirsuti sunt.

11. **SILENE** petalis bifidis coronatis; corolla coadunata, calycibus erectis raris pilosis, foliis infimis subrotundis.

Viscago hirsuta, amœno flore. *Dill. m. s. f.*

Habitat in *Tartaria*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Descr. Radix annua. Caulis erectus, brachiatus, semi-pedalis. Folia infima obverse ovata, reliqua lanceolata. Summi articuli ramorum longissimi. Calyces oblongi, hirsuti, striis decem angusti. Limbus corollæ calyce duplo brevior, bifidus, pallide incarnatus, subtus flavescent. Nectarium ore cylindrico prominet, quod constat squamula petali obtusissima vix manifeste emarginata, sed coherent quinque squamulae in unam velut connatae. Antherae albae. Caulis & Folia parum pilosa, magis tamen Calyces.

12. **SILENE** petalis bilobis coronatis, floribus erectis, foliis subciliatis.

Silene corymbo dichotomo, floribus pedunculatis, ramis alternis erectis, foliis lanceolatis integerrimis.

Gron. virg. 50.

Silene foliis lanceolatis glabris, pedunculis trifidis, petalis emarginatis, calycibus ovatis. *Roy. lugdb. 447.*

Viscago americana noctiflora, antirrhini folio. *Dill. elth. 422. t. 313. f. 403.*

Lychnis caroliniana rubra minus hirsuta. *Pet. sic. 29. Raj. app. 2. p. 246.*

Lychnis elatior glabra, flosculis albis ad summa caulium internodia rubidum exsudans viscum, *Pluk. alm. 231.*

Lychnis virginiana elatior, floribus parvis in summitate caulis. *Pluk. mant 121.*

Habitat in *Virginia*, *Carolina*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

13. **SILENE** (*viscago*) foliis imis petiolatis ovatis, floribus punculatis: corollis emarginatis nudis. *Hall. göett. 33. 91. t. 1. descr. fig.*

Habitat in imperio *Rhuteni*, missa a Cl. Hallero.

Hospitatur *sub dio*, nuper enata, perennis.

P E N T A G Y N I A.

C E R A S T I U M.

1. CERASTIUM foliis connatis. *Hort. cliff.* 173.
 Myosotis orientalis perfoliata, lychnidis folio. *Tournef.*
cor. 18. *Dill. elth.* 295. t. 217. f. 284.
 Habitat in Oriente.
 Hospitatur sub dio, annua.

C O R O N A R I A.

1. CORONARIA tomentosa, foliis ovato-lanceolatis.
 Lychnis coronaria dioscoridis fativa. *Baub. pin.* 203.
 Lychnis coronaria. *Dod. pempt.* 170. *Lob. hist.* 181.
 3. Lychnis coronaria dioscoridis fativa alba. *Tournef.*
inst. 334.
 Habitat in Italia & apud Ananienses.
 Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

1. CORONARIA glabra, foliis lineari-lanceolatis.
 Lychnis segetum, Nigellastrum minus glabrum dicta,
 flore eleganter rubello. *Moris. hist.* 2. p. 543. f. 5. t.
 22. f. 32.
 Lychnis foliis glabris, calyce duriore. *Bocc rar.* 27.
 Pseudo Melanthium glabrum ficulum. *Raj. hist.* 999.
 Habitat in Sicilia.
 Hospitatur sub dio, annua†.

Descr. Radix annua. Caulis pedalis, tener, vix erectus, alterne ramosus, articulatus, glaber. Folia lineari-lanceolata, acuminata, integerrima. Calyx clavatus, longitudine unguium corollæ, quinque-dentatus, decem sulcis rugosis. Petala purpurascens, emarginata, ad basin limbi denticulis duobus. Styli quinque reflexi.

L Y C H N I S.

1. LYCHNIS floribus fasciculatis fastigiatis. *Hort. cliff.*
 174.
 Lychnis hirsuta, flore coccineo, major. *Baub. pin.* 203.
 Lychnis calcedonica miniata. *Lob. hist.* 183.
 Flos constantino-politanus. *Dod. pempt.* 178.
 1. Lychnis hirsuta, flore candido, major. *Tournef. inst.*
 334.

2. *Lychnis calcedonica*, flore pleno miniato f. aurantia-
co. *Boerb. lugdb.* 1. p. 210.

Svecis Studentroser.

Habitat in *Tatariae oroburgensis* pratis circa fluvium *Sacmaram*, & circa
Wolgam.

Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

OXALIS.

1. *OXALIS* pedunculis multifloris, caule ramoso her-
baceo. *Hort. cliff.* 178.

Oxys flore luteo. *Clus. hist.* 2. p. 249.

Oxys lutea corniculata repens. *Lob. ic.* 32.

Trifolium acetosum corniculatum. *Bauh. pin.* 330.

Habitat in *Italia*, *Sicilia*.

Hospitatur sub dio, annua cicur.

SEDUM.

1. *SEDUM* foliis ferratis, corymbo folioso.

Anacampteros flore flavo. *Amm. ruth.* 73. n. 96. t. 11.

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Descr. Radix perennis. Caules saepius decumbentes vel florentes adscendentes,
glabri, teretiusculi. Folia lanceolata, superne latiora, supra medium ser-
rata. Corymbi caules terminantes, lutei omnibus fructificationis partibus.
sed folia etiam corymbis subtus affixa. Stamina decem.

2. *SEDUM* foliis cuneiformibus concavis obtuse denta-
tis, ramis repentibus apice rosaceo-foliatis.

Sedum minus repens, *chamædryos* foliis, e singulis
foliorum alis radices agens. *Amm. ruth.* 11. n. 93.

Habitat in *Tartaria* ad pedes *uralensium* montium.

Hospitatur sub dio, perennis.

PENTHORUM.

1. *PENTHORUM*, *Gron. virg.* 51. descr.

Habitat in *Virginiae* umbrosis & madidis.

Hospitatur in vaporario, annua†.

D E C A G Y N I A.

N E U R A D A.

I. NEURADA.

Chamædrifolia tomentosa mascariensis. Pluk. alm. 97. t. 275. f. 6. Schaw. afr. 133.

Habitat in *Ægypto*, & *Arabia*.

Hospitatur in *Vaporario*, semina missa a clariss. *Jussieo*. †. annua.

Obs. Planta diffusa annua ramosa tomentosa. Folia ovata sinuata, *Dryadis* similia hinc dubius sum de synonymo.

P H Y T O L A C C A.

I. PHYTOLACCA foliis integerrimis. *Hort. cliff. 177. Gron. virg. 161.*


Phytolacca vulgaris. Dill. elth. 318. t. 239. f. 309.

Solanum virginianum rubrum racemosum, baccis torulis canaliculatis. Moris. hist. 3. p. 522. f. 13. t. 1. f. 22.

Habitat in *Virginia*, *Jamaica*, *Mexico*.

Hospitatur in *Frigidario*, sæpe etiam sub dio, perennis.

Obs. Folia alterna, sed pedunculi e regioni folii seu folio oppositi prodeunt e caule, ut in *Saururo*, *Pipere*, &c. quod indicat affinitatem familiæ.



C L A S S I S. XII.

DODECANDRIA

M O N O G Y N I A.

L Y T H R U M.

1. LYTHRUM foliis alternis linearibus, floribus hexandris.

Lythrum foliis alternis. Hort. cliff. 178.

Salicaria hyssopi folio latiore. Tournef. inst. 253. Hall. rupp. Jen. 147. t. 2. f. 3. opt.

Hyssopifolia. Baub. pin. 218.

Habitat ubi aquæ per hyemem stagnarunt in Germania.

Hospitatur in Vaporariis & Solaris, annua.

D I G Y N I A.

A G R I M O N I A.

- * AGRIMONIA foliis omnibus pinnatis, fructibus hispidis. *Hort. cliff. 179. Roy. lugdb. 240. Hall. helv. 407. Fl. svec. 394.*

- β. Agrimonia orientalis humilis, radice crassissima repente, fructu in spicam brevem & densam congesto. *Tournef. cor, 21.*

Habitat in Oriente.

Hospitatur in Frigidario, perennis.

P O L Y G Y N I A.

S E M P E R V I V U M.

1. SEMPERVIVUM caule inferne nudo lævi ramoso. *Hort. cliff. 179.*

Sempervivum f. Sedum arborescens majus. Dod. pempt. 127.

Habitat in Scopulis Cretæ, Corcyræ, Zacynthæ.

Hospitatur in Tepidario, per hyemem in Apricario per æstatem, succulentus frutex sempervirens.

CLASSIS. XIII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

CACTUS.

1. CACTUS subrotundus tectus tuberculis ovatis barbatis. *Hort. cliff.* 181.

Echino MeloCactus minor lactescens, tuberculis f. mammillis majoribus. *Herm. parad.* 136. t. 136.

Ficoides f. Ficus americana sphærica tuberculata lactescens, flore albo, fructu rubro pyramidali. *Comm. hort.* 1. p. 105. t. 55.

Ficoides f. MeloCactus mamillaris glabra fulcis carens, fructum suum undique fundens. *Pluk. alm.* 148. t. 29. f. 1.

Habitat in rupibus *Curassavie America* calidioris.
Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

2. CACTUS quatuordecim-angularis subrotundus. *Hort. cliff.* 181.

Melocactus indiæ occidentalis. *Bauh. pin.* 384.

EchinoMeloCactus. *Clus. exot.* 92. t. 92.

Habitat in rupibus *Jamaicæ & America* calidioris.
Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

3. CACTUS quadrangularis longus erectus: angulis compressis. *Hort. cliff.* 181.

Cereus erectus minor, fructu spinoso, costarum numero varians. *Herm. parad.* 117.

Ficoides f. Ficus americana erecta cerei effigie maxima crassissima quadrangularis. *Kigg. beaum.* 20.

Habitat in *Curacao & America* calidiori.
Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

4. CACTUS sexangularis longus rectus.

Cereus erectus altissimus surinamensis. *Herm. parad.* 116. *Raj. dendr.* 23.

Cereus surinamensis. *Eph. N. C.* 3. p. 394. t. 7, 8.

Habitat in *Surinami*.

Hospitatur in *Caldario* hyeme, æstate in *Apricario*, succulenta.

5. **CACTUS** octangularis longus erectus: angulis obtusis. *Hort. cliff.* 181. n. 5.

Cereus erectus, fructu rubro non spinoso. *Herm. par.* 114. t. 114.

Cereus peruanus spinosus, fructu rubro nucis magnitudine. *Baub. pin.* 458.

Habitat in aridis, apertis, arenosis, maritimis *Jamaicæ*.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

6. **CACTUS** compressus articulatus ramosissimus, articulis ovatis, spinis setaceis. *Hort. cliff.* 183. *Gron. virg.* 54.

Ficus indica, folio spinoso, fructu majore. *Baub. pin.* 458.

Ficus indica. *Dod. pempt.* 813. *Lob. ic.* 2. p. 241.

Habitat in *Nova Hispania*, & *Virginia*.

Hospitatur in *Tepidario* per hyemem, in *Apricario* per æstatem, succulenta.

7. **CACTUS** compressus articulatus ramosus: articulis ovato-oblongis, spinis setaceis. *Hort. cliff.* 183.

Opuntia maxima, folio spinoso latissimo & longissimo. *Tournef. inst.* 240.

Habitat in *America callidiori*.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

8. **CACTUS** compressus articulatus ramosus: articulis ovato-oblongis, spinis subulatis. *Hort. cliff.* 183.

Opuntia major, folio oblongo-rotundo, spinis longis & validissimis confertim nascentibus obsito, flore luteo. *Sloan. flor.* 193. *hist.* 2. p. 149. t. 224. f. 1.

Tuna major, spinis validis flavicantibus, flore gilvo. *Dill. elth.* 396. t. 295. f. 238.

Habitat in *Jamaica* & aliis regionibus calidioris *Americæ*.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

9. **CACTUS** tereti-compressus articulatus ramosus. *Hort. cliff.* 182.

Ficus indica f. *Opuntia curassavica minima*. *Comm. hort.* 1. p. 107. t. 56.

Ficus indica f. *Opuntia minor* caulescens arbusculæ in modum ramis cineritiis spinosissima. *Pluk. alm.* 147. t. 281.

Habitat in *Curacao*.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

10. **CAC-**

10. **CACTUS** compressus articulatus ramosus, articulis ovato-oblongis subinermibus.

Tuna mitior, flore sanguineo cochenillifera. *Dill. elth.* 399. *t.* 197. *f.* 383.

Ficus indica major lævis f. spinosa vermiculos, quos cochenillavocant, proferens. *Pluk. alm.* 146. *t.* 281. *f.* 383.

Opuntia maxima, folio oblongo rotundo majore spinulis mollibus & innocentissimis obfeto, flore striis rubris variegato. *Sloan, flor.* 194. *hist.* 2. *p.* 152. *t.* 8. *f.* 1. 2.

Habitat in *Jamaica*,

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

11. **CACTUS** scandens, angulis quinque obtusis. *Hort. cliff.* 182.

Cereus americanus major articulatus, flore maximo nocte se aperiente & suavissimum odorem spirante.

Volk. hesp 1. *p.* 233. *t.* 234.

Habitat in *Jamaica* & *Vera Cruce*.

Hospitatur in *Caldario*, parietes scandens, succulenta.

12. **CACTUS** scandens: angulis decem obsoletis.

Opuntia minima flagelliformis. *Plum. spec.* 6.

Cereus minimus scandens polygonus articulatus. *Boerb.*

Cereus scandens minor polygonus. *Herm. parad.* 120.

Boerb. lugdb. 1. *p.* 293

Ficoides americanum, f. Cereus minima serpens americana. *Pluk. alm.* 148. *t.* 158. *f.* 6.

Habitat in *America* calidiori.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

Descr. *Minimus* est, vix calamo scriptorio crassior, angulis ita obsoletis & punctis echinatis ita confertis, ut anguli difficile numerentur.

13. **CACTUS** triangularis scandens articulatus. *Hort. cliff.* 182.

Cereus scandens minor trigonus articulatus, fructu suavissimo. *Herm. parad.* 118.

Ficoides americanum f. Cereus erectus cristatus, foliis triangularibus, profunde caniculatis. *Pluk. alm.* 147. *t.* 29. *f.* 3.

Habitat in arboribus campestribus *Jamaica*, *Brasilica*.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

14. CACTUS caule tereti arboreo spinoso, foliis lanceolato-ovatis.

Pereeskia. Hort. cliff. 183.

Pereeskia aculeata, flore albo, fructu flavescente. *Pluk. gen. 35. Dill. elth. 305. t. 222. f. 294.*

Portulaca americana latifolia ad foliorum ortum lanugine obducta, longioribus aculeis horrida. *Pluk. alm. 304. t. 215. f. 6.*

Malus americana spinosa, portulaccæ folio, fructu folioso, femine reniformi splendente. *Comm. hort. 1. p. 135. t. 30.*

Habitat in Insula *Margaretha*, *Jamaica*.

Hospitatur in *Caldario*, toto anno, non florens, arbor.

PSIDIUM.

1. PSIDIUM ramis quadrangulis.

Psidium caule quadrangulo. *Hort. cliff. 184. Fl. zeyl. 192.*

Guajava alba dulcis. *Comm. hort. 1. p. 121. t. 63.*

Guajava alba acida, fructu rotundiore. *Pluk. alm. 181. t. 193. f. 4.*

Guajabo pomifera indica. Baub. pin. 437.

Habitat in campéstribus *Indiæ* calidioris.

Hospitatur in *Caldario* per totum annum, non florens, arbor.

PUNICA.

1. PUNICA. *Hort. cliff. 134.*

Punica quæ *Malum Granatum* fert. *Tournef. inst. 636.*

Malus punica sativa. *Baub. pin. 438.*

Malus punicum. Lob. hist. 564.

Rimmon. Cels. hierob. 1. p. 271.

Pharm. GRANATORUM Flores, Cortex, Semina.

Svecis Granat-träd.

Habitat in *Gallia Narbonensi*, *Italia*, *Hispania*, *Africa*, solo macri, cre-
raceo.

Hospitatur in *Tepidario*, arbor.

PHILADELPHUS.

1. PHILADELPHUS. *Hort. cliff. 188.*

Syringa alba f. *Philadelphus athenæi. Baub. pin. 398.*

Frutex coronarius. Clus. hist. 1. p. 55.

Habi-

Habitat - - -

Hospitatur *sub dio*, frequens, frutex, cicur.

M Y R T U S.

1. MYRTUS floribus solitariis, calyce fructus diphylo. *Hort. cliff.* 42.

β. Myrtus foliis minimis & mucronatis. *Baub.* pin. 469.

Myrtus domestica, fructu albo. *Clus. hist.* 1. p. 67.

γ. Myrtus minor vulgaris. *Baub.* pin. 469.

Myrtus tarentina. *Dalech. hist.* 237.

δ. Myrtus bætica latifolia 2. *Baub.* pin. 469.

Myrtus bætica latifolia exotica. *Clus. hist.* 1. p. 65.

Hadas. *Cels. hierob.* 2. p. 17.

Pharm. MYRTI Folia, Baccæ, Oleum.

Svecis Myrten.

Habitat in locis nec fervidis nec gelidis totius orbis, in *Gallia Narbonensi*, *Italia*, in *Asia*, *Africa*.

Hospitatur in *Frigidario*, arbor sempervirens.

S T Y R A X.

1. STYRAX. *Hort. cliff.* 187. *Cam. epit.* 38.

Styrax folio mali cotonei. *Baub.* pin. 452.

Pharm. STYRACIS CALAMITÆ Refina Oleum.

Habitat in agro Romano, *Creta*, *Syria*, *Palæstina*.

Hospitatur in *Tepidario*, Arbor.

A M Y G D A L U S.

1. AMYGDALUS foliis petiolatis: ferraturis infimis glandulosis. *Hort. cliff.* 186.

β. Amygdalus sativa. *Baub.* pin. 441.

Amygdalus dulcis. *Baub. hist.* 1. p. 174.

Amygdalus. *Dod. pempt.* 798.

Schaked. *Cels. hierob.* 1. p. 297.

Pharm. AMYGDALÆ DULCIS Nuclei, Oleum.

β. Amygdalus amara. *Baub.* pin. 441. *hist.* 1. p. 174.

Pharm. AMYGDALÆ AMARÆ Nuclei, Oleum.

Svecis Mandel-tråd.

Habitat in sepibus siccis duris sabulosis *Tripolitanis*.

Hospitatur in *Frigidario* per hyemes, Arbor.

2. AMYGDALUS foliorum ferraturis omnibus acutis.

Hort. cliff. 186.

Perfica

Persica molli carne & vulgaris, viridis & alba. Baub. pin. 440.

Malus persica. Dod. pempt. 796.

Pharm. PERSICÆ Flores, Syrupus, Nuclei, Aqua. Svecis Persika.

Habitat in Persia.

Hospitatur in Frigidario per hyemes, interdum etiam pergulis annexa perieribus, Arbor.

3. **AMYGDALUS** foliis petiolatis basi attenuatis. *Hort. cliff. 186.*

Amygdalus indica nana. Pluk. alm. 28. t. 11. f. 3.

Amygdalus nana. Munt. hist. 34. t. 34.

Habitat in Tartaria.

Hospitatur sub dio, frutex †.

P R U N U S.

1. **PRUNUS** inermis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff. 186.*

β. *Prunus. Baub. pin. 443.*

Prunus domestica. Lob. hist. 595.

γ. *Prunus fructu magno dulci atrocæruleo. Tournef. inst. 622.*

Pruna magna dulcia atrocærulæa. Baub. pin. 443.

Prunus fructu cerei coloris. Tournef. inst. 622.

δ. *Pruna coloris ceræ ex candido in luteum pallescentis. Baub. pin. 443.*

Pharm. PRUNA GALLICA minora, majora, Pulpa. Svecis Plommon.

Habitat nunc passim in Europa Australiori, Arbor.

Hospitatur ubique ad pagos, in Kinnekulle libentissime.

2. **PRUNUS** foliis ovatis cordatis. *Hort. cliff. 186.*

Mala armeniaca majora. Baub. pin. 442.

Malus armeniaca. Dod. pempt. 797.

Armeniaca malus fructu majore ex luteo rubescente. Herm. lugdb.

Svecis Apricofer.

Habitatio naturalis ignota Botanicis, sed forte orta est ab Armeniaca betulæ folio & facie, fructu ex succo. Amm. rhut. 192. n. 272. t. 29. & tunc Dauria erit.

Hospitatur in Frigidario per hyemes, Arbor.

CERA-

C E R A S U S.

1. CERASUS foliis ovato-lanceolatis, *Virid. cliff.* 43.
Hall. helv. 356. *Roy. lugdb.* 267.
- β. Cerasus fativa, fructu rotundo rubro acido, *Tournef. inst.* 625. *Bauh. pin.* 449.
Cerasa aproniana. *Plin. nat.* 15. c. 25.
Svecis Kõrsbår.
- γ. Cerasus fativa fructu majori. *Tournef. inst.* 625.
Cerasa fativa majora. *Bauh. pin.* 449.
Cerasia hispanica. *Tabern. ic.* 985.
Svecis Spanska-kõrsbår.
- δ. Cerasus major, fructu magno cordato. *Raj. hist.* 1538.
Cerasa crassa, carne dura. *Bauh. pin.* 450.
Cerasa duracina. *Plin. nat.* 15. c. 25.
Svecis Bigarotier.
- ε. Cerasus fructu albo dulci. *Tournef. inst.* 626.
Cerasa carne tenera & aquosa. *Bauh. pin.* 450.
Cerasa juliana. *Plin. nat.* 15. c. 25.
Svecis Moreller.
- ζ. Cerasa racemosa hortensis. *Bauh. pin.* 450.
Cerasus uno pediculo plura ferens & Cerasus racemosa. *Rauh. hist.* 1. p. 223.
Svecis Fågel-kõrsbår.
- η. Cerasus fructu acido serotino succi sanguinei. *Tournef. inst.* 625.
Cerasa acidissima sanguineo succo. *Bauh. pin.* 450.
Pharm. CERASORUM RUBRORUM Fructus, Rob, Con-
dita, Nuclei, Gummi.
Svecis Syltkõrsbår.
Habitat hodie vulgaris in Europa.
Hospitatur ubique in Hortis nostris, Arbor.
2. CERASUS foliis ovatis. *Virid. cliff.* 43. *Hall. helv.* 360.
Roy. lugdb. 268.
Cerasus foliis ovatis crenatis. *Hort. cliff.* 4. 487.
Cerasus sylvestris amara Mahaleb putata. *Bauh. hist.* 2. p. 227.
Ceraso affinis. *Bauh. pin.* 451.
Mahaleb. *Cam. epit.* 91.

Habi-

Habitat in *Helvetia*.

Hospitatur in *Frigidario*, & *sub dio*, Arbor.

P A D U S.

1. PADUS glandulis duabus dorso foliorum innatis.
Virid. cliff. 42.

Padus foliis sempervirentibus lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 185.

Lauro-Cerasus. *Clus. hist.* 1. p. 4. *Cam. hort.* t. 23.

Cerasus folio laurino. *Bauh. pin.* 450.

Habitat in *Trapezunto*, unde 1576. venit ad *Clusium* in *Europam*.

Hospitatur in *Tepidario*, arbor.

2. PADUS foliis glandula destitutis. *Virid. cliff.* 42.

Padus foliis sempervirentibus ovatis. *Hort. cliff.* 185.

Lauro-Cerasus lusitanica minor. *Tournef. inst.* 628. *Dill. elth.* 193. t. 159.

Habitat in *Lusitania*.

Hospitatur in *Frigidario*, Arbor.

D I G Y N I A.

C R A T Æ G U S.

1. CRATÆGUS foliis ovatis repando-angulatis serratis. *Hort. cliff.* 187. *Gron. virg.* 54.

Mespilus spinosa f. *Oxyacantha virginiana* maxima.
Angl. hortul. 49. t. 13. f. 1.

Mespilus, apii folio, *virginiana*, spinis horrida
fructu amplo coccineo. *Pluk. alm.* 249. t. 46. f. 4.

Habitat in *Virginia*, *Canada*.

Hospitatur in *Frigidario*, Arbor.

T E T R A G Y N I A.

T E T R A G O N I A.

1. TETRAGONIA. *Hort. cliff.* 188.

Tetragonocarpos africana rutilans, foliis longis & angustis. *Comm. hort.* 2. p. 205.

Evonymo affinis africana, flore luteo, portulacæ folio.
Seb. thes. 2. p. 13. t. 11. f. 8.

Tithy-

Tithymalo-Nissolia. *Magn. char.* 190.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis, caule annuo, succulenta.

P E N T A G Y N I A.

A I Z O O N.

I. **AIZOON** foliis cuneiformi-ovatis, floribus sessilibus.

Aizoön foliis obverse ovatis. *Hort. cliff.* 415.

Ficoidea procumbens, portulacæ folio. *Nissol. æt.*

1711. p. 422. t. 13. f. 1.

Kali Azoides canariensis procumbens, portulacæ pallescentibus succulentis foliis, asperugine rorida perpetuo madidis. *Pluk alm.* 202. t. 303. f. 4.

Volk. norib. 236. t. 236.

Habitat in *Canariis*,

Hospitatur hyeme in *Tepidario*, æstate in *Apricario*, raro plusquam biennis apud nos, succulenta.

MESEMBRYANTHEMUM.

I. **MESEMBRYANTHEMUM** foliis apice barbatis. *Hort. cliff.* 217.

Mesembryanthemum radiatum, ramis prolixis recumbentibus. *Dill. elth.* 245. t. 190. f. 234.

Ficoides capensis, tereti folio: apicibus hirtis. *Pet. gaz.* t. 77. f. 9.

Ficus aizoides, folio viridi in villos radiatos abeunte, flore rubro. *Bradl. succ.* i. p. 6. t. 5.

3. *Mesembryanthemum* radiatum humile, foliis minoribus & majoribus. *Dill. elth.* 246. 248. t. 190. f. 235. 236.

Habitat ad *Caput bonæ spei*.

Hospitatur in *Tepidario* & *Apricario*, perennis, succulenta.

.. **MESEMBRYANTHEMUM** vesiculis hispidum, foliis alternis ovatis obtusis undulatis. *Hort. cliff.* 216. n. 1.

Mesembryanthemum crystallinum, plantaginis folio undulato. *Dill. elth.* 231. t. 180. f. 221.

Habi-

Habitat forte in *Africa*.

Hospitatur in *Caldario* annua, aspergine pruinaeformi vesiculosa testa, succulenta.

3. MESEMBRYANTHEUM foliis lanceolatis planis crenulatis. *Hort. cliff.* 217.

Mesembryanthemum tripolii folio, flore argenteo. *Dill. elth.* 230. t. 179. f. 220.

Ficoides africanum, Mesembryanthemum f. Ficus aizoides major procumbens, tripolii folio magis succulento denticulis fimbriato, flore argenteo ad umbilicum aureo, fructu magno pyramidali quinquefariam diviso calloso, calyce pentagono incluso. *Pluk. mant.* 77. t. 329. f. 4.

Habitat in *Africa*.

Hospitatur in *Tepidario* & *Apricario*, non modo biennis, sed saepe perennis planta, succulenta.

4. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis semiteretibus glabris internodio longioribus. *Hort. cliff.* 220.

Mesembryanthemum tenuifolium procumbens flore coccineo. *Dill. elth.* 264. t. 201. f. 256.

Habitat ad *Caput bonae spei*.

Hospitatur in *Tepidario* & *Apricario*, perennis, pulchre florens, succulenta.

5. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis linguiformibus altero margine crassioribus. *Hort. cliff.* 217.

- β. Mesembryanthemum folio linguiformi latiore. *Dill. elth.* 236. t. 184. f. 225.

Ficoides afra acaulos, foliis latissimis crassissimis lucidis conjugatis, flore aureo amplo sine pediculo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 292.

Habitat in *Africa*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis, quotannis florens, succulenta.

6. MESEMBRYANTHEMUM foliis subcylindraccis acutis connatis arcuatis laevibus. *Hort. cliff.* 220.

Mesembryanthemum foliis vermiculi-formibus, floribus mellinis umbellatis. *Dill. elth.* 268. t. 203. f. 259.

Habitat in *Africa*.

Hospitatur *Tepidario*, perennis, succulenta.

7. MESEMBRYANTHEMUM caulescens, foliis subulatis semicylindraccis recurvis connatis longissimis. *Hort. cliff.* 219.

Mesemb

Mesembryanthemum loreum. *Dill. elth.* 264. *t.* 200.
f. 255.

Habitat in *Africa*.

Hospitatur in *Tepidario* & *Apricario*, perennis, nunquam florens, succulenta.

8. *MESEMBRYANTHEMUM* foliis subulatis subtus undique scabris. *Hort. cliff.* 219.

Mesembryanthemum purpureum scabrum, staminibus expansis. *Dill. elth.* 259. *t.* 197. *f.* 250.

Ficoides capensis, triangulari folio acuto, flore purpureo. *Pet. gaz.* *t.* 77. *f.* 3.

Habitat in *Africa*.

Hospitatur in *Tepidario* & *Caldario*, perennis, succulenta.

9. *MESEMBRYANTHEMUM* foliis alternis subulatis triquetris longissimis *Hort. cliff.* 216.

Mesembryanthemum pugioniforme, flore amplo stamineo. *Dill. elth.* 280. *t.* 210. *f.* 269.

Ficoides capensis, caryophylli folio, flore aureo specioso. *Bradl. succ.* 2. *p.* 5. *t.* 14.

Habitat ad *Caput bonæ spei*.

Hospitatur in *Tepidario* & *Apricario*, perennis, floribus speciosissimis succulenta †.

10. *MESEMBRYANTHEMUM* foliis alternis teretibus obtusis.

Mesembryanthemum teretifolium minimum neapolitanum flore albo, fructu subrotundo quinquecapulari. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 69.

Kali neapolitanum aizoides repens. *Column. ecphr.* 2. *p.* 72. *t.* 73.

Ficoides, folio tereti, neapolitana, flore candido. *Herm. lugdb.* 252.

Kali crassulæ minoris foliis. *Bauh. pin.* 289. *Morif. hist.* 2. *p.* 610. *f.* 5. *t.* 33. *f.* 5.

Kali 2. *Alp. ægypt.* 125. *t.* 127.

Habitat in *Ægypto* & *Neapoli*.

Hospitatur in *Tepidario*, *Caldario*, & *Apricario*, annua, succulenta.

M E S P I L U S.

MESPILUS foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, calycibus acuminatis. *Hort. cliff.* 189.

Mespilus germanica, folio laurino non ferrato f. *Mespilus sylvestris*. *Baub. pin.* 453.

Mespilus vulgaris. *Cam. epit.* 154.

Pharm. MESPILI fructus, Semina.

Habitat inter *Argentynam* & *Badenses* thermas.

Hospitatur in *Frigidario*, æstivat ad aquaria, Arbor.

P Y R U S.

* PYRUS foliis ferratis, pomis basi concavis. *Hort. cliff.* 189. *Fl. svec.* 402.

Svecis. Appel.

β. *Malus pumila*, quæ potius frutex quam arbor. *Baub. pin.* 433.

Poma paradisiaca. *Ruell. stirp.* 251.

Svecis Dvårgappell.

γ. *Malus sativa*, fructu subrotundo viridi ferrugineo. *Tournef. inst.* 635.

Mala prasomila. *Baub. pin.* 433.

Svecis Renetter.

δ. *Mala sativa*, fructu sanguinei coloris ex austero subdulci. *Tournef. inst.* 635.

Poma rubelliana. *Ruell. stirp.* 252.

Svecis Blodappel.

ε. *Malus fructu pellucido*.

Svecis Astracanske Äplen.

ζ. *Malus borstorphiana*.

Svecis Borstorse-äplen.

Habitat per *Europam*, præsertim in Hortis vulgi, infinita varietate.

Hospitatur sub dio, arbor.

* PYRUS foliis ferratis, pomis basi productis. *Hort. cliff.* 100. *Fl. svec.* 401.

β. *Pyrus sativa*, fructu autumnali sessili sacharato odorato e viridi flavescente in ore liquecente. *Tournef. inst.* 629.

Pyra falerna plinii. *Dalech. hist.* 306.

Pira Bergamotta gallis. *Baub. hist.* 1 p. 45.

Svecis Bergamotte.

γ. *Pyrus sativa*, fructu brumali magno pyramidato eslavco nonnihil rubente. *Tournef. inst.* 630.

Pyra

Pyra pompejana mammosa plinii. Dalech. hist. 306.

Pyra boni christiani. Bauh. hist. 1. p. 44.

Svecis Bon Chretien.

8. *Pyrus fativa, fructu æstivo moschato. Tournef. inst. 628.*

Pyra jesu s. moschatellina rubra. Bauh. hist. 1. p. 44.

Pyra favonia rubra. Dalech. hist. 306.

Svecis Desman-påron.

Habitat in Europa.

Hospitantur in Hortis etiam vulgi, varietates infinitæ, quas enumerare superfedeo. Arbor.

S P I R Æ A.

1. *SPIRÆA* foliis obtusis lanceolatis ferratis, floribus duplicato-racemosis. *Hort. cliff. 191.*

Spiræa folio longiore ferrato, floribus rubris. Amm. rutb. 86.

Spiræa theophrasti forte. Clus. hist. 1. p. 80.

Frutex spicatus, foliis salignis ferratis. Bauh. pin. 475.

Habitat in Sibiria & Tataria.

Hospitatur sub dio, cicur, ut inde sepes tonsæ fiant, frutex.

2. *SPIRÆA* foliis integerrimis, umbellis sessilibus.

Spiræa foliis integerrimis, pedunculis simplicibus. Hort. cliff. 190.

Hypericum frutescens americanum, flore albo, Jongq. paris. 92.

Pruno sylvestri affinis canadenses. Bauh. pin. 517. Pluk. alm. 308. t. 218. f. 5.

Habitat in Virginia, Canada.

Hospitatur sub dio, tamen non æque facilis ac præcedens, Frutex.

F I L I P E N D U L A.

1. *FILIPENDULA* foliis ternatis. *Hort. cliff. 191. Gron. virg. 55.*

Ulmaria virginiana trifolia, floribus candidis amplis longis & acutis. Moris. hist. 3. p. 323.

Ulmaria major trifolia, flore amplo pentapetalo, virginiana. Pluk. alm. 393. t. 236. f. 5. Raj. suppl. 330.

Habitat in Virginia.

Hospitatur in Tepidario, †, perennis.

P O L Y G Y N I A.

R O S A.

- * ROSA caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis. *Fl. svec.* 406.
- β. Rosa rubra multiplex. *Bauh. pin.* 481.
Pharm. ROSÆ RUBRÆ Flores, Condita, Conserva, Aqua, Oleum, Acetum, Succus, Placentæ, Tinctura, Spiritus, Antheræ, Semina.
Svecis Province - rofor.
- γ. Rosa odore cinnamomi, flore pleno. *Bauh. pin.* 483.
Svecis Canel - ros.
- δ. Rosa omnium calendarum. *H. R. P. Tournef. inst.* 639.
Svecis Månads - rofor.
- ε. Rosa minor, rubello flore, quæ vulgo a mense maio Majalis dicitur. *Bauh. pin.* 483.
Svecis Jungfru - Ros.
- ζ. Rosa lutea multiplex. *Bauh. pin.* 483.
Svecis Gula Rosor.
- η. Rosa versicolor. *Bauh. pin.* 481.
 Rosa prænestina alba & versicolor. *Bauh. hist.* 2. p. 37.
Svecis Brokuga - rofor.
- θ. Rosa alba, flore pleno. *Best. cyst. vern.* 6. t. 3. f. 1.
 Rosa alba vulgaris major. *Bauh. pin.* 482.
Pharm. ROSÆ ALBÆ Flores, Condita, Conserva, Aqua.
Sveeis Hvita Rosor.
- ι. Rosa centifolia batavica 2. *Clus. hist.* 1. p. 114.
 Rosa multiplex media. *Bauh. pin.* 482.
Barkanim. *Cels. hierob.* 2. p. 192.
Pharm. ROSÆ DAMASCENÆ Flores, Oleum, Conserva.
Svecis Holländska rofor.
- κ. Rosa eglanteriaa. *Tabern. ic.* 1087.
 Rosa sylvestris, foliis odoratis. *Bauh. pin.* 483.
Svecis Engelskt Törne.
 Habitat in Europa.
 Hospitantur omnes sub ævo, frutices.

R U B U S.

1. RUBUS caule inermi multifolio multifloro, foliis palmatis. *Hort. cliff.* 192.

Rubus odoratus. *Corn. canad.* 149. t. 150.

Habitat in Canada.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis, missus ab amico optimo D. *Asaco Lawsono*, qui anno 1747, in castis anglorum contra Gallos, medicinam faciens, mortuus est, cum nostro & artis nostræ summo damno, longiore vita dignissimus.

* RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule hispido. *Fl. svec.* 408.

β. Rubus vulgaris major, fructu albo. *Raj. syn.* 3. p. 467.

Habitat in Europa nostra.

Hospitatur *sub dio*, frutex biennis.

F R A G A R I A.

* FRAGARIA flagellis reptans. *Hort. cliff.* 192. *Fl. svec.* 414.

β. Fragaria fructu parvi pruni magnitudine. *Bauh. pin.* 327.

Svecis Jordgubbar.

Habitat in Europa nostra.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

P O T E N T I L L A.

1. POTENTILLA foliis pinnatis oppositis, caule dichotomo. *Hort. cliff.* 193.

Pentaphyllum alpinum minus supinum, foliolis tenuioribus altius ferratis glabris, cauliculo purpurascente. *Pluk. alm.* 285. t. 106. f. 7.

Pentaphyllum supinum quorundam, potentillæ facie. *Clus. hist.* 2. p. 107.

Quinquefolio fragifero affinis. *Bauh. pin.* 326.

Habitat infra Moguntiam & in Sibiria,

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

Obs. Folia inferiora alterna, dichotomiæ vero opposita; caulis procumbens.

* POTENTILLA foliis digitatis, caule erecto corymbofo. *Fl. svec.* 417.

Heptaphyllum majus luteum montanum, flore majore. *Morif. hist.* 2. p. 188. f. 2. t. 19. f. 1.

Quinquefolium erectum luteum. *Bauh. pin.* 325.

Quinquefolium alterum vulgare, *Dod. pempt.* 116.

Habitat in Italia & Gallia Narbonensi ad agrorum margines.

Hospitatur ubique in Horto, cicur, annua.

3. **POTENTILLA** foliis ternis, caule ramoso erecto, pedunculis supra genicula enatis.

Pentaphylloides fragariæ folio. *Magn. monsp.* 308.

Fragaria sterilis alpina caulescens, *Boerb. lugdb.* 1. p. 42.

Habitat Monspeli.

Hospitatur sub dio, annua, cicur.

Obs. Difficile distinguitur hæc species a *Potentilla ultima* Fl. suec. 420. sed flores in hac, non ex axillis dichotomiæ caulis, sed supra egrediuntur ad latera internodiorum. Folia & serraturæ longe in hac obtusiora, quam in altera.



CLASSIS XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

ARGEMONE.

1. ARGEMONE. *Hort. cliff.* 201.

Argemone mexicana. *Tournef. inst.* 239.

Papaver spinosum. *Bauh. pin.* 171. *prodr.* 93. *t.* 92. *Clus. hist.* 2. *p.* 93.

Papaver spinosum luteum, foliis albis venis notatis, *Morif.* 2. *p.* 277. *f.* 3. *t.* 14. *f.* 5.

Habitat in Mexico, Jamaica & omnibus insulis Caribæis.
Hospitatur sub dio, in ollis, seipsam ferens, annua.

PAPAYER.

1. PAPAVER caule multifloro, foliis simplicibus glabris incisfis caulinis.

Papaver foliis simplicibus glabris incisfis. *Hort. cliff.* 200.

a. Papaver hortense, semine albo. *Bauh. pin.* 170.

Papaver album sativum. *Lob. ic.* 272.

Papaver sativum. *Cam. epit.* 803.

Pharm. PAPAVERIS ALBI Herba, Syrupus, Oleum, Semina.

β. Papaver hortense, nigro semine. *Bauh. pin.* 170.

Papaver nigrum sativum. *Dod. pempt.* 445.

Pharm. PAPAVERIS NIGRI Semina, Capitula, Syrupus.

γ. Papaver cristatum, floribus & semine, album. *Bauh. pin.* 171.

Papaver fimbriatum & cristatum album. *Dalech. hist.* 1709.

δ. Papaver cristatum, floribus rubris, semine nigro. *Bauh. pin.* 171.

Papaver sativum rubrum fimbriatum. *Dalech. hist.* 1709.

ε. Papaver, flore pleno, album. *Bauh. pin.* 171.

Papaver multiplici flore. Cam. epit. 804.

Pharm. OPII CRUDI Succus, Extractum, Tinctura.

Svecis Wallmog.

Habitat in ruderatis *Europæ* magis calidæ.

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

2. PAPAVER caule ramoso, foliis lineari-pinnatifidis, capsulis fulcatis hispidis.

α. *Papaver* foliis ternato-pinnatifidis, capsulis fulcatis hispidis. *Hort. cliff. 201.*

Argemone capitulo brevior. *Bauh. pin. 172.*

Argemone capitulo torulis canaliculato. *Lob. ic. 276.*

β. *Argemone* capitulo longiore. *Bauh. pin. 172. Lob. ic. 276.*

γ. *Glaucium* flore violaceo. *Tournef. inst. 254*

Papaver corniculatum violaceum. Bauh. pin. 172.

Papaver corniculatum, violaceo flore. Clus. hist. 2. p. 92.

Habitat inter segetes *Angliæ, Galliæ, Hispaniæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

Obs. α Capsula globosa sexsulcata more melonis, stigmate hexagono. γ. capsula cylindrica trisulca, stigmate trifido: interim tamen easdem esse plantas radix annua. caulis brevis. folia multifido-linearia, nitida. capsulæ hispidæ evincunt.

3. PAPAVER caule unifloro scabro subfolioso, foliis pinnato-sinuatis.

Papaver orientale hirsutissimum, flore magno. Tournef. cor. 17. itin. 3. p. 127. t. 127. Comm. rar. 34 t. 34.

Papaver capsula & flore maximis, folio inciso & hirsutissimo obscure viridi. *Boerb. lugdb. 1. p. 278.*

Habitat in Oriente.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

4. PAPAVER caule unifloro nudo hispido, foliis pinnato-sinuatis.

Papaver erraticum nudidicaule, flore flavo odorato. Dill. elth. 302. t. 224. f. 291.

Papaver erraticum, luteo flore, capite oblongo hispido. Amm. ruth. 61. n. 81.

Habitat in *Sibiria.*

Hospitatur *sub dio*, perennis, flore flavo aut albo.

* PAPAVER caule multifloro folioso hispido, foliis pinnatifidis, capsulis lævibus.

Papaver foliis pinnatifidis hispidis, fructu ovato. *Hort. cliff. 201. Fl. svec. 488.* Papa-

- β. *Papaver erraticum majus*, foliis florum variegatis.
Boerb. lugdb. 1. p. 280.
- γ. *Papaver erraticum*, flore pleno. *Baub. pin. 171.*
 Habitat in *Europa*.
 Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

CHELIDONIUM.

- * CHELIDONIUM pedunculis multifloris. *Hort. cliff. 201. Fl. svec. 430.*
- β. *Chelidonium majus*, foliis & flore tenuissime laciniatis.
Moris. hist. 2. p. 258.
Chelidonium majus, foliis quernis. *Baub. pin. 144.*
Chelidonium majus, laciniato folio. *Clus. hist. 2. p. 203.*
 Habitat in *Europa*.
 Hospitatur *sub dio*, perennis, cicur.
 Obs. *Folia pinnata, sed foliola fere palmata: petala multifido-lacera.*
2. CHELIDONIUM glabrum, pedunculis unifloris.
Glaucium flore luteo. Tournef. inst. 254.
Papaver corniculatum luteum. Baub. pin. 171.
Papaver corniculatum, flavo flore. *Clus. hist. 2. p. 91.*
 Habitat in littoribus arenosis *Angliæ, Galliæ, Italiæ, Helvetiæ, Virginiae*.
 Hospitatur *sub dio*, annua.
3. CHELIDONIUM hispidum, pedunculis unifloris.
Glaucium hirsutum, flore phœniceo. *Tournef. inst. 254.*
Papaver cornutum, phœniceo flore. *Clus. hist. 2. p. 91.*
 Habitat ad agrorum margines in *Hungaria, Bohemia*.
 Hospitatur *sub dio*, annua.

PODOPHYLLUM.

1. PODOPHYLLUM. *Hort. cliff. 202. Gron. virg. 57.*
Anapodophyllum canadense morini. Tournef. inst. 239.
Catesb. carol. 1. p. 24. t. 24.
Dentaria monophyllos. Moris. blef. 258.
Nymphææ congener alpina. Pluk. alm. 267.
Papaveri affinis montana aconitifolia. Herm. lugdb. 476.
Herbæ paris affinis montana aconitifolia, Pomum majale londinensibus. Raj. hist. 671.
Solano congener monophyllum aut diphyllum, aconiti folio, flore albo. Moris. hist. 3. p. 533.
Aconitifolia humilis, flore albo unico campanulato, fructu cynosbati. Mentz. pug. 11.

Ranunculi facie peregrina. *Jong. parif.* 153.

Habitat in *Canada, Virginia, Carolina.*

Hospitatur *sub dio*, loco umbroso, perennis.

A C T Æ A.

* ACTÆA. *Hort. cliff.* 209. *Fl. svec.* 431.

β. Christophoriana americana racemosa, baccis niveis.

Morif. hist. 2. p. 8. f. 1. t. 2. f. 7.

Aconitum baccis niveis. *Corn. canad.* 76. t. 77.

Habitat in *Canada.*

Hospitatur *sub dio*, cicur, perennis.

E U P H O R B I A.

1. EUPHORBIA aculeata nuda quinquangularis. *Hort. cliff.* 196.

Tithymalus aizoides fruticosus canariensis aphyllus quadrangularis & quinqueangularis, spinis geminis aduncis atronitentibus armatus. *Comm. hort.* 2. p. 207. t. 104.

Tithymalus aizoides lactifluus f. Euphorbia canariensis quadrilatera & quinquelatera cerei effigie, ad angulos per crebra intervalla spinis rectis atro-nitentibus gazellæ cornua referentibus armata. *Pluk. alm.* 3700. t. 320. f. 2.

Habitat in *Canariis.*

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

2. EUPHORBIA aculeata triangularis subnuda articulata, ramis patentibus. *Hort. cliff.* 196. *Fl. zeyl.* 199.

α. Tithymalus aizoides triangularis & quadrangularis articulosus & spinosus, ramis compressis. *Comm. præf.* 21. 55. t. 5.

β. Euphorbium antiquorum verum. *Comm. hort.* 1. p. 23. t. 12.

Schadidacalli. *Rhed. mal.* 2. p. 81. t. 42.

Habitat in *India orientali.*

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

3. EUPHORBIA aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 196.

Euphorbium polygonum spinosum, cerei effigie. *Isnardi act.* 1720. p. 500. t. 10.

Euphor

Euphorbium cerei effigie, caulibus crassioribus, spinis validioribus armatum. *Comm. hort.* 1. p. 21. t. 11. *Seb. thes.* 1. p. 29. t. 19. f. 2.

Euphorbium. *Bauh. pin.* 387.

Pharm. EUPHORBII Gummi, Oleum.

Habitat in *Æthiopia* & *Africa* calidissima.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

4. *EUPHORBIA* aculeata seminuda, angulis oblique tuberculatis. *Hort. cliff.* 196. *Fl. zeyl.* 200.

Tithymalus indicus spinosus, nerii folio. *Comm. hort.* 1. p. 25. t. 13.

Tithymalus aizoides arborescens spinosus, caudice angulari, nerii folio. *Comm. præl.* 22. 16. t. 6.

Habitat in *India orientali*.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

5. *EUPHORBIA* inermis imbricata tuberculis foliolo lineari instructis. *Hort. cliff.* 197.

Euphorbium anacanthum squamosum, lobis florum tridentatis. *Isnard. act.* 1720. p. 502. t. 11.

Euphorbium erectum aphyllum, ramis rotundis, tuberculis tetragonis. *Burm. afr.* 16. t. 7. f. 2.

Euphorbium procumbens, ramis plurimis simplicibus squamosis, foliolis deciduis. *Burm. afr.* 17. t. 8.

Euphorbium procumbens, ramis geminatis, caule glabro oblongo cinereo. *Burm. afr.* 18. t. 9. f. 1.

Euphorbium humile procumbens, ramis simplicibus copiosis, caule crassissimo tuberoso. *Burm. afr.* 20. t. 10. f. 1.

Tithymalus aizoides africanus, simplici squamato caule. *Comm. præl.* 23. 57. t. 7.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

6. *EUPHORBIA* inermis fruticosa subnuda filiformis erecta, ramis patulis determinate confertis. *Hort. cliff.* 197. *Fl. zeyl.* 197.

Tithymalus indicus frutescens. *Comm. hort.* 1. p. 27. t. 14.

Tithymalus arborescens, caule aphylo. *Pluk. phyt.* 319. f. 9.

Tirucalli. *Rheed. mal.* 8. p. t. 44.

Habi-

Habitat in *India orientali*.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

7. *EUPHORBIA* inermis fruticosa nuda filiformis volubilis, cicatricibus oppositis. *Hort. cliff.* 197. *descr.*
Tithymalus indicus vimineus penitus aphyllus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 259.

Fel-fel-tavil. *Alp. ægypt.* 190. t. 190. *Dill. elth.* 368.

Habitat in *Africa* maritimis.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta, frutex.

8. *EUPHORBIA* inermis fruticosa seminuda filiformis flaccida, foliis alternis. *Hort. cliff.* 197. *descr.*
Tithymalus aphyllus mauritaniae. *Dill. elth.* 384. t. 289. f. 373.

Habitat in *Africa* maritimis.

Hospitatur hyeme in *Caldario*, æstate in *Frigidario*, frutex, succulenta.

9. *EUPHORBIA* inermis, caule fruticoso, foliis distiche alternis ovatis. *Hort. cliff.* 198.

Tithymalus curassaricus myrtifolius, flore coccineo mellifluo. *Herm. parad.* 234. t. 234.

Tithymalus curassavicus myrtifolius, flore papilionaceo coccineo parvo. *Comm. hort.* 1. p. 31. t. 16. *Pluk. alm.* 369 t. 230. f. 2.

Habitat forte in *Curassao*.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta, frutescens, †.

10. *EUPHORBIA* inermis, foliis oppositis lanceolatis, umbella universali quadrifida tetraphylla, ulterioribus dichotomis.

Euphorbia inermis, foliis oppositis lanceolatis, umbella universali trifida polyphylla, partialibus triphyllis, reliquis diphyllis. *Hort. cliff.* 198.

Esula major. *Rupp. jen.* 219.

Lathyris major. *Baub. pin.* 293.

Lathyris. *Cam. epit.* 968. *Fuchs. hist.* 454.

Cataputia minor. *Lob. ic.* 362.

Pharm. CATAPUTIAE MINORIS Semina.

Habitat ad agrorum margines in *Gallia*, *Italia*.

Hospitatur in *Frigidario*, biennis.

Obs. Folia umbellæ universalis lanceolata; umbellulæ cordato-lanceolata. Flores tetrapetali obtusi emarginati, omnes hermaphroditi. Fructus glaber.

11. *EUPHORBIA* inermis, foliis alternis lanceolatis ample-

amplexicaulibus subserratis, umbella universali quinquefida pentaphylla, partialibus bifidis

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella universali partialumque prima quinquefidis, secunda trifida, reliquis bifidis. *Roy. lugdb.* 198.

Tithymalus arvensis latifolius germanicus. *Bauh. pin.* 291.

Tithymalus platyphyllos. *Fuchsf. hist.* 813.

Habitat in *Agris Germaniae, Galliae, Angliae.*

Hospitatur sub dio, annua, cicur.

Obs. Folia subamplexicaulia patentissima lanceolata, umbellae folia ovata, umbellulae cordata, omnia serrulata. Petala quatuor, integra; flores omnes hermaphroditi; fructus hispidus.

12. *EUPHORBIA inermis*, foliis denticulatis, caulibus lanceolatis, umbellularum cordatis. *Hort. cliff.* 200.

Tithymalus characias, folio serrato. *Bauh. pin.* 290.

Tithymalus characias 5. *Dod. pempt.* 369.

Tithymalus myrtites valentinus. *Clusf. hist.* 2. p. 189.

Habitat in Regno *Valentino, Gallia Narbonensi.*

Hospitatur sub dio, †.

Obs. Folia lanceolata serrata. umbella universalis quinquefida, pentaphylla; partialibus trifidis triphyllis; propriis diphyllis dichotomis. Folia umbellae ovato-lanceolata, umbellulae ovata, omnia serrata. Petala quatuor integra; flores omnes hermaphroditi; fructus glaber.

13. *EUPHORBIA inermis*, foliis superioribus reflexis latioribus lanceolatis, umbella universali trifida, partialibus bifidis. *Hort. cliff.* 199.

Tithymalus myrsinites latifolius. *Bauh. pin.* 290.

Tithymalus myrsinites legitimus. *Clusf. hist.* 2. p. 189.

Tithymalus myrsinites 1. *Tabern. hist.* 989.

Habitat in *Calabria.*

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

14. *EUPHORBIA inermis*, foliis lanceolato-linearibus, involucris universalis foliolis quinque ovato acutis, partialis semiorbiculatis.

Tithymalus maritimo affinis, linariae folio. *Bauh. pin.* 291.

Tithymalus amygdaloides angustifolius. *Tabern. hist.* 1. p. 988.

Esula minor. *Dalech. hist.* 1653.

Aly-

Alypum. Cam. epit. 985.

Habitat in *Europa australiori*,

Hospitatur in *Frigidario*, sæpius perennis.

15. *EUPHORBIA* inermis, foliis confertis linearibus, umbella universali multifida, partialibus dichotomis, foliolis subrotundis. *Hort. cliff. 199.*

Tithymalus foliis pini. *Baub. pin. 292.*

Tithymalus cupressinus. 1. 2. *Tabern. hist. 990.*

Habitat in *Italia*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

Obs. Folia in caule crassiore lanceolata, eis deciduis excrescunt rami foliis linearibus, angustissimis confertis, horizontalibus, facie pini.

16. *EUPHORBIA* inermis, foliis lanceolatis, umbella universali multifida, partialibus dichotomis, involucris semibifidis perfoliatis. *Hort. cliff. 199.*

Tithymalus characias rubens peregrinus. *Baub. pin. 290.*

Tithymalus characias 1. *Clus. hist. 2. p. 188.*

Habitat in *Helvetia*, *Germania*, *Anglia*, *Gallia Narbonensi*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

Obs. Caules crassi, rubentes, exasperati cicatibus a casu foliorum in infima parte. Flores primi masculi, pentapetali, æquales, reliqui hermaphroditi inæquales, petalis lunatis; involucria monophylla, perfoliata, emarginata.

17. *EUPHORBIA* inermis fruticosa, foliis lanceolatis, involucrio universali quinquefido, partialibus trifidis, reliquis bifidis.

Tithymalus arboreus, caule corallino, folio hyperici, pericarpio barbato. *Boerb. lugdb. 1. p. 256.*

Habitat in *oriente*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

Desc. Caules plures, simplissimi, annui, teretes, ulnares, fere juncei, erecti. Folia lato-lanceolata, obtusiuscula, sessilia, alterna, integerrima, subtus villosa, margine sæpe rufescentia. Umbella universalis quinquefida; partialis trifida; demum dichotoma. Involuerum universale pentaphyllum; parziale triphyllum; demum diphylla foliolis ovato-oblongis; in ulterioribus ovatis, omnibus pilosiusculis. Corolla petalis quatuor integris. Capsulæ globosæ, vix sulcatæ, testæ lana alba rara, longa.

18. *EUPHORBIA* inermis, foliis alternis linearibus acutis, partialibus umbellulæ ovato-rhombeis, petalis bicornibus.

Tithymalus annuus erectus, folio oblongo acuminato. *Tournef. inst. 87.*

Tithymalus segetum longifolius. *Raj. syn. 3. p. 312.*

Pepliss

Peplis annua, foliis acutis, flore muscoso. *Bocc. sic.* 24.

t. 13. *f.* 1.

Habitat inter segetes *Galliae*, *Italiae*.

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

Descr. Caulis pedalis, inferne rubens. Rami breves versus radicem caulis. Folia *Lini*, linearia, acuta, alterna, pallide viridia. Folia umbellae lanceolata; umbellularum vero ovata, lateribus angulata, hinc quasi quadrangularia; Petala lutea bicornia. Ex alis superioribus foliorum multi alterna tim pedunculi umbellulas partiales ferentes.

19. *EUPHORBIA* inermis, foliis alternis linearibus acutis, umbella universali trifida, partialibus dichotomis diphyllis. *Hort. cliff.* 199.

Tithymalus. f. *Esula exigua*. *Bauh. pin.* 291. *Moris. hist.* 3. p. 339. *f.* 10. *t.* 2. *f.* 5.

Esula minima tragi. *Dalech. hist.* 1656. *Lob. ic.* 357.

Habitat inter segetes *Galliae*, *Angliae*, *Belgii*.

Hospitatur *sub dio*, annua †.

Obs. Flores tetrapetali, bicornes. Foliola umbellae & umbellularum reliquis non latiora. Fructus glaber.

20. *EUPHORBIA* inermis, foliis ovalibus oppositis hinc serratis uniformibus, ramis alternis, caule erectiusculo. *Hort. cliff.* 198. n. 15.

Tithymalus erectus, floribus rarioribus, foliis oblongis glabris integris. *Burm. zeyl.* 224. *t.* 105. *f.* 2. *bona.*

Tithymalus indicus annuus dulcis, floribus albis, cauliculis viridantibus. *Pluk. alm.* 379. *t.* 113. *f.* 2.

Tithymalus africanus f. *Peplis major brasiliensis*. *Comm. prael.* 60. *t.* 10.

Habitat in *Asiae*, *Africae*, *Americae* calidioribus.

Hospitatur in *Caldario*, annua †.

Obs. Facies *Hyperici*. Folia altero latere serrata, altero integra. Flores tetrapetali, integri, albi, tenues s. plani tenues & membranacei, minimi at in *Europaeis* carnosae petala.

CISTUS.

1. *CISTUS* arboreus, foliis sessilibus utrinque villosis rugosis, inferioribus ovatis basi connatis, summis laceolatis. *Hort. cliff.* 205.

Cistus mas angustifolius. *Bauh. pin.* 464.

Cistus mas 2. *Clus. hist.* 1. p. 69. *Dalech. hist.* 225.

Habitat in *Hispania*.

Hospitatur hyeme in *Tepidario*, frutex.

2. *CIS-*

2. CISTUS foliis lanceolatis sessilibus utrinque villosiss
trinervis, alis nudis. *Hort. cliff.* 205.

Cistus ladanifera monspeliensium. *Baub. pin.* 467.

Ledum. *Dalech. hist.* 230.

Habitat in *Gallia Narbonensi* & Regno *Valentia*.

Hospitatur in *Tepidario*, Frutex.

3. CISTUS herbaceus erectus glaber, floribus solitariis
subsessilibus folio oppositis.

Cistus ledi folio. *Baub. pin.* 465.

Cistus annuus foliis ledi. *Lob. ic.* 2. p. 118.

Helianthemum ledi folio. *Tournef. inst.* 249.

Habitat *Monspeli*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

4. CISTUS herbaceus decumbens villosus, floribus soli-
tariis subsessilibus folio oppositis.

Cistus folio salicis. *Baub. pin.* 465.

Cistus annuus, folii salicis. *Lob. ic.* 2. p. 118.

Cistus annuus 1. *Clus. hist.* 1. p. 76.

Helianthemum salicis folio. *Tournef. inst.* 249.

Habitat ad margines agrorum apud *Salmanticenses* & *Granatenses*,

Hospitatur *sub dio*, annua.

P E G A N U M.

1. PEGANUM foliis multifidis.

Peganum. *Hort. cliff.* 206.

Ruta sylvestris, flore magno albo. *Baub. pin.* 338.

Harinala. *Dod. pempt.* 121. *Tournef. inst.* 257.

Habitat in arena mobili, ubi vix aliæ plantæ germinant circa *Alexan-*
driam, *Madritium*, inque *Cappadocia* & *Galatia*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

M I M O S A.

1. MIMOSA foliis digitatis, foliolis pinnatis, caule
aculeato hispidoque, foliis pinnato-palmatis: sin-
gulis numerose pinnatis. *Hort. cliff.* 208. n. 3.

Mimosa spinosa tertia s. foliolis acaciæ angustioribus,
siliquis parvis echinatis. *Breyn. cent.* 40. t. 18.

Æschynomene spinosa, flore globoso albido, filicu-
lis articulatis echinatis. *Comm. hort.* 1. p. 57. t. 29.

Habitat in *Brasilia*.

Hospitatur in *Caldario* & *Vaporariis*, fruticans.

2. MI-

2. MIMOSA foliis conjugatis, foliolis pinnatis pinnis
senis subæqualibus.

Mimosa, folio lato fennæ, spinosa. *Boerb. lagdb. 2.*
p. 55.

Æschynomene spinosa latifolia f. *Herba viva* vel *Mi-*
mosa latifolia, piloso & subrotundo folio. *Comm.*
hort. 1. p. 55. t. 28.

Habitat in *Brasilia*.

Hospitatur in *Vaporariis*, perennis.

3. MIMOSA foliis duplicato-pinnatis, spicarum flori-
bus inferioribus plenis, caule inermi procumbente.

Mimosa herbacea non spinosa procumbens & palustris,
flore luteo pleno. *Amm. ruth. 587. n. 48. Houst.*
msc. t. bona.

Habitat in *Vera cruce*.

Hospitatur in *Caldario*, & *Vaporario*, nobis annua.

Descr. Caules inermes, decumbentes, virgati. Stipulæ ovatæ, acutæ. Folia
duplicato-pinnata, foliolis partialibus quatuor utrinque, singula pinnata.
Spicæ solitariae ex alis, pedunculatæ, (pedunculo una alterave squama
cincto) ovatæ, inflexæ; constantes floribus inferioribus plenis, majoribus,
longioribus, patulis; superioribus vero floribus spicæ pentandris, staminibus
longis, pistillo brevi.

4. MIMOSA inermis decumbens, foliis duplicato-pin-
natis, spicis cernuis, floribus pentandris, inferiori-
bus castratis.

Habitat in *America*.

Hospitatur in *Caldario*, perennis herbacea,

Descr. Caules pedales, bipedales, virgati, plures, decumbentes, teretes, vivi-
des. Rami breves, alterni, horizontales. Folia duplicato-pinnata; par-
tialia duo vel tria paria, foliolis ovali-oblongis, numerosis, æqualibus,
viridibus, medietate inferiore s. baseos proxima glauca seu palidiora. Pe-
dunculus ex alis solitarius, erectus, bractea cordata semiamplexicanti in
medio instructus. Spica cylindrica, recurva. Flores antheris quinque in-
structi, sed inferiores a parte masculina steriles. Glandula nectarifera parva
inter foliola infima petiolis innata. Folia tacta sese contrahunt, sed tarde.
Facies omnino Mimosæ herbacæ non spinosæ procumbentis & palustris,
flore luteo pleno. *Houst, Mss. c. figura. Amm. ruth. 587. n. 48. odor*
parum grævis foliorum,

Obs. Forte itaque quædam synonyma Mimosæ sequentis, in *Fl. Zeylanica* 505
data ad hanc amandari debent, cum *Zeylanica* se vix manifeste contrahat,
nisi valde tenellâ, & *Zeylanicæ* rami angulati sint.

5. MIMOSA inermis foliis duplicato-pinnatis, spicis
cernuis, floribus decandris, inferioribus castratis
apetalis. *Flor. zeyl. 505.*

Mimosa inermis, foliis duplicato-pinnatis, filiquis linearibus glabris. *Hort. cliff.* 209.

Habitat in *India orientali*.

Hospitatur in *Caldario*, toto anno, ubi floret & semina profert. Frutex.

6. *MIMOSA* spinis geminis distinctis, foliis duplicato pinnatis, partialibus utrinque octo.

Acacia indica farnesiana. *Ald. hort.* 2. *Raj. hist.* 977.

Acacia indica, foliis scopioidis leguminosæ, filiquis fuscis teretibus resinosis. *Herm. lugdb.* 5.

Habitat in *Domingo*.

Hospitatur in *Caldario*, Arbor.

Obs. Flores sessiles, capitati, lutei, suaveolentes, polyandri. Legumina teretia, crassa, utrinque angustiora, obtusa.

7. *MIMOSA* spinis geminatis distinctis, foliis duplicato pinnatis, partialibus utrinque quinque pluribus.

Hort. cliff. 209. n. 10. *Roy. lugdb.* 471.

Acacia, Sant & Akakia. *Alp. ægypt.* 6.

Acacia vera. *Bauh. hist.* 429.

Acacia. *Bauh. pin.* 392.

Schitta. *Cels. hierob.* I. p. 498.

Pharm. ACACIÆ ÆGYPTIACÆ Succus.

ARABICUM Gummi.

Habitat in *Ægypto*, *Arabia*, *Sinai*.

Hospitatur in *Caldario*, Arbor.

P O R T U L A C A.

1. *PORTULACA* foliis cuneiformibus sessilibus. *Roy. lugdb.* 472. *Gron. virg.* 59. *Hall. helv.* 392.

Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis sessilibus, floribus subsessilibus. *Hort. cliff.* 207.

Portulaca latifolia sativa. *Bauh. pin.* 288.

Portulaca domestica. *Lob. ic.* 388.

Pharm. PORTULACÆ Herba, Conserva, Syrupus, Aqua, Semina.

Svecis Portulak.

Habitat in Sterilibus vervectis *Europæ*, *Asiæ*, *Americæ*.

Hospitatur sub dio, annua.

A N A C A M P S E R O S.

1. *ANACAMPSEROS* foliis ovatis convexis acutiusculis.

Ana-

Anacampseros foliis acuminatis. *Hort. cliff.* 207.

Telephiastrum flore globofo. *Dill. elth.* 375. t. 281. f. 363.

Portulaca africana sempervivens, flore rubicundo. *Comm. hort.* 2. p. 177. t. 89. *Old. afr.* 32. *Raj. app.* 507.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Caldario*, succulenta.

2. ANACAMPSEROS caule arboreo, foliis cuneiformibus oppositis. *Hort. cliff.* 207.

Crassula, portlandicæ facie, arborefcens. *Dill. elth.* 120. t. 101. f. 120.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Caldario*, Frutex, succulenta.

Obf. Nondum detecta est fructificatio, ut de genere quid tuto asserere liceat.

C O R C H O R U S.

1. CORCHORUS capsulis oblongis ventricosus, foliorum infimis ferraturis setaceis reflexis. *Fl. zeyl.* 213.

Corchorus plinii. *Baub. pin.* 317.

Corchorus f. Melochia f. Olus judaicum. *Cam. hort.* 47. t. 12.

Melochia. *Alp. ægypt.* 45. t. 45.

Habitat in *Asia*, *Africa*, *America*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

2. CORCHORUS capsulis subrotundis depressis rugosis. *Fl. zeyl.* 214.

Alcea olitoria f. Corchorus americana, prælongis foliis, capsula striata subrotunda brevi. *Pluk. alm.* 13. t. 255. f. 4.

Habitat in *America*, *Zeylonâ*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

3. CORCHORUS capsulis linearibus compressis bivalvibus.

Corchorus folio ulmi major. *Plum. spec.* 7.

Corchorus americanus minor, carpinifolio, filiqua angustissima ex lateribus ramorum proveniente. *Breyn. prodr.* 3. p. 56.

Corchoro affinis, Chamædryos folio, flore stamineo, seminibus atris quadrangulis duplici serie dispositis. *Sloan. flor.* 50. *hist.* 1. p. 145. t. 94. f. 1. *Raj. suppl.* 516.

Habitat in saxosis *Jamaicæ*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

Obi. Folia carent infimo dente setaceo, quo præcedentes gaudent & capsulæ bivalves, biloculares & perfectæ siliquosæ sunt, nihilominus est genuina species *Corchori*.

X Y L O N.

1. **XYLON** foliis digitatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 220.

Xylon caule inermi. *Hort. cliff.* 75.

Gossypium javanense, salicis folio. *Bauh. pin.* 430.

Ponja. *Rhed. mal.* 3. p. 59. t. 49. 50. 51.

Habitat in *India*.

Hospitatur in *Caldario*, arbor †.

2. **XYLON** foliis digitatis, caule aculeato. *Fl. zeyl.* 221.

Xylon caule aculeato. *Hort. cliff.* 75.

Gossypium arboreum, caule spinoso. *Bauh. pin.* 430.

Moul-elavou. *Rheed. mal.* 3. p. 61. t. 52.

Habitat in *India* utraque.

Hospitatur in *Caldario*, Arbor †.

B I X A.

1. **BIXA**. *Hort. cliff.* 211.

Mitella americana maxima tinctoria, *Tournef. inst.* 242.

Orleana f. *Orellana*, folliculis lappaceis. *Pluk. alm.* 272.

t. 209. f. 4. *Comm. hort.* 1. p. 65. t. 33.

Arbor mexicana, fructu castaneæ, coccifera. *Bauh.*

pin. 419. *Raj. hist.* 1771.

Pharm. ORLEANA Terra.

Habitat in *Brasilia*, *Mexico*, *Jamaica* aliisque calidioribus *Americæ*.

Hospitatur in *Caldario*, arbor.

T R I U M F E T T A.

1. **TRIUMFETTA**. *Hort. cliff.* 210. *descr.*

Lappula bermudensis althæoides spicata, fructu orbiculari majore. *Pluk. alm.* 206. t. 215. f. 7.

Agrimonia lappacea inodora, folio subrotundo dentato. *Sloan. flor.* 92. *hist.* 1. p. 11. *Raj. suppl.* 247.

Habitat in *Jamaica*, *Brasilia*, *Bermudis*.

Hospitatur in *Caldario*, sed sæpe perit, vix floret, frutescens.

DIGYNIA

PÆONIA.

1. PÆONIA. *Hort. cliff.* 211.

a. Pæonia foliis lobatis ex ovato-lanceolatis. *Hall. helv.* 311.

Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. *Baub.* pin. 323.

Pæonia mas. *Lob. ic.* 684.

Pharm. PÆONIÆ Radix, Fæculæ, Conserva, Syrupus, Tinctura, Aqua, Semina.

Svecis Corall-Pion.

β. Pæonia communis vel femina. *Baub.* pin. 323.

Pæonia foliis difformiter lobatis. *Hall. helv.* 311.

Pæonia femina. *Lob. ic.* 682.

Pharm. PÆONIÆ Flores, Conserva, Syrupus.

Svecis Ånkla Pioner.

γ. Pæonia femina, flore pleno rubro majori. *Baub.* pin. 324.

Pæoniæ feminæ multiplex flos. *Dod. pempt.* 195.

Svecis Pion.

Habitat in umbrosis *Helvetiæ* & *Idæ* in *Creta* vallibus montium.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

TRIGYNIA.

RESEDA.

1. RESEDA floribus tetragynis, foliis pinnatis.

Reseda foliis pinnatis integerrimis. *Hort. cliff.* 212.

Reseda maxima. *Baub.* pin. 100. *Lob. hist.* 110.

Habitat *Monspeli.*

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

Obs. Hæc variat foliis undulatis & crispa evadit.

2. RESEDA foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis. *Hort. cliff.* 212.

Reseda vulgaris. *Baub.* pin. 100.

β. Reseda crispa gallica. *Bocc. sic.* 77. t. 41. f. 3.

Reseda massiliensis foliis latioribus crispis. *Pluk. alm.*

317. t. 55. f. 4.

Habitat in montibus cretaceis murisque Belgii, Angliæ, Galliæ, Italiæ.
Hospitatur sub dio, biennis.

3. RESEDA floribus trigynis, calycibus maximis hexaphyllis.

Reseda foliis integris trilobisque, calycibus maximis.

Hort. cliff. 212.

β. Reseda minor vulgaris, foliis integris. *Tournef. inst.* 423.

Resedæ affinis Phyteuma quorundam. *Dalech. hist.* 1198.

Phyteuma. *Baub. hist.* 3. p. 386. fig.

Habitat Monspeli, Parisiis, Romæ.

Hospitatur sub dio, annua, †.

Descr. Radix annua, Caulis ramosus diffusus herbaceus Calyx hexaphyllus, maximus; Corolla hexaphylla. Petala duo suprema majora, alba, capillaceo-multifida. Petala duo media minora alba, capillaceo-multifida. Petala duo infima capillacea simplissima. Horum quatuor suprema basi squamata nectarium constituunt. Stamina sedecim, filamentis subulatis, crassis, flavescentibus, brevibus; Antheris oblongis flavescentibus. Germi- nis styli tres. Fructus in pedunculo horizontali calyce maximo, reflexo, Capsula tricuspidi aperta, supra basin glandulam nectarii ferens ovatam.

DELPHINIUM.

1. DELPHINIUM caule simplici, nectariis monophyllis. *Hort. cliff.* 213.

Delphinium hortense (species 14-39.) *Tournef. inst.* 426.

Consolida regalis hortensis, flore majore & simplici.

Baub. pin. 142.

Flos regius. *Dod. pempt.* 252.

β. Consolida regalis, flore majore & simplici. *Baub. pin.* 142.

Habitat - -

Hospitatur sub dio, ubique in hortis, annua.

2. DELPHINIUM nectariis diphyllis, foliis palmatis laciniis integerrimis. *Hort. cliff.* 213.

Delphinium, platani folio, Staphisagria dictum. *Tournef. inst.* 428.

Staphis agria. *Baub. pin.* 324. *Dod. pempt.* 366.

Pharm. STAPHISAGRIÆ Semina.

Habitat in Istria, Dalmatia, Calabria, Apulia, Creta.

Hospitatur in Frigidario, biennis.

3. DELPHINIUM nectariis diphyllis; labellis integris, floribus subsolitariis, foliis compositis linearibus multipartitis.

Delphinium elatius subincanum, perenne, floribus am-
plis azyreis. *Amm. ruth.* 132. n. 175. Delphii

Delphinium lusitanium glabrum, aconiti folio. (Tournef. inst. 426?) Roloff. ind. 61. t. 3.

Habitat in Sibiria.

Hospitatur sub dio, perennis.

Descr. Radix perennis. Caulis semipedalis, subdivisus, & facies totius plantæ *Delphinii segetum* Fl. suec. 440. sed majora omnia, & flores omnium speciosissimi, & diphylla nectaria & radix perennis, hinc varietas esse nequit. Caulis subtomentosus; non strictus sed sæpe debilis. Folia composita ex ternis foliis, singulis trichotomis linearibus, ovatis, glabris, supra nitidis, linea exaratis. Corolla magna cærulea, nectaria itidem cæruleæ, sed labellis reflexis, stamina omnino occultantibus, integris, ad basin luteo-barbatis, minime bifidis, aut apice barbatis. Calcar parum rugosum est.

4. **DELPHINIUM** nectariis diphyllis, labellis bifidis apice barbatis, foliis incisis, caule erecto.

Delphinium nectariis diphyllis, foliis peltatis multipartitis acutis. Hort. cliff. 213.

Delphinium orientale perenne, aconiti folio, flore cæruleo. Tournef. cor. 30.

Delphinium perenne, aconiti folio ampliori, floribus longioribus pediculis infidentibus, minus villosum. Amm. ruth. 131.

Aconitum cæruleum hirsutum, flore consolidæ regalis. Baub. pin. 183.

Aconitum lycoctonum, flore delphinii silesiæ. Clus. hist. 2. p. 94.

Habitat in Sibiria.

Hospitatur sub dio, perennis.

Descr. Radix perennis. Caulis lævis, humanæ altitudinis. Folia lata, trifida, quinquefida, incisa, glabra, nisi interdum marginibus & rugis villosa, Racemi longi, terminales. Nectaria pone rugosa; labio superiore fusca, inferiore reflexa, bifida, in medio & apicibus lana flava barbato; sub labello stamina in conspectum cadunt.

Varietates hujus duas minores accepimus e Sibiria foliis omnino glabris, profundius & latius divisis, quarum

β Corolla incarnata; nectarii limbo fusco, solo labii inferioris apice alba barba notato

γ Corolla cærulea, nectarii limbo nigricante solo labii inferioris apice alba barba notato.

Quod hæc β. γ. sint varietates præcedentis α. indicant calcar maxime rugosum, nectarii labium profunde bifidum; sed Folia utrinque profundius divisa, laciniis linearibus, nec ovatis, ut in α, quæ non parum plantas distinguunt externa facie.

A C O N I T U M.

1. **ACONITUM** foliis multifidis, laciniis semipartitis superne latis. *Hort. cliff. 214.*

Aconitum cæruleum minus f. *Napellus minor*. *Baub. pin.* 183.

Aconitum cæruleum parvum. *Dod. pempt.* 441. *Lob. hist.* 386. *Dalech. hist.* 1743.

Aconitum lycoctonum, flore cæruleo: galea elatiori, radice bulbosa. *Baub. hist.* 2. p. 659.

Habitat in *Italiae* montibus.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Obs. Flores hujus albo-cæruleoscentes f. albo-cæruleoque varii.

2. **ACONITUM** foliis multipartitis, laciniis linearibus incumben-
tibus squarrosis.

Aconitum pyrenaicum luteum, foliorum segmentis sibi invicem incumben-
tibus. *Raj. europ.* 367.

Aconitum salutarium elatius pyrenaicum, foliis atrovirentibus, flore majore. *Tournef. inst.* 425.

Habitat in *Sibiria*, *Tataria*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Descr. Radix vivax. Caules tripedales, erecti, subtomentosi, teretes, ramosi. Folia radicalia & caulina petiolata, ampla, multipartita & subdivisa; laciniis linearibus, glabris, linea exaratis, copiosis, ita ut, licet divaricatae lacinae, tamen semper incumbentes, erectiusculae apicibus, sibi invicem incumbunt quasi squarrosae, glabrae. Corollae luteae, cucullo valde angusto, ut in specie medelpadica sed saturatius flavae. Antherae nigricantes. Nectaria minus revoluta, ore oblongo, integro. Pistilla saepius tria. Spica nutat ante florescentiam.

3. **ACONITUM** foliorum laciniis linearibus distinctis, ubique ejusdem latitudinis. *Hort. cliff.* 214. *Hall. belv.* 313.

Aconitum salutarium f. *Anthora*. *Baub. pin.* 184.

Anthora flore luteo. *Baub. hist.* 3. p. 660.

Anthora. *Dod. pempt.* 443. *Lob. hist.* 385.

Anthora f. *Anthora*. *Cam. epit.* 837.

Pharm. **ANTHORÆ** Radix.

Habitat in Alpibus *Helveticis*, *Taurinis*, *Allobrogicis*, *Pyrenæis*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

P E N T A G Y N I A.

A Q V I L E G I A.

* **AQUILEGIA** nectariis incurvis. *Fl. suec.* 443.

β. *Aquilegia sibirica*, floribus magnis cæruleis, nectariorum oris flavis. Aqui-

γ. *Aquilegia hortensis simplex* (variorum colorum.) *Bauh. pin.* 144.

δ. *Aquilegia hortensis multiplex*, flore magno (variorum colorum.) *Bauh. pin.* 144.

ε. *Aquilegia hortensis*, multiplici flore inverso. *Bauh. pin.* 145.

ζ. *Aquilegia stellata* (variorum colorum.) *Best. eyf.*

Aquilegia flore roseo multiplici. *Bauh. pin.* 145.

Habitat in *Europa*.

Hospitatur sub dio, cicur.

2. **AQUILEGIA** nectariis rectis, staminibus corolla longioribus.

Aquilegia corolla simplici, nectariis fere rectis. *Gron. virg.* 59.

Aquilegia pumila præcox canadensis. *Cornut. canad.* 60. *t.* 60. *Rob. ic.* 26. *bona*.

Aquilegia virginiana, flore rubente. *Pluk. alm.* 38.

Aquilegia præcox canadensis, flore externe rubicundo: medio luteo. *Morif. hist.* 3. *p.* 457. *f.* 12. *t.* 2. *f.* 4. *mala*.

Habitat in *Virginia*, *Canada*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obf. Hæc non modo corollis rubris longioribus angustioribusque, corniculis nectariferis rectis & staminibus longioribus differt a præcedente, sed & Foliis tenuioribus diversaque textura.

NIGELLA.

1. **NIGELLA** foliis involucro folioso cinctis. *Hort. cliff.* 215.

Nigella angustifolia, flore majore simplici cæruleo. *Bauh. pin.* 145. *Raj. hist.* 1070.

Melanthium sylvestre. *Lob. ic.* 741. *Matth. diof.* 529.

Melanthium damascenum. *Dod. pempt.* 304.

β. *Nigella* flore majori pleno cæruleo. *Bauh. pin.* 145.

Melanthium damascenum, flore pleno. *Clus. hist.* 2. *p.* 207. *t.* 208.

Svecis Jungfruni det gröna.

Habitat inter segetes *Narbonæ*.

Hospitatur sub dio, annua.

2. **NIGELLA** pistillis decem corolla longioribus. *Hort. cliff.* 215. *descr.* K 5 Ni.

Nigella orientalis, flore flavo, semine alato plano.
Tournef. cor. 19.

Nigella chalepensis lutea, corniculis longioribus. *Morif. hist.* 3. p. 516. f. 12. t. 18. f. 10. *Raj. app.* 525.

Habitat circa *Halepum*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. *Hæc corolla lutea, pistillis corolla duplo longioribus, seminibus membranaceis marginatis.*

3. **NIGELLA** petalis subtricuspidatis, foliis subpilosis.
Nigella flore minore simplici candido. *Baub. pin.* 145.
Nigella alba, simplici flore. *Alp. exot.* 261. t. 266.
Melanthium fativum. *Dalech. hist.* 812. *Cam. epit.* 551.
Pharm. NIGELLÆ Semina, Oleum.

Habitat in *Ægypto, Creta.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. *Semina distinctissima sapore & odore fragrantissimo; Folia vix manifeste pilosa, ut & caulis; petala tridentata apice, sed laterales dentes oblitterati.*

4. **NIGELLA** pistillis decagynis corollam æquantibus.
Nigella latifolia, flore majore simplici cæruleo. *Baub. pin.* 145. *prodr.* 75. *Morif. hist.* 3. p. 516. f. 12. t. 18. f. 8.
Nigella hispanica, flore amplo. *Raj. hist.* 1079.
Habitat in *Hispania.*
Hospitatur *sub dio*, annua.
Obs. *Flos magnus, cærulescens.*

P O L Y G Y N I A.

L I R I O D E N D R U M.

1. **LIRIODENDRUM.** *Hort. cliff.* 223. *Gron. virg.* 60.
Tulipifera arbor virginiana. *Herm. lugdb.* 612. t. 613.
Tulipifera virginiana, tripartito aceris folio, media lacinia velut abscissa. *Pluk. alm.* 379. t. 117. f. 5. & t. 248. f. 7.
Tulipifera caroliniana, foliis productioribus magis angulosis. *Pluk. alm.* 379. t. 68. f. 3.
Arbor tulipifera virginiana, tripartito aceris folio: media lacinia velut abscissa. *Raj. hist.* 1798. *Catesb. carol.* 1. p. 48. t. 48.
Svecis Pensylvaniæ Tulpan-tråd.

Habi-

Habitat vulgatissima in Carolina, Virginia, Pennsylvania.

Hospitatur in Frigidario, missa a doctissimo Medico Anglo Isac. Lawsono
& curiosissimo Peregrinatore Catesbæo. Arbor†.

H E P A T I C A.

- * HEPATICA. *Hort. cliff.* 223. *Fl. suec.* 445.
- δ. Hepatica flore pleno cæruleo. *Rupp. jen.* 127.
- ε. Hepatica flore pleno purpureo. *Rupp. jen.* 127.
- ζ. Hepatica flore pleno albo. *Hort. cliff.* 223.

Habitat in Europa.

Hospitatur sub dio, perennis.

P U L S A T I L L A.

- 1. PULSATILLA foliis decompositis ternatis. *Hort. cliff.* 223. *Roy. lugdb.* 487.
- Anemone tenuifolia, simplici flore. (*species* 2-12.)
Baub. pin. 174.
- Anemone hortensis tenuifolia, simplici flore. (*spec.* 2-20.) *Clus. hist.* 1. p. 255-260.
- Svecis* Anemon.

Habitat in Oriente unde Constantinopolin advenit quondam.

Hospitatur æstate sub dio, hyeme in arena sicca servatæ radices, perennes.

A N E M O N E.

- 1. ANEMONE foliis ternatis ovatis integris serratis, caule unifloro.
- Anemone trifolia, flore albo. *Baub. hist.* 3. p. 412.
- Anemone trifolia. *Dod. pempt.* 436.
- Habitat - - - in Suecia nondum reperi spontaneam, interim non longinquam esse constat.
- Hospitatur sub dio, optime, umbrosa amat & spongiosa ac nemorosa, raro semina perficit, perennis.
- Obs. Haberet aliquis hanc facile pro varietate Anemonæ vulgarissimæ nemorosæ, *Fl. suec.* 450. cum differat solis foliis latioribus exacte ovatis, minime incis, sed tantum æqualiter serratis, cumque tempore & flore conveniant, sed cum semina sint villosa, licet non caudata, pro distincta habeo.

C L E M A T I S.

- 1. CLEMATIS foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486.
- Flammula recta. *Baub. pin.* 300.
- Flammula. *Cam. epit.* 698. *Clus. hist.* 1. p. 124.

Habi-

Habitat in collibus *Austriae*, *Pannoniae*, & ad *Tanaim*.

Hospitatur *sub dio*, facillime, semina maturans, perennis.

2. CLEMATIS foliis simplicibus lanceolatis, *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486.

Clematis cærulea erecta. *Bauh. pin.* 300.

Clematis cærulea pannonica, *Clus. hist.* 1. p. 123.

Habitat in *Ungaria* & *Tataria*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

A D O N I S.

1. ADONIS floribus octopetalis, fructibus cylindraceo-oblongis.

Adonis radice annua. *Hort. cliff.* 321.

- α. Adonis sylvestris, flore phœniceo ejusque foliis longioribus. *Bauh. pin.* 178.

Adonis flore pallido. *Cam. epit.* 648.

- β. Adonis hortensis, flore minore atro-rubente. *Bauh. pin.* 178.

Flos adonis 1. *Clus.* 1. p. 336.

Eranthemum. *Dod. pempt.* 260.

Habitat inter segetes *Germaniae*, *Galliae*, *Hispaniae*, *Italiae*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

R A N U N C U L U S.

1. RANUNCULUS foliis quinaris lanceolatis incisoferratis. *Hort. cliff.* 229. *Hall. helv.* 325. *Roy. lugdb.* 490.

- β. Ranunculus folio aconiti, flore albo multiplici. *Bauh. pin.* 179.

Ranunculus pleno flore albo. *Clus. hist.* 1. p. 236.

Habitat in alpibus *Helveticis*.

Hospitatur in *Frigidario*, & sæpe *sub dio*, perennis.

2. RANUNCULUS foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoso, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 230.

Ranunculus grumosa radice (spec. 5-10.) *Bauh. pin.* 181.

Ranunculus asiaticus, grumosa radice. *Clus. hist.* 1. p.

240 - 243.

Ranunculus constantinopolitanus. *Dod. pempt.* 430.

Habitat in *Asia* aut *Syria*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

3. RANUNCULUS feminibus aculeatis, foliis simplicibus palmatis incis. *Hort. cliff.* 229.

β. Ranunculus stellatus echinatus creticus. *Bauh. pin.* 180.
Moris. hist. 2. p. 440. f. 4. t. 29. f. 24.

Ranunculus creticus echinatus latifolius. *Alp. exot.* 263.
t. 262.

γ. Ranunculus hirsutus annuus, flore minimo. *Pluk. alm.* 311. t. 55. f. 1. *Raj. syn.* 3. p. 12. f. 1.

Ranunculus medius arvensis annuus hirsutus, flore omnium minimo. *Moris. hist.* 2. p. 440. f. 4. t. 28. f. 21.

Habitat locis et humentibus cultis, *Angliæ*, *Cretæ*.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. *Ambæ* β. γ. annuæ, procumbentes, licet γ. floribus, foliis, seminibus longe minoribus gaudeat, nullam tamen reperio notam specificam generum.

4. RANUNCULUS foliis filiformi-ramosis, calycibus appendiculatis.

Adonia pusilla segetum, foliis tenuibus trifidis, spica leviter pilosa caudam vulpinam referente. *Pluk. alm.* 11.

Myosurus foliis ramosis. *Hort. cliff.* 117.

Melampyrum luteum minimum. *Bauh. pin.* 234.

Melampyrum perpusillum luteum. *Lob. advers.* 11.
Dalech. hist. 420.

Ranunculus ceratocephalus, feminibus fulcatis in spicam adactis. *Moris. hist.* 2. p. 440. f. 4. t. 28. f. 22.

Habitat inter segetes *Gallo-provinciæ*, *Narbonensis*, *Hispaniæ*.

Hospitatur sub dio, annua.

ISOPYRUM.

1. ISOPYRUM stipulis subulatis, petalis acutis.

Helleborus fumaricæ foliis. *Amm. rhut.* 74 t. 12.

Habitat in succulentis umbrosis *Sibiricæ* ad fluvios *Jeniseam*, *Selengam*, *Nertscham*.

Hospitatur sub dio, annua, cicur.

HELLEBORUS.

1. HELLEBORUS scapo bifloro subnudo, foliis pedatis.

Helle-

Helleborus scapo florifero subnudo, pedunculo communi bipartito. *Hort. cliff.* 227.

Helleborus niger flore roseo. *Bauh. pin.* 186.

Elleborus niger legitimus. *Clus. hist.* 1. p. 275.

Pharm. HELLEBORI NIGRI Radix, Extractum.

Habitat in *Austria*, *Apenninis*, *Hetruria*.

Hospitatur in *Frigidario*, florens mense *januario*, adeoque prima in *Horto*, perennis.

2. HELLEBORUS caule æquali folioso; foliis radicalibus caulem tandem superantibus. *Hort. cliff.* 227.
Roy. lugdb. 484.

Helleborus niger hortensis, flore viridi. *Bauh. pin.* 185.

Elleborum nigrum alterum. *Cam. epit.* 941.

Helleborastrum. *Lob. ic.* 680.

Habitat in montibus *Viennensibus*, *Euganeis*.

Hospitatur in *Frigidario* & sæpe *sub dio*, perennis, primo vere florens.

3. HELLEBORUS flore folio infidente. *Hort. cliff.* 227.
Roy. lugdb. 484.

Helleborus ranunculoides præcox tuberosus, flore luteo. *Moris. hist.* 3. p. 459. f. 12. t. 2. f. 4.

Aconitum unifolium bulbosum. *Bauh. pin.* 183.

Aconitum hyemale belgarum. *Lob. hist.* 385.

Habitat in *Lombardia*, *Apenninis*, *Florentia*.

Hospitatur *sub dio*, & in *Frigidario* perennis, prima florens inter omnes.



CLASSIS. XIV.

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA.

TEUCRIUM.

1. TEUCRIUM foliis rhombeo-acutis villosis subtus tomentosis.

Teucrium fruticans bæticum, ampliore folio *Dill. elth.* 397. *t.* 284. *f.* 367.

Teucrium argenteum, subrotundis foliis non sinuosis, flore caeruleo. *Pluk. alm.* 363.

Teucrium bæticum humulus & ramosius, folio subrotundo. *Hort. angl. t.* 3.

Habitat in Bætica regione.

Hospitatur in *Frigidario*, fruticulus.

Obs. Folia quam Teucrium C. B. breviora, supra villo albo adspersa, subtus tomento niveo recta. Corollæ minores, coeruleo-albicantes venis coeruleis; Planta brevis frutex.

2. TEUCRIUM foliis lanceolato-linearibus integerrimis subsessilibus, floribus solitariis pedunculatis. *Hort. cliff.* 303.

Teucrium frutescens, stoechadis arabicæ folio & facie. *Tournef. cor.* 14.

Rosmarinum stoechados facie. *Alp. exot.* 103. *t.* 102. *Moris. hist.* 3. *p.* 410. *f.* 11. *t.* 16. *f.* 3.

Polium angustifolium creticum. *Bauh. pin.* 221.

Pharm. POLII CRETICI Herba.

Habitat in Creta.

Hospitabatur aliquot annis per hyemes in *Tepidario*, sed periit absque flore.

3. TEUCRIUM foliis ovatis utrinque acutis integernimis, floribus solitariis utrinque digestis. *Hort. cliff.* 303.

Chamædrys incana maritima frutescens, foliis lanceolatis. *Tournef. inst.* 205.

Marum cortusi. *Bauh. hist.* 3. *p.* 242.

Pharm. MARI VERI Herba.

Habi-

Habitat in regno *Valentiae*, *Creta*. *Syria*.

Hospitatur in *Tepidario*, suffrutex.

Vix datur in Regno vegetabili planta odore præstantior, vel magis volatili principio gaudens, adeoque nec in Hydrope, Asthmate, Hysteria præstantior.

4. **TEUCRIUM** foliis linearibus trifidis integerrimis.
Teucrium foliis simpliciter trifidis. Hort. cliff. 301.
Guett. flor. 2. p. 248.

Chamaepitys lutea vulgaris f. folio trifido. Baub. pin. 249.

Chamaepitys prima. Dod. pempt. 46.

Pharm. CHAMÆPITYOS Herba.

Habitat in arenosis sabulosis restibilibusque agris *Italiae*, *Angliae*, *Hungariae*.
 Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

5. **TEUCRIUM** foliis ovatis crenatis, floribus laxe
 spicatis pedunculatis (*Hort. cliff. 302.*) caule frutescente.

Teucrium. Baub. pin. 247.

Chamaedrys fruticosior f. Teucrium vulgare, flore ochroleuco. Moris. hist. 3. p. 421. f. 11. t. 22. f. 1.

Habitat in asperis nudis *Hispaniae*, *Italiae*, *Siciliae*, *Maltæ*.

Hospitatur *sub dio*, fruticulosa.

Descr. Generatio plantarum nullibi magis in oculos cadit quam in hac planta, ubi corollæ brachia manus obstetricantes porrigunt. En stupendam sapientiam Creatoris.

·T H Y M U S.

1. **THYMUS** erectus, foliis margine reflexis ovatis,
 floribus verticillato-spicatis. *Hort. cliff. 305.*

Thymus vulgaris, folio tenuiore. Baub. pin. 219.

- β. *Thymus vulgaris, folio latiore. Baub. pin. 219.*

Thymum durius. Dod. pempt. 276.

Pharm. THYMI VULGARIS Herba, Aqua, Semina.
Svecis Timian.

Habitat in montosis & saxosis *G. Narbonensis*, ea copia, qua *Erica* apud nos.

Hospitatur *sub dio*, ubi α sæpius perennat, β vero raro.

2. **THYMUS** verticillis lanuginosis, dentibus calycinis fetaceis pilosis. *Hort. cliff. 306.*

Thymbra hispanica, majoranæ folio. Tournef. inst. 197.

Sampfucus f. Marum mastichen redolens, *Baub. pin.* 224.

Mastichina, *Boerb. lugdb.* 1. p. 156.

Marum vulgare f. Clinopodium, *Dod. pempt.* 271.

Habitat in aridis petrosis *Hispaniæ.*

Hospitatur in *Tepidario*, perennis †.

S A T U R E I A.

1. SATUREJA pedunculis bifloris. *Vir. cliff.* 57. *Roy. lugdb.* 324.

Satureja hortensis, *Baub. pin.* 218.

Satureja, *Dod. pempt.* 287.

Thymus erectus annuus, foliis lanceolato-linearibus. *Hort. cliff.* 306.

Pharm. SATUREJÆ Herba, *Aqua*, *Oleum*, *Semina*. *Svecis* Kyndel. *Gothis* Safwer.

Habitat in *Gallia Narbonensi.*

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur, frequens.

2. SATUREJA pedunculis dichotomis. *Vir. cliff.* 57. *Roy. lugdb.* 324.

Satureja montana, *Baub. pin.* 218.

Satureja durior, *Baub. hist.* 3. pp. 372.

Calamintha frutescens, saturejæ folio facie & odore. *Tournef. inst.* 194.

Melissa foliis linearibus integerrimis. *Hort. cliff.* 308.

Thymbra, *Dod. pempt.* 282.

Saxifraga secunda, *Cam. epit.* 717.

Habitat in glareosis *Hetruriæ* & *Narbonæ.*

Hospitatur *sub dio*, interdum in *Frigidario* hybernat, perennis.

O R I G A N U M.

ORIGANUM foliis ovatis obtusis, spicis confertis compactis pubescentibus. *Hort. cliff.* 304.

Majorana vulgaris, *Baub. pin.* 224.

Sampfucus f. Majorana, *Lob. hist.* 265.

Pharm. MAJORANÆ Herba, *Conserva*, *Aqua*, *Oleum*, *Semina*.

Svecis Mejran.

Habitat - - - -

Hospitatur *sub dio*, raro semen maturans, frequens in hortis oleraceis.

L A V A N D U L A.

1. LAVANDULA foliis lanceolatis integris, spicis nudis. *Hort. cliff.* 303.

Lavendula latifolia. *Baub. pin.* 216.

Pseudo-Nardus s. Nardus italica. *Cam. epit.* 17.

Pharm. LAVENDULÆ Flores, *Conserva*, *Aqua*, *Spiritus*, *Oleum*, *Semina*.

SPICÆ Oleum.

Habitat in apricis petrosis G. *Narbonensis*, *Hispania*, *Italia*.

Hospitatur per hyemes in *Frigidario*, æstate *sub dio*, perennis plerumque.

2. LAVANDULA foliis duplicato-pinnatifidis. *Virr. cliff.* 6. *Roy. lugdb.* 322. *Hort. cliff.* 303. n. 2.

Lavendula folio dissecto. *Baub. pin.* 216.

Lavendula multifido folio. *Clus. hist.* 1. p. 345.

Habitat circa Bætici urbem *Malaccam* & *Murciam*.

Hospitatur in *apricario*, floret primo anno & proxima hyeme in *Tepidario* quotannis apud nos perit.

3. LAVANDULA foliis lanceolato-linearibus, spicis comosa. *Hort. cliff.* 303.

Stæchas purpurea. *Baub. pin.* 216.

Stæchas arabica vulgo dicta. *Baub. hist.* 3. pp. 277.

Stæchas. *Cam. epit.* 465.

Pharm. STÆCHADIS ARABICÆ Flores,

Habitat in G. *Narbonensi*, *Hispania*, *Lusitania*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

H Y S S O P U S.

1. HYSSOPUS spicis secundis. *Hort. cliff.* 304.

Hyssopus officinarum cœrulea s. spicata. *Baub. pin.* 217.

Hyssopus vulgaris. *Dod. pempt.* 287.

- β. Hyssopus vulgaris alba. *Tournef. inst.* 201.

- γ. Hyssopus rubro flore. *Baub. pin.* 217.

Pharm. HYSSOPI Herba, *Conserva*, *Syrupus*, *Essentia*, *Aqua*, *Oleum*, *Semina*.

Svecis. Isop.

Habitat forte in *Italia*.

Hospitatur *sub dio*, vulgaris, perennis, cicur.

2. HYSSOPUS corollis transversalibus, staminibus inferioribus corolla brevioribus.

Lophantus vulgo.

Habi

Habitat ubique in *Sibiria*, inventore *Cl. Gmelino*.

Hospitatur *sub dio*, cicut, perennis.

Radix perennis. caules multi, pedum 4. f. 5, nudi, inferne sexangulares, superne quadrangulares, vix tomentosi, brachiati: Folia inferne terna, superne opposita, cordata, obtusa, concava, petiolata, obtuse serrata, graveolentia; Floralia vero magis ovata & sessilia. E summis virgis Pedunculi oppositi, solitarii, longitudine vix foliorum, singuli bifidi, recurvi. Flores 9. 11 aut 13. ferentes sessiles, Calycibus striatis, oblongis, viscidis. Corollæ magnæ, cæruleæ; labio inferiore non deorsum, sed ad latus sinistrum spectante; labio superiore bipartito; laciniis lateralibus patulis; labio inferiore dentato & inciso. Stylus cæruleus, corolla longior; stamina 4, quorum 2 superiora recta ut pistillum, corolla longiora, 2 vero inferiora corolla breviora. Est ergo *Hyssopus* flore inverso eodem modo, quo *Bugula orientalis* in suo genere.

3. **HYSSOPUS** caule acute quadrangulo glabro. *Vir. cliff.* 58. *Roy. lugdb.* 316. *Gron. virg.* 66. *sub Nepeta*.

Brunella bracteis lanceolatis. *Hort. cliff.* 316.

Sideritis canadensis altissima, *scrophulariæ* folio, flore flavescente. *Tournef. inst.* 192.

Betonica virginiana elatior, foliis *scrophulariæ* glabris, flore ochroleuco *Morif. hist.* 3. p. 365. f. 11. t. 4. f. 11. *Pluk. alm.* 67. t. 150. f. 3.

Habitat in *Virginia*, *Canada*.

Hospitatur *sub dio*, & in *Frigidario*, biennis sæpius,

Caulis humanæ altitudinis, glaber, viridis, acute quadrangularis, angulis concavis. Folia cordata, petiolata, acute serrata glabra, venosa. Spicæ terminales tetragonæ, Bracteis lanceolatis, integerrimis, corollæ flavæ, vix calyce majores.

Character *Hyssopi* desumendus est a corollæ labio crenato & staminibus distantibus, ne confluat cum *Nepetæ* genere; hisce positis tres prædictæ species congeneres evadunt.

MELISSA.

1. **MELISSA** floribus ex alis inferioribus subsessilibus. *Hort. cliff.* 307.

Melissa hortensis. *Bauh. pin.* 229.

Apiastrum f. *Melissophyllum*. *Lob. hist.* 277.

Pharm. MELISSÆ CITRINÆ Herba, Syrupus, Essentia, Spiritus, Oleum; Semina.

Svecis Citron meliss.

Habitat in montibus & sylvis *Allobrogicis*, *Genevensibus* & *Italicis*.

Hospitatur *sub dio*, perennis, sæpius.

NEPETA.

* **NEPETA** floribus interrupte spicatis pedunculatis. *Hort. cliff.* 310. *Roy. lugdb.* 316. *Gron. virg.* 65. *Fl. svec.* 486. L 2 Flori-

β. *Floribus spicatis cæruleis foliis subtomentosis.*

γ. *Floribus laxè spicatis cæruleis, foliis nudis.*

Habitat in Hispania.

Hospitatur sub dio, perennis.

Desc. Ambæ varietates minores, minus tomentosæ & molles, Floribus minoribus & purpurascentibus; Foliis recurvis profunde & dure serratis. Calyces striati, obliqui seu curvi, inæquales. &c. β magis spicata, foliis latioribus f. cordato-lanceolatis. γ minus spicata, foliis adhuc angustioribus, magisque dentatis.

2. **NEPETA** foliis sessilibus nudis, calycibus fructu ovatis æqualibus.

Cataria hispanica, betonicæ folio angustiore, flore albo. *Tournef. inst.* 202.

Mentha-cataria hispanica, olim Sideritis altissima, flore albo. *Bauh. hist.* 3. p. 226.

Habitat in Hispania.

Hospitatur sub dio, perennis.

Caules erecti, non villosi, brachiati. Folia cordato-oblonga, rugosa, obtusè serrata, sessilia, (præsertim superiora) nuda, minimeque villosa, dura & fere scabra, parum recurva. Spicæ laxæ undique caulem cingentes. Corollæ albae, valde parvæ. Calyces ad seminum maturitatem ovati, ventricosi, ore erecto, minimeque obliquo, sulcati.

3. **NEPETA** corymbis geminis pedunculatis axillari-
bus, foliis cordato-oblongis acuminatis serratis.

Cataria montana, foliis veronicæ pratensis. *Buxb. cent.*

3. p. 27. t. 50. f. 1. pessima.

Habitat in Sibiria.

Hospitatur sub dio, perennis.

Radix vivax. Caulis pedalis, bipedalis, superne nutans, ramosus. Folia cordato-oblonga, rugosa, supra nitida, subtus venosa, profunda serrata. Ex aliis infimis rami, ex superioribus flores.

Pedunculi solitarii, oppositi, singuli ferentes flores XI, dichotome divisi.

Bractæ filiformes vel nullæ.

Calyces curvi cylindrici, striati labio superiore trifido: mediapaulo majore, inferiore angustiore bipartito, paullo brevior.

Corolla violacea, tubo calyce longiore, incurvo. Faux lata, compressa; labium superius semibifidum, longitudinaliter connivens, margine longitudinali reflexo. Labium inferius villosum in medio, intermedia cre-
nata. Antheræ oblongæ.

Odor fortis.

B E T O N I C A.

* **BETONICA** spicata, corollarum lacinia intermedia labii inferioris emarginata. *Roy. lugdb.* 316. *Fl. suec.*

487.

Beto-

β. *Betonica alba*. *Baub. pin.* 235.

Habitat in *Svecia*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

2. *BETONICA verticillata*, calycibus spinosis.

Stachys foliis lanceolatis sessilibus basi adtenuatis. Hort. cliff. 310.

Sideritis arvensis latifolia glabra. Baub. pin. 223.

Alyssum majus. Tabern. hist. 929.

Habitat in arvis *Germaniae*.

Hospitatur *sub dio*, annua †.

D R A C O C E P H A L U M.

1. *DRACOCEPHALUM* foliis linearibus indivisis integerrimis, floribus spicatis.

Ruyfciana glabra, foliis integris. Amm. ruth. 50.

Prunella hyssopi folio viridi, amplo flore cæruleo.

Morif. hist. 3. p. 364. f. 11. t. 5. f. 9.

Habitat in *Sibiria* inque deserto *Ufensi Nagaico Tatariae*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Desc. Radix perennis. Caulis erectus, laevis. Folia linearia (in cultis, lanceolata) obtusiuscula integerrima, glabra, opposita (non verticillata), marginibus revoluta. Ramularum rudimenta ex alis foliorum, hinc multa saepe folia. Spica oblonga, Bracteis ovatis, margine tomentosis. Calyces quinquesidi: Labium superius trifidum, lobo intermedio latiore, Labium inferius angustius. Ergo differt a *Dracocephalo* foliis linearibus ramosis acutis, floribus spicatis, quod habeat Folia angustiora, acutiora & mucronata, saepe villosa; Stipulas tridentatas, fere pungentes; Corollas majores, magis inflatas; Calyces angustiores, sicciores, desinentes in spicas ore quinquesido: lacinia summa rotundata lata, reliquis quatuor angustis lanceolatis.

2. *DRACOCEPHALUM* foliis pinnato-sinuatis obtusis, floralibus spicatis villosis coloratis.

Moldavica minor canescens, chamædryos folio. Amm. ruth. 43. t. 7. f. 1.

Habitat ad *Fernatsch*. Beatus *Stellernus*.

Hospitabatur *sub dio*, periit primo anno.

Desc. Radix perennis. Caules spicati, decumbentes, fere glabri, tetragoni. Folia subovata, obtusa, nuda, pinnatim sinuata: sinibus obtusis, latiusculis, petiolata. Spica bracteis lanceolatis, pinnato-dentatis, villosis purpurascens (adeoque *Melampyri agrestis*), crassa. Calyces striati, sinibus prominulis, ut in reliquis. Corollae calyce duplo majores tantum, cæruleae fauce inflatae. Planta cujus synonymam ex figura adduxi folia gerit angustiora, minus sinuata, spicam magis longam & laxam; corollas majores, labio inferiore non cæruleo; sub eodem tamen nomine habui illam siccam & nostrae semina.

3. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ferraturis capillaceis.

Dracocephalum floribus verticillatis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 302.

Moldavica betonicæ folio, flore cæruleo. *Tournef. inst.* 184.

Melissa peregrina, folio oblongo. *Bauh. pin.* 229.

Melissophyllum turcicum. *Lob. ad.* 220.

- β. Moldavica betonicæ folio, flore albo. *Tournef. inst.* 184.

Pharm. MELISSÆ TURCICÆ Herba, Semina.

Habitat in Moldavia & Turcia.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix annua. Caules pedales, tetragoni, nudi, ramosi, brachiati. Folia cordato-oblonga, petiolata, obtuse & profunde serrata, serraturis obtusis, exceptis baseos, quæ acutiores & in superioribus foliis in capillum desinentes. Bractee lanceolatae, profunde serratae, serraturis in pilum desinentibus. Flores verticillati ex sex floribus, propriis pedunculis. Calyces erectiusculi, striati: labio superiore trifido, aequali, obtuse mucronato; inferiore angustiore, acuminato, profundius bipartito. Corollæ tubus calyce brevior; labio superiore patente, emarginato; inferiore ut in reliquis trifido, intermedio bifido, sed ad basin gemino tuberculo prominente. Odor fragrantissimus.

4. DRACOCEPHALUM floribus verticulatis, bracteis oblongis: ferraturis spinosis, foliis tomentosis.

Moldavica orientalis, betonicæ folio, flore magno violaceo. *Tournef. cor.* 11. *Comm. rar.* 28. t. 28.

- β. Moldavica orientalis, betonicæ folio, flore magno albido. *Tournef. cor.* 11.

Habitat in Oriente.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix annua. Caulis erectus, semipedalis, inferne brachiatus, obtuse tetragonus, parum tomentosus. Folia ovato-lanceolata s. oblonga, obtuse serrata, striata, longe petiolata, sub-tomentosa, crassa. Odor aromatis. Bractee oblongae vel obverse ovatae, serrato-spinosae. Verticilli erecti, cum caule paralleli. Calyces cylindrici, striati, tomentosi, longitudine tubi corollæ, ore quinquesido, lacinia superiore paulo latiore, inferioribus duabus paulo angustioribus. Corolla alba; faux inflata, labio superiore convexo, lateribus clausis, bifido, margine undique reflexo. Labium inferius ut in reliquis, sed magis inflexum, crenatum. Antherae luteae.

5. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis orbiculatis ferrato-ciliatis.

Dracocephalum floribus verticillatis, foliis floralibus orbiculatis. *Hort. cliff.* 309.

Habi-

Habitat in Oriente.

Hospitatur sub dio, annua, eicur.

Desc. Radix annua vel triestris, Caulis erectus, brachiatus, vix pedalis, nudus. Folia oblonga, in petiolos desinentia, obtusa, obtuse serrata, nuda. Stipulae orbiculatae acute serratae: serraturis excurrentibus in setas minus rigidas. Verticilli ex floribus 6 vel 8, petiolatis. Calyces striati, non tomentosi, quinquesido ore: Lacinia summa latiore, infimis duabus angustioribus. Corolla caerulea vix calyce longior; labio superiore bifido, longitudinaliter connivente, lateribus & apice reflexo; inferiore, ut in reliquis, sed lateralibus minus reflexis & parum crenatis. Calycis labio superiore rotundato, lateralibus angustioribus, infimis angustissimis. Ergo differt a precedente glabritie; Bracteis orbiculatis, minus spinosis; Corollis vix calyce longioribus, caeruleiscentibus.

6. DRACOCEPHALUM foliis verticillatis, bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis calyce multoties majoribus.

Moldavica betonicae folio, floribus minoribus caeruleis pendulis. *Amm. rhut.* 44.

Habitat ad ostium Udae fluvii.

Hospitatur sub dio, annua.

Descr. Radix annua. Caules pedales, tetragoni, obtusi, nudi, ramosi. Folia opposita, ovata s. ovato oblonga, obtusiuscule serrata, viridia, longe petiolata. Flores verticillati ad summitates ramorum caulisque. Verticilli ex decem floribus proprie pedunculatis; Calyces recurvi, striis 16. s. 17. scabris: Labium superius latum, rotundatum, obtusum, mucronatum; reliquis acuminatis aequalibus, infimis angustioribus. Corollae caeruleae, subnuntantes, tubo calyce longiore; Labio superiore bifido, obtuso, compresso: inferiore trifido; intermedio bifido, rotundato; lateralibus reflexis. Faux inflata, compresso-clausa. Stamina duo longe breviora; superiora longitudine fere labii superioris corollae. Antherae oblongae, compressae, nigrae, marginae inferiore albae; Stigmata ovata, bifida. Bractae ovato-oblongae, integerrimae, acuminatae. Haec forte hybrida ex Nepeta 3 cujus corollam & Dracocephalo cujus calycem habet.

7. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calycem aequantibus,

Cedronella tartarica perennis, urticae foliis, flosculis minoribus ex caeruleo rubentibus. *Roy. lugdb.* 537.

Moldavica betonicae folio, floribus minimis pallide caeruleis. *Amm. rhut.* 46.

Habitat ad Jakum flumen & Uralenses montes.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix annua. Caules pedales, tetragoni, ramosi, obtusi, nudi. Folia opposita, ovato-oblonga, in petiolos desinentia, striata, obtusiuscula, serrata, viridia. Verticilli ad summitates caulis & ramorum ovato-oblongi, vel lato lanceolati, integerrimi, striati, s. nervosi. Calyces omnino praecedentis. Corollae pallide caeruleescentes: Labio superiore patente, nec compresso, obtuse

tuse emarginato; labio inferiore præcedentis. Corollæ vix calyce longiores. Antheræ uti præcedentis sed rubræ. Planta Parva, parum magis odorata quam præcedens. Adeoque Calyx antecedentis; Corolla vero minime Dracoccephali. Nisi præcedens resisteret, dicerem hanc Thymum ob fructificationis structuram; sed facies adeo similis præcedenti, ut diu hæsitarem utrum pro sola varietate assumerem, nec non. Anne heic species novæ e diversa copula hybridæ?

M E N T H A.

1. MENTHA floribus spicatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus. *Hort. cliff.* 306.

Mentha crispa danica s. germanica speciosa. *Morist. hist.* 3. p. 367. s. 11. t. 6. f. 5.

Pharm. MENTHÆ CRISPÆ Herba, Conserva, Syrupus, Aqua, Spiritus, Oleum distillatum, Oleum coctum. *Svecis* Krus-mentha.

Habitat - - -

Hospitatur sub dio, perennis.

2. MENTHA floribus spicatis, foliis oblongis ferratis.

a. Mentha spicis confertis, foliis ferratis sessilibus. *Hort. cliff.* 306.

Mentha sylvestris, folio longiore. *Baub. pin.* 227.

- β. Mentha spicis solitariis interruptis, foliis lanceolatis ferratis sessilibus. *Hort. cliff.* 306.

Mentha angustifolia spicata. *Baub. pin.* 227.

Mentha tertia, quarta. *Dod. pempt.* 95.

Pharm. MENTHÆ SYLVESTRIS Herba.

Habitat ad agros & sepes Danicæ & Germaniæ, Angliæ, & Galliæ.

Hospitatur sub dio, cicur, perennis.

Hæc α foliis est subtus villosis & tomentosis; β vero foliis utrinque nudis & caule brevior.

3. MENTHA floribus verticillatis, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 307.

Pulegium angustifolium. *Baub. pin.* 222.

Pulegium cervinum. *Dalech. hist.* 892.

Habitat in umbrosis succulentis ad Rhodanum & circa Monspelium.

Hospitatur in Tepidario, perennis †.

O C I M U M.

1. OCIMUM foliis ovatis glabris. *Hort. cliff.* 315.

Ocimum caryophyllatum majus. *Baub. pin.* 226.

Ocimum. *Cam. epit.* 308.

Pharm.

Pharm. BASILICI Herba, Aqua, Semina.

Svecis Basilika.

Habitat in *Zeilona*.

Hospitatur ubique in hortis oleraceis, annua.

2. OCIMUM foliis ovatis integerrimis.

Ocimum foliis ovatis incanis. *Hort. cliff.* 315.

Ocimum minimum. *Bauh. pin.* 226.

Ocimum minus. *Dod. pempt.* 279.

β. Ocimum minimum, foliis ex purpura nigricantibus.

Moris. hist. 3. p. 407. f. 11. t. 20. f. 17.

Habitat in *Zeilona*.

Hospitatur in *Tepidario* inique fenestris annua.

C U N I L A.

1. CUNILA calycum labio spinoso: superiore trifido; inferiore bipartito. *Hort. cliff.* 313.

Marrubiastrum sideritis folio, caliculis aculeatis, flore flavo cum limbo atro purpureo. *Tournef. inst.* 190.

Sideritis montana, parvo varioque flore. *Bauh. pin.* 233.

Sideritis montana, parvo flore nigro-purpureo: capite medio croceo. *Col. ecph.* 1. p. 198. t. 196.

Habitat in incultis montanis sterilibus saxosis *Italiae*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

S I D E R I T I S.

1. SIDERITIS foliis tripartito-multifidis. *Hort. cliff.* 313.

Cardiaca orientalis canescens, foliis ranunculi pratensis, flore purpureo, calyce molli. *Tournef. cor.* 12.

Habitat in oriente, ego e *Russia* habui.

Hospitatur *sub dio*, biennis.

M A R R U B I U M.

1. MARUBIUM calycum limbo plano, foliis cordatis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 312.

PseudoDictamnus verticillatus inodorus. *Bauh. pin.* 222.

PseudoDictamnus. *Dod. pempt.* 281.

Habitat in *Creta*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

2. MARUBIUM calycum limbo patente: denticulis acutis. *Hort. cliff.* 312.

Marrubium album rotundifolium hispanicum. *Herm. parad.* 201. t. 201.

Marrubium subrotundo folio. *Bocc. mus.* 2. p. 167. t. 122.

Habitat in *Hispania*.

Hospitatur in *Frigidaria*, perennis.

Obs. *Hæc parum differt a præcedente; caulis tomentosus, sed non ita dense ac præcedens. Calyx in hac magis stellatus & plicatus, dentibus acutis.*

STACHYS.

1. STACHYS verticillorum flosculis triginta, calycibus pungentibus.

Stachys cretica. *Bauh. pin.* 236. *prodr.* 113.

Stachys folio obscure virente, flore purpurascente.

Walth. hort. 108. t. 19.

Habitat in *Creta*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Hæc media inter duas sequentes, altitudine cum insequente secunda convenit, sed folia aut caulis non alba ex copiosa lana, licet hirsuta. Corolla extus barbata uti secunda; & color læte ruber uti secunda; sed calyces pauciores acutiores & manum valde pungentes.

2. STACHYS verticillorum flosculis quadraginta, caule lanato.

Stachys foliis oblongo-cordatis, floribus verticillatis.

Hort. cliff. 309.

Stachys major germanica. *Bauh. pin.* 236.

Stachys. *Fuchs hist.* 765. t. 766.

Habitat in montosis saxosis asperis *Germaniæ, Angliæ, Galliæ*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. *Hæc altissima; caulis lana alba deflexa vestitus. Folia oblonga, mollia. Verticilli non pungentes, ex calycibus plusquam 40, alba lana valde confertis.*

3. STACHYS verticillarum floribus duodecim, caule viscoso.

Stachys foliis lanceolato-ovatis ad basin emarginatis, verticillis tomentosus. *Hort. cliff.* 301.

Pseudo-stachys alpina. *Bauh. prodr.* 113.

Habitat in Alpibus *Helveticis*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. *Hæc dimidio brevior antecedente, caule parum piloso, viscido. Folia viridia obscure, inferiora cordata & latiora præcedentis, sed non ita tomentosa aut lanata. Verticilli parum pungentes: Calycibus circiter 12 angulatis, piloso viscidis. Corolla rubro ferruginea.*

LEONURUS.

1. LEONURUS foliis tripartitis multifidis linearibus obtusiusculis. Ballo-

Ballote inodora, foliis coronopi. *Amm. rbut.* 48. t. 8.

Habitat in *Sibiria* ad *Udam fluvium*.

Hospitatur *sub dio*, biennis.

Obf. Calyx *quinquestriatus*, *quinquedentatus*, facies, corolla & omnia *Cardiacæ*, ut genere separari nequeat. Caulis *erectus*, *glaber*, *rufescens*, *quadrangularis*. Folia *glabra*, *tripartita*: lobis *subdivisis* in *lacinias*, ubique *lineares*, *læves*, *obtusiusculas*. Involucra *verticillorum* *aciformia*, *acuta*.

2. LEONURUS foliis tripartitis laciniatis, calycibus villosis.

Cardiaca, foliis tenuius & profundius incisfis, glabra. *Amm. rbut.* 49.

Cardiaca, foliis tenuius & profundius incisfis, villosa. *Amm. rbut.* 50.

Habitat in *Tataricæ* desertis.

Hospitatur *sub dio*, biennis.

Obf. Facies *cardiacæ* sed *glabra*; *verticillis densioribus*, *calycibus quinquefidis*, *villosis tomentosis*.

PHLOMIS.

1. PHLOMIS involucris tomentosis lanceolatis, foliis cordatis villosis, caule fruticoso.

Phlomis involucri radiis lanceolatis villosis. *Hort. cliff.* 315.

Verbascum latis *salviæ* foliis. *Baub pin.* 240.

Verbascum sylvestre alterum *Dod. pempt.* 146.

Habitat in *siccis petrosis Siciliæ, Hispaniæ, G. Narbonensis*.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

2. PHLOMIS involucris hispidis setaceis, foliis ovato-oblongis scabris, caule herbaceo.

Phlomis involucri radiis setaceis hispidis. *Hort. cliff.* 315.

Phlomis hormini folio angustiore subtus incano, flore minore purpurascente. *Amm rbut.* 41.

Marrubium nigrum longifolium. *Baub. pin.* 230.

Herba venti. *Lob. ic.* 532.

Sideritis odorata persica. *Zan. hist.* - - -

Habitat in herbidis *Monspeliæ*, inque deserto *kirgis Cossacorum* & ad *Samaram*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Obf. Herba caule *annuo*. Folia *ovato-oblonga*, *subtus tomentosa*. Calyces *hispidi*: *dentibus erectis*, *setaceis*, *lævibus*.

3. PHLOMIS involucri radiis hispidis subulatis, foliis cordatis scabris, caule herbaceo.

Phlo-

Phlomis hormini folio, foliis parvis svaverubentibus; villosissimis. *Amm. rhut.* 39.

Phlomis, urticæ foliis, glabra. *Amm. rhut.* 40.

Galeopsis maxima, foliis hormini. *Buxb. cent.* 1. p. 4. t. 6.

Habitat in campis feris & ad Taram urbem Sibiriae.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Obs. Planta humanæ altitudinis. Tubera insipida magnitudine pomorum radici adherent, more stachyos, cui admodum affinis, diu florescentiam continuat. alta & speciosa planta.

M O L U C C E L L A.

1. MOLUCCELLA calycibus quinquedentatis: denticulis æqualibus. *Roy. lugdb.* 314.

Molucca lævis. *Dod. pempt.* 92.

Melissa moluccana odorata. *Baub pin.* 229.

Habitat in Syria.

Hospitatur *sub dio*, sed vix semina maturat, annua.

2. MOLUCCA calycibus septemdentatis. *Roy. lugdb.* 314.

Molucca spinosa. *Dod. pempt.* 92. *Dalech. hist.* 959.

Melissa moluccana fœdita. *Baub. pin.* 229.

Habitat in Moluccis.

Hospitatur *sub dio*, sed vix ad florem pervenit, hinc perit annua.

B R U N E L L A.

* BRUNELLA bracteis cordatis. *Hort. cliff.* 316. *Fl. svec.* 498.

β. Brunella laciniata, flore elegantissime cæruleo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 169.

Habitat in Europa.

Hospitatur *sub dio*, hyeme proxima perit.

S C U T E L L A R I A.

1. SCUTELLARIA foliis subcordatis ferratis, spica interrupta, *Hort. cliff.* 317.

Lamium astragaloides. *Corn. canad.* 128. t. 129.

Lamium peregrinum f. Scutellaria. *Baub. pin.* 231. *prodr.* 110.

Cassida. *Column. ecphr.* 1. p. 187. t. 189.

Habitat in umbrosis sepibus saxosis Florentiae & Liburni.

Hospitatur in Frigidario, perennis.

Folia subcordata, glabra, obtuse serrata, petiolata; floralia ovata, glabra, obtuse serrata.

2. SCUTELLARIA foliis ovatis crenatis, spicis imbricatis. *Hort. cliff.* 317.

Cassida alpina supina, flore magno. *Tournef. inst.* 182.

Teucrium alpinum inodorum, magno flore. *Bauh. pin.* 247. *prodr.* 116 *sec. Burserum inventorem.*

Habitat in Alpibus Helveticis.

Hospitatur in Frigidario, perennis.

Obf. Folia subcordata, petiolata, obtusa, crenata, floralia ovato-oblonga. Spicæ imbricatæ.

3. SCUTELLARIA foliis inciso-serratis: subtus tomentosis.

Scutellaria foliis pinnatifidis. *Hort cliff.* 316.

Cassida orientalis, folio chamædryos, flore luteo. *Tournef. cor.* 11. *itin.* 3. *p.* 159. *t.* 159. *Comm. rar.* 30. *t.* 30. *Mart. cent.* 18. *t.* 18.

Habitat in Armeria circa Tephlin.

Hospitabatur in Tepidario, sed absoluto flore periit.

4. SCUTELLARIA foliis inciso-serratis: utrinque glabris, spica rotundato-tetragona.

Cassida alpina supina, magno flore albidò. *Tournef. inst.* 182.

Habitat in Sibiria & Tataria.

Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

Desc. Caules semipedales, diffusi; Folia cordata, lateribus profunde serrata, aut incisa, utrinque glabra, petiolata.

Spicæ laxæ quidem, sed fere tetragonæ ex foliolis floralibus ovatis, concavis, integerrimis, patulis. Corollæ luteæ, laciniis lateralibus violaceis.

P R A S I U M.

1. PRASIUM foliis ovato-oblongis serratis. *Hort. cliff.* 309.

Melissa fruticosa cretica sempervirens, teucrii facie, flore albo. *Morif. hist.* 3. *p.* 408. *f.* 11. *t.* 21. *f.* 3.

Lamium fruticosum non maculatum creticum. *Zan. hist.* 112. *t.* 46. *Raj. hist.*

Teucrium fruticans, amplo & albo flore, italicum. *Barr. rar. t.* 895.

Habitat in Sicilia, Creta, Agro Tingitano.

Hospitatur in Frigidario hyeme, sub dio æstate, fruticans.

* VERBENAS vide in Diandria monogynia.

ANGIOSPERMIA.

ANTIRRHINUM.

1. ANTIRRHINUM foliis ternis ovatis. *Hort. cliff.* 324.

Linaria triphylla minor lutea. Bauh. pin. 212.

Linaria hispanica. Clus. hist. 1. p. 320.

Linaria valentina. Dod. pempt. 184.

Habitat in umbrosis montibus *Valentinis* & *Hyblais* circa *Syracusas*.

Hospitatur in *apricario*, annua.

2. ANTIRRHINUM foliis quaternis lineari-lanceolatis, caule florifero erecto spicato.

Linaria caule erecto, foliis confertis lanceolato-linearibus, nectariis subulatis incurvis, floribus laxe spicatis. Hort. cliff. 498.

Linaria purpurea major odorata. Bauh. pin. 213.

Linaria altera purpurea. Dod. pempt. 183.

Habitat circa *Neapolin*, ad radices *Vesuvii*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

3. ANTIRRHINUM foliis lineari-lanceolatis alternis, floribus racemosis, calycibus corolla longioribus. (*Roy. lugdb.* 296. n. 16.) caule erecto.

Linaria chalepensis minor erecta, flore albo lineis violaceis notato, calyci ex quinque foliolis instructo infidente. Moris. hist. 12. p. 502. f. 5. t. 35. f. 9.

Linaria annua angustifolia, flosculis albis longius caudatis. Triumphett. obs. 87. t. 87. f. 2.

Habitat in *Italia*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

4. ANTIRRHINUM foliis sublinearibus: inferioribus verticillatis, calycibus piloso viscidis, bracteis reflexis, caule erecto.

Linaria foliis linearibus alternis recurvis, ramis caule brevioribus. Roy. lugdb. 297.

Linaria arvensis cærulea. Bauh. pin. 213. *Dill. elth.* 199. t. 163. f. 198.

Linariæ odorata monspessulana minor cærulea. Bauh. hist. 3. p. 461.

- β. *Linaria pumila, foliolis carnosis, flosculis minimis flavis. Bauh. pin.* 213.

Lina-

Linaria quadrifolia lutea. Baub. pin. 213.

Linaria tetraphylla lutea. Column. ecphr. 1. p. 299. t. 300. f. 1.

Habitat in arvis *Angliæ*, & *Galliæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. Caulis erectus, glaber, vire caesio. Folia linearia, acuminata, inferiora 4, 5. aut 6, verticillatim posita. Capitula subglobosa, obtusa, Calycis longitudine. Calyces obtusi, lineares, pilis gluten secernentibus hispidi. Calcar longitudine corollæ, subulatum. Corolla in *a* caerulea: in *B* vero flava, & hujus planta paullo major; eandem tamen esse docent partes omnes.

5. ANTIRRHINUM foliis cordatis quinquelobis alternis (caule flaccido). *Hort. cliff. 32. Guett. flor. 2. p. 210.*

Linaria folio glabro subrotundo, hederæ folio. Moris. hist. 2. p. 503. f. 5. t. 14. f. 30.

Cymbalaria. Baub. pin. 306. Dalech. hist. 1322.

Habitat in rupibus murisque antiquis *Jenæ*, *Basileæ*, *Parisiis*, *Chelsæ*, *Leydæ*. *Harlemi etc.*

Hospitatur in ollis, præsertim in *Frigidariis*, annua.

6. ANTIRRHINUM foliis hastatis alternis, caule flaccido.

Antirrhinum foliis alternis hastatis. Hort. cliff. 323.

Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo. Baub. pin. 253.

Elatine. Cam. epit. 754.

Habitat in arvis agrisque *Galliæ*, *Angliæ*, *Germaniæ*, *Italiæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

7. ANTIRRHINUM foliis ovatis alternis, caule flaccido.

Antirrhinum foliis alternis ovatis. Hort. cliff. 323.

Elatine folio subrotundo. Baub. pin. 252.

Veronica femina. Dod. pempt. 42.

Habitat in agris & arvis *Germaniæ*, *Angliæ*, *Galliæ*, *Italiæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua, rarius semina maturans.

8. ANTIRRHINUM corollis acaudatis, calycibus brevissimis.

Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus brevissimis, racemo terminatrice. Vir. cliff. 61.

Hort. cliff. 324. n. 12.

Antirrhinum majus alterum, folio longiore. Baub. pin. 211.

An-

Antirrhinum majus rotundiore folio. *Bauh. pin.* 211.

Antirrhinum luteo flore. *Bauh. pin.* 211.

Antirrhinum. *Dod. pempt.* 182. *Lob. ic.* 404.

Habitat in maceriis ruderatis sepibus *Italiæ*, *Hispaniæ*, *G. Narbonensis*.

Hospitatur in *Frigidario*, biennis.

Obi. Foliorum figura ex ovato in lineari lanceolatam variat, sed calycis folia breviora, hispido-glutinosa, constantia sunt.

9. ANTIRRHINUM corollis acaudatis, calycibus corolla longioribus.

Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus flores superantibus. *Hort. cliff.* 324.

Antirrhinum arvense majus. *Bauh. pin.* 212.

Antirrhinum sylvestre, Phyteuma. *Dod. pempt.* 182.

Pharm. ANTIRRHINI Herba.

Habitat in arenosis arvisque *Germaniæ*, *Galliæ*, *Angliæ*, *Italiæ*.

Hospitatur sub dio, annua.

MIMULUS.

1. MIMULUS *Act. upf.* 1741. p. 82. vide *Tabulam nostram.*

Digitalis cærulea, floribus in fistulam contractis, virginiana. *Pluk. alm.* 130.

Digitalis virginiana lysimaciæ facie, foliis subrubentibus, flore violaceo minore. *Moris. præl.* 259.

Digitalis perfoliata glabra, flore violaceo minore. *Moris hist.* 2. p. 479. f. 5. t. 8. f. 6. *Raj. hist.* 769.

Lyfimachia galericulata f. *Gratiola elatior* non ramosa. *Gron. virg.* 69.

Habitat in *Virginia*, *Noreboraco* locis humentibus.

Hospitatur sub dio, perennis; misit. Cl. B. *Jussieu*.

Desc. Radix stolonifera ut *Epilobium*. Facies plantæ *Lythri*. Caulis bipedalis, lævis, quadrangularis, angulis alternis concavis. Rami ex alis inferioribus breviores, ex alis superioribus Flores solitarii, versus austrum nutantes. Folia lanceolata, opposita, amplexicaulia, glabra, serrata. Pedunculi oppositi, nudi, longitudine floris. Calyx nutans, angulis 5, acutis, compressis. Corolla pallide cærulea; Galea sursum replicata; labium inferius patens. Fructus erectus.

MARTYNIA.

1. MARTYNIA foliis ferratis. *Hort. cliff.* 322. t. 18.

Habitat in *America* calidiore.

Hospitatur in *Caldario*, ubi floret sed semina non maturat, perennis, radice *Lathrææ*.



SCROPHULARIA.

1. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule acutangulo, racemis terminalibus.

Scrophularia foliis cordatis, petiolorum alis in caulem decurrentibus. *Guett. flor. 2. p. 201.*

Scrophularia aquatica major. *Bauh. pin. 235.*

Scrophularia aquatica major, caule fimbriato. *Loesf. pruss. 248. t. 73.*

Scrophularia femina *Cam. epit. 867.*

Betonica aquatilis. *Dod. pempt. 50.*

Pharm. SCROPHULARIÆ AQUATICÆ Folia.

Habitat in humidis *Angliæ, Helvetiæ, Galliæ.*

Hospitatur sub dio, cicur, biennis s. triennis.

Obs. Corollæ labium interius emarginatum. Caulis lævis, tetragonus, angulis membranaceis seu petiolis membranaceis decurrentibus secundum angulos, caulis in membranam seu aciem sæpe undulatus.

2. SCROPHULARIA foliis cordatis oppositis, pedunculis axillaribus solitariis multifloris. *Hort. cliff. 322. Roy. lugdb. 293.*

Scrophularia flore luteo. *Bauh. pin. 236. prodr. 112. t. 112.*

Lamium pannonicum 2. exoticum. *Clus. hist. 2. p. 38.*

Habitat in *Helvetia & Italia* rarius.

Hospitatur sub dio, biennis, cicur.

3. SCROPHULARIA foliis cordatis: superioribus alternis, pedunculis axillaribus bifloris. *Hort. cliff. 322. n. 4.*

Scrophularia folio urticæ. *Bauh. pin. 236.*

Scrophularia peregrina. *Cam. hort. t. 14.*

Habitat in *Italia.*

Hospitatur sub dio, annua.

4. SCROPHULARIA foliis cordatis serratis acutis: basi rotundatis, caule obtuse tetragono.

Scrophularia foliis cordatis oppositis, racemo terminatrice. *Gron. virg. 71.*

Scrophularia marilandica, longo profunde serrato urticæ folio. *Raj. supp. 396.*

Habitat in *Virginia.*

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Differt a *Scrophularia nodosa foecida*. *Fl. suec. 520*; quod duplo altior, 2. foliis minus atroviridibus & siccioribus. 3. Foliis exalte cordatis, nec

juxta petiolum transversim exsectis, sed mox rotundatis. 4. Caule minus acute tetragono, cum petiolorum margo minime decurvat uti in vulgari. 5. Pistillo longitudine fere labii inferioris, quod non in vulgari. 6. Pedunculorum pilis glandiferis varioribus & minoribus in hac, quam in vulgari.

D I G I T A L I S.

1. DIGITALIS foliolis calycinis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro.

Digitalis foliolis calycinis ovatis. *Hort. cliff.* 318.

Digitalis purpurea, folio aspero. *Bauh. pin.* 243.

Digitalis purpurea. *Dod. pempt.* 168.

- β. Digitalis alba, folio aspero. *Bauh. pin.* 229.

Habitat in Germania, Anglia, Gallia, Italia.

Hospitatur sub dio, biennis sæpius.

2. DIGITALIS foliis calycinis lanceolatis, corollis acutis: labio superiore bifido.

Digitalis foliis calycinis subulatis, floribus imbricatis. *Hort. cliff.* 318.

Digitalis major lutea vel pallida, parvo flore. *Bauh. pin.* 244.

Digitalis lutea, minore flore. *Morif. hist.* 2. p. 479. f. 5. t. 8. f. 5.

Habitat in montibus sabulosis Colbeck Gallia, Geneva, Salerni, Neapolis, Monspeli.

Hospitatur sub dio, biennis.

B I G N O N I A.

1. BIGNONIA foliis pinnatis: foliolis incisiss, geniculis radicatis. *Hort. cliff.* 317. *Gron. virg.* 73.

Bignonia americana, fraxini folio, flore amplo phœniceo. *Tournef. inst.* 164.

PseudoApocynum hederaceum americanum, tubuloso flore phœniceo, fraxini folio. *Morif. hist.* 3. p. 612. f. 15. t. 3. f. 1.

Gelsemium ederaceum indicum. *Corn. canad.* 102. t. 103.

Habitat in Virginia.

Hospitatur in Frigidario, perennis, fruticans.

R U E L L I A.

1. RUELLIA foliis petiolatis, floribus verticillatis subsessilibus.

Ruel-

Celyia

Tab. II.



Ruellia foliis petiolatis, fructu sessili conferto. *Hort. cliff.* 318. *Gron. virg.* 73.

Ruellia strepens, capitulis comosis. *Dill. elth.* 300. t. 249. f. 321.

Adhatoda carolina pilosa, calyce barbato. *Pet. hort.* 241.

Habitat in *Virginia*, *Carolina*.

Hospitatur in *Caldario*, fructificans, perennis.

2. *RUELLIA* foliis petiolatis, pedunculis longis subdivisis nudis.

Ruellia foliis sessilibus, pedunculis trifloris. *Hort. cliff.* 318.

Ruellia capsulis teretibus. *Dill. elth.* 328. t. 248. f. 320.

Habitat in *Barbados*.

Hospitatur in *Caldario*, perennis, fructificans.

Obser. *Primis annis non floret, tamen fructus fert, sequentibus annis pulchre floret. At primis annis adest calyx, adest etiam corolla sed minima, & non explicata, calyce brevior cum antheris. Adeoque eodem modo quo Anandria vel Campanula 3. p. 40. floret.*

C E L S I A.

1. *CELSIA* foliis duplicato-pinnatis. *Hort. cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 301. vide figuram nostram.

Verbascum orientale, sophiæ folio. *Tournef. cor.* 8.

Buxb. cent. 5. p. 17. *Boerb. lugdb.* 1. p. 228.

Blattaria orientalis, agrimoniae folio. *Buxb. cent.* 1. p. 14. t. 20.

Blattaria folio multifido, flore luteo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 229.

Habitat in graminosis *Cappadociae* & *Armeniae*.

Hospitatur in vaporariis, annua.

B R O V A L L I A.

1. *BROVALLIA*. *Hort. cliff.* 318. t. 17.

Habitat in *America* calidior.

Hospitatur in *Vaporario* & *Caldario*, annua. misit Cl: Gleditschius Prof. Berolinensis.

Obs. Planta sesquipedalis: Ramis alternis, subramosis, virgulis erectiusculis parum villosis. Folia alterna, ovata, integerrima, venosa, viridia, scabra, petiolata, reflexa. Flores axillares, solitarii, pedunculati. Corollae limbus infundibuliformis, plerumque quinquesidus, caeruleus; lacinia superiore (quæ labium est superius) magis reflexa, ad basin macula flava notata; laciniis quatuor reliquis (quæ labium inferius constituunt) singulis aequalibus cum superiore. Stamina 4, quorum duo majora claudunt filamentis umbilicum limbi corollae. Germen retusum. Capsula magnitudine calycis, a

quo testâ, bilocularis est. Receptaculum teretiusculum, columnare, dissepimento affixum.

L A N T A N A.

1. LANTANA foliis oppositis, caule aculeato. *Hort. cliff.* 498.

Myrobatindum viburnifolium spinosum, floribus coccineis. *Vaill. act.* 1722. p. 276.

Viburnum americanum odoratum, urticæ foliis latioribus, floribus miniatis. *Pluk. alm.* 385. t. 223. f. 5.

Camara spinosa, flore variegato. *Plum. gen.* 32. *Barr. æquin.* 30.

Habitat in America calidiore.

Hospitatur in Caldario, frutex, quotannis fructificans.

2. LANTANA foliis oppositis, caule inermi, spiciss oblongis.

Myrobatindum salviæ folio longiore, flore roseo. *Vaill. act.* 1722. p. 277.

Viburnum, cisti feminæ f. salviæ foliis mucronatis, americanum odoratum minus, floribus incarnatis. *Herm. prodr.* 384. *Pluk. alm.* 386.

Viburnum americanum minus, cisti feminæ foliis crenatis, flore carneo. *Breyn prodr.* 2. p. 103.

Periclymenum rectum humilius, salviæ folio rugosiore, flore purpureo, fructu oblongo esculento purpureo. *Sloan. flor.* 164. *hist.* 2. p. 82. t. 195. *Raj. dendr.* 30.

Camara arborescens, salviæ folio. *Plum. gen.* 32. *Barr. æquin.* 29.

- β. Myrobatindum salviæ folio rotundiore, flore purpureo. *Vaill. act.* 1722. p. 277.

Viburnum americanum odoratum, folio parvo orbiculato, floribus & baccis foliolo interceptis. *Pluk. alm.* 386. t. 114. f. 5. *Herm. parad.* 384.

Periclymenum rectum, salviæ folio rugoso minore subrotundo. *Sloan. flor.* 164.

Camara arborescens, salviæ folio. *Plum. gen.* 32.

Habitat in Jamaica & calidis Americæ.

Hospitatur in Caldario altitudine humana, sed annua.

VOLKAMERIA.


1. VOLKAMERIA ramis spinosis.
 Ligustroides. *Hort. cliff.* 489. *descr.*
 Ligustrum aculeatum, fructu testiculato. *Plum. spec.*
 489.
 Paliuro affinis ligustrifolia spinosa, flore monopetalo
 difformi, fructu sicco subrotundo. *Sloan. flor.* 137.
hist. 2. p. 137. t. 266. f. 2. 3. *Raj. dendr.* 95.
 Duglassia spinosa, ligustri folio. *Amm. herb.* 576.
 Habitat in *Jamaica*, *Barbados*.
 Hospitatur in *Frigidario*, per plures annos arbuscula †.

ACANTHUS.

1. ACANTHUS foliis sinuatis inermibus. *Hort. cliff.* 326.
 Acanthus fativus s. mollis virgilii. *Baub. pin.* 383.
 Carduus acanthus s. Branca ursi. *Baub. hist.* 3. p. 75.
Pharm. BRANCÆ URSI Herba.
 Habitat in petrosis humentibus *Italiae*, *Siciliae*.
 Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

MELIANTHUS.

1. MELIANTHUS stipulis solitariis petiolo adnatis.
Hort. cliff. 492.
 Melianthus africanus. *Herm. lugdb.* 414. t. 415.
 Pimpinella spicata maxima africana. *Barth. act.* 1673.
 t. 58.
 Habitat in locis succulentis *Capitis b. spei*.
 Hospitatur in *Frigidario*, perennis.



CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA

SILICULOSA.

MYAGRUM.

1. MYAGRUM filiculis obverse cordatis subseffilibus (foliis amplexicaulibus). *Hort. cliff.* 328.

Myagrū monospermum latifolium. *Bauh. pin.* 109. *prodr.* 52. *t.* 51. *Tournef. inst.* 211.

Myagrū monospermum latifolium, filiculis fungosis glabris articulatis. *Morif. hist.* 2. p. 267. *f.* 3. *t.* 21. *f. antepenult.*

Myagrū monospermum. *Bauh. hist.* 2. pp. 894.

Habitat inter segetes Gallie.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Facies *Thlaspeos*, caule erecto. Folia *Turritidis*, glabra, amplexicaulia. Siliculæ subseffiles, obverse cordatæ cum mucrone, gibbo cordis utrinque transversim dissecto cavitate orbiculari gaudente; sed silicula infra has cavitates unico semine foeta est.

2. MYAGRUM filiculis biarticulatis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis.

Crambe foliis lanceolatis dentato-sinuatis. *Hort. cliff.* 340.

Rapistrum monospermum. *Bauh. pin.* 95. *prodr.* 37. *t.* 37. *Bauh. hist.* 2. p. 845.

Habitat in Oriente.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Radice perenni a congeneribus nostris differt, quæ longissime descendit. Folia oblonga, sinuata: sinubus extrorsum versis, margine denticulata, utrinque scabra. Caulis ramosus, virgatus, patens, minus altus. Flores lutei, cauli arcte adfixi. Stamina apice non bifida. Siliculæ læves duplici articulo, singulo semine foecundo.

3. MYAGRUM filiculis fulcatis lævibus, foliis oblongis dentato-sinuatis.

Rapistrum Orientale, folio raphani, capsulis rugosis. *Bcerb. lugdb.* 2. p. 2.

Habitat in Oriente.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Facies antecedentis, sed Radix annua; Corollæ saturate flavæ, nec ut sequentis albido-flavescentes. Folia oblonga, basi acuta, dentato-sinuata, scabra, petiolata. Racemi longi, petalis obtusis. Siliculæ ovatæ, mucronatæ.

4. MYAGRUM filiculis fulcatis rugosis, foliis oblongis obtusis dentatis.

Myagrum arvense, folio auriculato acuto, filiquis rotundis asperis. *Dill.*

Habitat - - - -

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Differt a præcedenti corollis flavescentibus s. flavo-exalbidis, Foliisque minus sinuatis & obtusioribus. Hæ tres species posteriores cum *Cakile Tournefortii* magnam affinitatem habent.

A N A S T A T I C A.

1. ANASTATICA. *Hort. cliff.* 328.

Thlaspi Rosa de hiericho dictum. *Morif. hist.* 2. p. 228.

s. 3. t. 25. f. 2. 3. *Tournef. inst.* 213.

Rosa hierochuntea vulgo dicta. *Bauh. pin.* 484.

Rosa hierochuntica. *Cam. hort.* t. 41.

Rosa de hiericho. *Dalech. hist.* 1796.

Habitat in *Maris Rubri* littoribus sabulosis, ubi, postquam maturuere semina, rami ejus pugni ad instar contrahuntur & pericarpia comprimunt, mox æstu maris autumnali abripitur integra planta, in profundum projicitur; sed dum, vere insequente, mare purgamenta sua littoribus impingit, etiam hanc in arenam expuit, ubi in tepida littoris aqua expanditur (Frigidi enim non relaxantur rami) & semina demittit, quæ aqua defluente germinant in ripa. vide *Orat. nost. de telluris incremento.* pag. 48.

Hospitatur in *Vaporario* & terra prægnante, annua.

L E P I D I U M.

1. LEPIDIUM foliis oblongis multifidis. *Vir. cliff.* 63.

Hort. cliff. 331. n. 4. *Roy. lugdb.* 335.

Nasturtium sylvestre vulgatum. *Bauh. pin.* 103.

Nasturtium hortense. *Dod. pempt.* 711.

β. *Nasturtium hortense crispum.* *Bauh. pin.* 104. *prodr.* 44. t. 43.

Pharm. NASTURTII HORTENSIS Herba, Semina.
Svecis Krasse.

Habitat - - - -

Hospitatur sub dio, cicur, annua.

2. LEPIDIUM foliis caulinis pinnato-multifidis; ramiferis cordatis amplexicaulibus integris. *Hort. cliff.* 331.

Nasturtium orientale, foliis inferioribus millefolium, superioribus perfoliatam referentibus. *Tournef. inst.* 214.

Thlaspi perfoliatum persicum perfoliatum maximum.

Moris. hist. 2. p. 294. f. 3. t. 25. f. 17.

Thlaspi verum discoridis 1. *Zan. hist. 193.*

Habitat in *Persia* & *Soria*,

Hospitatur *sub dio*, annua.

COCHLEARIA.

1. *COCHLERIA* foliis caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus. *Hort. cliff. 332.*

Lepidium glastifolium. *Baub. pin. 97.*

Lepidium annuum. *Dalech. hist. 1297.*

Habitat - - -

Hospitatur in *Frigidario*, biennis aut triennis.

IBERIS.

1. *IBERIS* foliis cuneiformibus integerrimis obtusis. *Hort. cliff. 330.*

Thlaspidium fruticosum, leucoji folio, semperflorens. *Tournef. inst. 214.*

Thlaspi latifolium polycarpon, leucoji foliis. *Bocc. sic. 55. t. 22. f. A-1.*

Habitat in *Sicilia* prope *Panormum*.

Hospitatur in *Frigidario*, fruticans, perennis.

2. *IBERIS* foliis lanceolatis acuminatis: inferioribus serratis, superioribus integerrimis. *Hort. cliff. 330.*

Thlaspi umbellatum creticum, iberidis folio. *Baub. pin. 106.*

Draba f. *Arabis* f. *Thlaspi candiæ.* *Dod. pempt. 713.*

Habitat in Sylvis montosis *Hetruria*, *Cretæ*,

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. Variat albis rubrisque floribus.

3. *IBERIS* foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus racemosis.

Iberis foliis obverse lanceolatis, floribus umbellatis.

Guett. flor. 2. p. 146.

Thlaspi umbellatum arvense, iberidis folio. *Baub. pin. 106.*

Thla-

Thlaspi umbellatum arvense amarum. Baub. hist. 2. p. 825.

Thlaspidium folio iberidis. Riv. tetr. 112.

Habitat in agris *Genevæ, Basiliæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. *Præcedenti similis, sed minor; Flores non ita corymbosi, sed in racemum elongati.*

B I S C U T E L L A.

1. *BISCUTELLA* filiquis orbiculato-didymis a stylo dehiscentibus. *Hort. cliff. 329.*

Thlaspidium monspeliente, hieracii folio hirsuto. Tournef. inst. 214.

Thlaspi biscutatum asperum hieracifolium & majus. Baub. pin. 107.

Thlaspi clypeatum. Clus. hist. 2. p. 133.

Habitat in *Germania, Gallia, Italia, Sicilia.*

Hospitatur *sub dio* annua.

2. *BISCUTELLA* calycibus nectario utrinque gibbis, filiculis in stylum coeuntibus. *Hort. cliff. 329.*

Thlaspidium hirsutum, calyce floris auriculato. Tournef. inst. 214.

Thlaspi biscutatum villosum, flore calcari donato. Baub. pin. 107. prodr. 49.

Leucojum montanum, flore pedato. Col. ecphr. 2. p. 59. t. 61.

Habitat in *Galloprovincia*, ditione Pontificis.

Hospitatur in *sub dio*, annua.

C L Y P E O L A.

1. *CLYPEOLA* filiculis unilocularibus monospermis. *Hort. cliff. 329.*

Thlaspi clypeatum, serpilli folio. Baub. pin. 107.

Jon-thlaspi minimum spicatum lunatum. Column. ecphr. 1. p. 281. t. 284.

Habitat in nudis sabulosis sterilibus soli orienti oppositis *G. Narbonensis et Italiae.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

A L Y S S U M.

1. *ALYSSUM* ramulis suffruticosis diffusis, foliis punctato-echinatis.

M 5

Alyf-

Alyssum foliis lanceolatis obtusis incanis, caulibus procumbentibus, radice perenni. *Hort. cliff.* 332.

Alysson perenne montanum incanum. *Tournef. inst.* 217.

Thlaspi montanum luteum. *Bauh. hist.* 2. p. 928. t. 929. *bona.*

Habitat forte in *Sibiria*, mihi enim enata inter plantas ex feminibus Sibiriciss. Hospitatur *sub dio*, cicur.

Obs. Tota planta arida & fere scabra sentitur; si vero lente vitrea inspiciatur, observatur punctis echinatis ex setis minimis stellatim positis adpersa, non tantum in foliis, sed & in caule.

D R A B A.

1. *Draba* filiculis lateralibus sessilibus incanis obliquis, petalis integerrimis.

Lunaria leucoji folio, filiqua oblonga majori. *Tournef. inst.* 218.

Leucojum alyssoides clypeatum majus. *Bauh. pin.* 201.

Alysson dioecoris. *Dod. pempt.* 89.

Habitat forte in *Europa* australi.

Hospitatur *sub dio*, biennis.

V E L L A.

1. *VELLA*. *Hort. cliff.* 329.

Nasturtium sylvestre, *erucæ* affine. *Bauh. pin.* 105.

Nasturtium sylvestre valentinum. *Clus. hist.* 2. p. 130.

Habitat in *Hispania*.

Hospitatur in *ollis*, annua.

S I L I Q U O S A.

B U N I A S.

1. *BUNIAS* foliis retrorsum sinuatis.

Crambe foliis pinnato-hastatis. *Roy. lugdb.* 330.

Crambe orientalis, *dentis leonis* folio, *erucaginis* facie. *Tournef. cor.* 14.

Habitat in *Russia*.

Hospitatur *sub dio*, perennis, cicur.

Desc. Radix perennis. Planta humanæ altitudinis. Calyces patuli; unguis corollo erectæ. Germen tuberculis s. spinis scabrum. Sapor acris plantæ.

2. *BUNIAS* foliis antrorsum sinuatis.

Bunias, *Hort. cliff.* 340.

Rapha-

Raphanistrum monospermum monspeliacum, filiqua quadrangulari echinata. *Herm. lugdb.* 520.

Erucago segetum. *Tournef. inst.* 232.

Erucago monspeliaca, filiqua quadrangula echinata. *Baub. pin.* 99. *prodr.* 41. t. 41.

Sinapi echinatum. *Dalech. hist.* 647.

Habitat in humidis inter segetes *Monspeli.*

Hospitatur *sub dio*, annua \ddagger .

CHEIRANTHUS.

1. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis (*Hort. cliff.* 334.) filiquis apice truncatis compressis.

Leucojum, incano folio, hortense. 1-7. *Baub. pin.* 200.

Leucojum candidum majus. *Dod. pempt.* 159.

Habitat - - - forte in locis quibusdam maritimis.

Hospitatur in *Frigidario*, rarius *sub dio*, biennis vel triennis.

2. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis glabris.

Hort. cliff. 334. *Guett. flor.* 2. p. 156.

Leucojum luteum vulgare. *Baub. pin.* 202.

Leucojum luteum. *Dod. pempt.* 160.

3. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis subdenticulatis retusis, filiquis apice subulatis.

Pharm. CHEIRI Flores.

Habitat in rectis murisque antiquis *Helvetiae*, *Angliae*, *Galliae*.

Hospitatur in *Frigidario*, biennis.

3. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis subdenticulatis retusis, filiquis apice subulatis.

Hesperis caule ramosissimo, foliis lanceolatis dentatis.

Hort. cliff. 335.

Hesperis chia saxatilis, leucoji folio serrato, flore parvo. *Tournef. coroll.* 16.

Hesperis filiquis hirsutis, flore parvo rubello. *Boerb. lugdb.* 147. *Dill. elth.* 180. t. 147. f. 178.

Habitat in *Chio* insula.

Hospitatur *sub dio*, annua.

HESPERIS.

1. HESPERIS caule hispido ramoso patente.

Hesperis caule hispido procumbente. *Hort. cliff.* 335.

Hesperis montana pallida odoratissima. *Baub. pin.* 202.

Hespe-

Hesperis pannonica. *Cam. hort. t.* 18.

Svecis Nattfiol.

Habitat in *Hungaria*.

Hospitatur *sub dio*, biennis.

2. HESPERIS caule simplici, foliis ovato-lanceolatis denticulatis. *Hort. cliff.* 335.

Hesperis hortensis. *Baub. pin.* 202.

Viola matronalis. *Dod. pempt.* 161.

- β. Hesperis hortensis, flore candido. *Tournef. inst.* 222.

Habitat *Neapoli*.

Hospitatur *sub dio*, biennis.

3. HESPERIS caule ramosissimo diffuso, filiquis teretibus.

Cheiranthus foliis lanceolato-linearibus acutis glabris utrinque dentatis. *Hort. cliff.* 331.

Leucojum saxatile, folio coronopi, flore obsoleto odorato, petalis undulatis. *Boerb. lugdb.* 2. p. 18.

Leucojum minus, lavendulæ folio, obsoleto flore, angustifolium. *Bocc. mus.* 2. p. 148, t. III, *Barr. rar.* t. 803.

Habitat in montibus *Galloprovinciæ* supra *Orgon*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

R A P H A N U S.

1. RAPHANUS filiquis teretibus torosis bilocularibus. *Hort. cliff.* 340.

- α. Raphanus minor oblongus. *Baub. pin.* 96.

Raphanus minor purpureus. *Lob. hist.* 99.

Svecis Radis.

- β. Raphanus major orbicularis vel rotundus. *Baub. pin.* 96.

Raphanus f. Radicula fativa. *Dod. pempt.* 76.

Svecis Råttika. *Sommarråttika*.

- γ. Raphanus niger. *Baub. pin.* 96.

Svecis Vinterråttika.

Pharm. RAPHANI Radix recens, Semina.

Habitat - - -

Hospitatur ubique *sub dio* inter olera, biennis.

C A R D A M I N E.

1. CARDAMINE foliis pinnatis, foliolis lobatis æqualibus petiolatis. *Roy. lugdb.* 345.

Car-

Cardamine ficula, foliis fumarix. *Tournef. inst.* 225.

Sio minimo prosperi alpini affinis, filiculis latis. *Bocc. sicc.* 84. t. 45. f. 2. *Roy. hist.* 815.

Cardamine græca, chelidonii folio, rarius & profundius inciso, flore albo. *Tournef. cor.* 16.

Nasturtium montanum nanum, rotundo thalictri folio, cyrenæum. *Bocc. mus.* 2. p. 171. t. 116.

Habitat in *Sicilia*, *Corfica*, reliquisque *Græcæ* insulis, Hospitatur in *ollis*, annua.

B R A S S I C A.

1. BRASSICA radice caulescente tereti carnosâ, *Hort. cliff.* 338.

2. Brassica vulgaris sativa. *Dod. pempt.* 621.

Brassica viridis. *Baub. pin.* 111.

Svecis Grönkåhl.

3. Brassica capitata rubra. *Baub. pin.* 111.

Pharm. BRASSICÆ RUBRÆ Semina.

Svecis Sallat-kåhl.

4. Brassica capitata alba. *Baub. pin.* 111.

Svecis Hvithufvud kåhl.

5. Brassica alba crispa. *Baub. pin.* 111.

Brassica undulata. *Reneal. spec.* 131.

Brassica fabauda. *Dod. pempt.* 624.

Svecis Saphoi kåhl.

6. Brassica fimbriata. *Baub. pin.* 112.

Brassica fabellica. *Reneal. spec.* 134. t. 133.

Svecis Vinter-kåhl, Blå-kåhl.

7. Brassica laciniata rubra. *Baub. hist.* 2. p. 832.

Svecis Krus-kåhl.

8. Brassica cauliflora. *Baub. pin.* 111. *Dod. pempt.* 624.

Reneal. spec. 131. t. 133.

Brassica florida botrytis. *Lob. hist.* 123.

Svecis Blom-kåhl.

9. Brassica radice napiformi. *Tournef. inst.* 219.

Napobrassica. *Baub. pin.* 111. *prodr.* 54.

Svecis Rot-kåhl.

10. Brassica caule rapum gerens. *Dod. pempt.* 625.

Brassi-

Brassica gongylodes. Bauh. pin. 111.

Brassica caulo-Rapa. Bauh. hist. 2. p. 829.

Svecis Kåhl-rabi.

1. *Brassica angusto apii folii. Bauh. pin. 112.*

Brassica selenisia angustifolia & latifolia. Tabern. hist. 786.

Svecis Plumascie-kåhl.

Habitat in *Europa.*

Hospitatur *sub dio*, ubique biennis.

Observ. *Qui poterit dare harum varietatum spontaneas plantas, ille determinet earum species.*

2. **BRASSICA** foliis cordatis amplexicaulibus glabris, radicalibus scabris integerrimis, filiquis tetragonis.

Brassica orientalis perfoliata, flore albo, filiqua quadrangula. Tournef. cor. 16.

Habitat in *Oriente.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

3. **BRASSICA** radice caulescente orbiculari depresso carnosa. *Hort. cliff. 339.*

Rapa sativa rotunda. Bauh. pin. 89.

Rapum vulgare. Dod. pempt. 673.

Pharm. RAPI Syrupus, Semina, Oleum.

Svecis Rosva.

Habitat in *Europa.*

Hospitatur ubique in *cultis*, biennis.

4. * **BRASSICA** radice caulescente fusiformi. *Hort. cliff. 339. Flo. Sv. 547.*

β. *Napus sativa. Bauh. pin. 95.*

Napus. Dod. pempt. 674.

Svecis Stickrosva.

Habitat in *Gotlandia.*

Hospitatur *sub dio*, biennis.

5. **BRASSICA** foliis lyratis, caule hirsuto, filiquis glabris.

Sisymbrium foliis pinnatifidis: laciniis exterioribus majoribus, caule hirsuto. Hort. cliff. 337.

Eruca latifolia alba. Bauh. pin. 98.

Eruca sativa. Dod. pempt. 708.

Pharm. ERUCÆ Semina.

Habitat - - - an ex sequenti orta?

Hospitatur *sub dio*, annua.

6. BRASSICA foliis lyratis, caule hirsuto, filiquis retrorsum hispidis.

Eruca Sylvestris major lutea, caule aspero. *Bauh. pin.* 98.

Eruca Sylvestris. *Dod. pempt.* 708.

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. *præcedenti valde similis est, sed color corollæ diversus.*

7. BRASSICA foliis lanceolato-ovatis glabris indivisis dentatis.

Habitat in *China*, misit *Cel. Gmelinus*,

Hospitatur in *apricario*, biennis.

Obs. Flores violacei magni.

SINAPIS.

1. SINAPIS filiquis hispidis: rostro obliquo longissimo. *Hort. cliff.* 338.

Sinapi apii folio. *Bauh. pin.* 99.

Sinapi fativum alterum. *Dod. pempt.* 707.

Svecies Hvit senap.

Habitat in agris *Belgii, Angliæ, Galliæ*.

2. SINAPIS ramis fasciculatis, foliis summis lanceolatis integerrimis.

Sinapi sinense, acanthi folio. *Gmelin.*

Habitat in *China*.

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

Desc. Radix annua. Caulis bipedalis, erectus, teres, nec striatus, nec patulus, lævis. Rami fasciculati. Folia inferiora obverse ovata, lacera, subtus scabra, fere rapiformia; superiora lanceolata, integerrima, indivisa, utrinque glabra. Flores & filiquæ sinapi arvensis. Fl. *Svec.* 548, sed filiquæ angustiores, non hispidae, rarius tuberculosa, torosa.

ARABIS.

1. ARABIS foliis amplexicaulibus, filiquis ancipitibus linearibus, calycibus subpilosis.

Turritis latifolia hirsuta, filiquis pendulis. *Amm. ruth.* 58.

Habitat in *Russia*.

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

2. ARA-

2. ARABIS foliis amplexicaulibus, filiquis decurvis planis linearibus, calycibus subrugosis.

Lecojum hesperidis folio. *Tournef. inst.* 221.

Glaustifolia cichoroides 1. Bauhini & Turritis 2 Clusio. *Baub. hist.* 2. p. 836.

Turrita major plateau. *Clus. hist.* 2. p. 126.

Habitat in *Helvetia*, *Hungaria*.

Hospitatur *sub dio*, annua aut biennis. Cautè distinguenda est hæc planta à Turritide *Fl. svec.* 544.

ERYSIMUM.

1. ERYSIMUM foliis integris lanceolatis margine repando dentatis.

Hesperis leucoji folio non serrato, filiqua quadrangula. *Tournef. inst.* 223.

Leucojum luteum sylvestre clusii. *Baub. hist.* 2. p. 873.

Habitat in *Hungaria*.

Hospitatur *sub dio*, biennis.

Obs. Valde affinis Erysimò 2do *Fl. Svec.* 555, sed majora omnia, præsertim flores.

SISYMBRIUM.

1. SISYMBRIUM foliis lanceolatis denticato-serratis. *Hort. cliff.* 337.

Draba lutea, filiquis strictissimi. *Baub. pin.* 110. *Moris. hist.* 2. p. 234. f. 3. t. 7. f. 1.

Hesperis foliis ellipticis glabris circumferratis. *Hall. Helv.* 563.

Arabis quibusdam dicta planta. *Cam. epit.* 342.

Habitat in montibus *Helvetiæ*.

Hospitatur *sub dio* & in *Frigidario*, perennis.

2. SISYMBRIUM filiquis axillaribus subsessilibus foliariis, foliis pinnato-sinuatis.

Erysimum caule decumbente, filiqua laterali subsessili. *Roy. lugdb.* 343.

Eruca supina alba, filiqua singulari e foliorum alis erumpente. *Isnard. act.* 1724. p. 295. t. 18.

Eruca procumbens alba alis foliorum florens. *Vaill. paris.* 50.

Habitat in pratis & agrorum marginibus *Parisiis*.

Hospitatur *sub dio*, annua †.

3. **SISYMBRIUM** filiqvis axillaribus sessilibus tubulatis aggregatis, foliis repando-dentatis.

Erysimum filiquis in alis foliorum sessilibus. *Hort. cliff.* 337.

Erysimum polyceration f. *corniculatum*, *Bauh. pin.* 101.

Irio altera. *Dalech. hist.* 653.

Habitat in rudèratis *Calabriæ*; *Helvetiæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

4. **SISYMBRIUM** foliis pinnatis flaccidis, foliolis sublinearibus integerrimis.

Erysimum monspessulanum, sinapios folio. *Walth. hort.* 55. t. 22.

Habitat circa *Astracan*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Desc. Radix fibrosa. Caules bipedales, ramosissimi, patuli. Folia pinnata, subpendula: foliolis lanceolato-linearibus, integerrimis, longis, basi exorsum lacinula acuta auctis. Flores lutei, structura fere sinapeos. Siliquæ longæ, teretes, glabræ, filiformes, ancipites, copiosissimæ.

C R A M B E.

1. **CRAMBE** foliis cauleque scabris.

Crambe foliis subcordatis crenatis scabris. *Hort. cliff.* 340.

Rapistrum maximum rotundifolium monospermum.

Corn. canad. 147. t. 148. *Moris. hist.* 2. p. 266. f. 3. t. 13. f. 1.

Habitat in *Hispania*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

I S A T I S.

1. **ISATIS** sylvestris minor lusitanica. *Herm. lugdb.* 678.

Habitat in *Lusitania*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obl. Differt a vulgari *Fl. Svec.* 543. quod minor; annua, nec biennis; pedunculis parum tomentos, nec glabris.

C L E O M E.

1. **CLEOME** floribus gynandris. *Hort. cliff.* 341. *Fl.*

zeyl. 239. *Roy. lugdb.* 339.

Quinquefolium lupini folio. *Bauh. pin.* 326.

Lupinus ægyptius sylvestris. *Vestl. ægypt.* 209. t. 209.

Habitat in calidis *Indiæ* utriusque & *Africæ*.

Hospitatur in *Caldario* & *vaporario*, annua.

2. CLEOME floribus hexandris, genitalibus declinat-
tis, filiquis teretibus torosis. *Hort. cliff.* 341. *Roy.*
lugdb. 340.

Sinapisrum orientale triphyllum, ornithopodii fili-
quis. *Tournef. cor.* 17. *Dill. elth.* 359. t. 266. f. 345.

Habitat in agris circa *Peram*.

Hospitatur in *Tepidario*, annua.



CLASSIS. XVI.

MONADELPHIA

PENTANDRIA

HERMANNIA.

- I. HERMANNIA foliis lanceolatis obtusis ferratis.
Hort. cliff. 342.

Hermannia frutescens, folio oblongo ferrato, *Tournef. inst.* 656.

Althæa africana frutescens, floribus aureis cochleatis pendulis minoribus. *Volk. norib.* 24. t. 24.

Habitat ad Caput b. spei.

Hospitatur in Tepidario, arbuscula.

MELOCHIA.

- I. MELOCHIA floribus umbellatis, capsulis pyramidatis pentagonis: angulis acutis.

Habitat in Brasilia, forte?

Hospitatur in Caldario, perennis.

Desc. Radix perennis. Caulis humanæ altitudinis, teres, viridis, erectus, angustus. Folia alterna, ovata vel ovato lanceolata, serrata, nuda, petiolata: Rami alterni, breviores. Pedunculi e regione petiolorum s. petiolis oppositi, petiolisque longiores, apice ferentes in umbellulam flores 3, 4, 5. pedicellatos. involucro minimo exceptos. Corollæ pentapetalæ, infundibuliformes, incarnatæ. Capsulæ pyramidatæ, quinquangulares, basi truncatæ in totidem dentes abeuntes. An itaque sola varietas. MELOCHIAE floribus solitariis, capsulis pyramidatis pentagonis angulis acutis. *Hort cliff.* 342.

DECANDRIA.

GERANIUM.

- I. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis orbiculato-reniformibus tomentosis crenatis integriusculis.

Geranium calycibus monophyllis, floribus florentibus erectis, foliis subcordatis. *Hort. cliff.* 345.

Geranium africanum arborescens, malvæ folio pingui, flore coccineo. *Dill elth.* 151. t. 125. f. 151. 152.

Geranium africanum arborescens, malvæ folio planoo lucido, flore elegantissimo kermesino. *Mart. cent.*

3. t. 3.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Caldario*, frutex.

Obs. Corollæ coccineæ, fere regulares. Stamina 10: quorum 3 inferiora alterna sterilia, reliqua antherata, antheris 3 superioribus brevioribus, Frutex magnus.

2. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cordato-orbiculatis incisus zona notatis.

Geranium africanum arborescens, alchimillæ hirsutæ folio, floribus rubicundis. *Comm. præl.* 51. t. 1.

Habitat ad Caput b. spei.

Hospitatur in *Tepidario* & *Frigidario*, Frutescens.

Obs. Variat foliis fimbria s. Zona rubicunda aut foliis margine albis. Petala 2 adscendentia in labium superius; 3 nutantia patentiora, omnia carnea venis sanguineis. Stamina 7 horum 2 brevissima, tam 1, dein 2 longiora hæc 5 supra pistillum; 2 adhuc longiora infra pistillum. Reliqua sterilia.

3. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cucullatis dentatis. *Hort. cliff.* 345.

Geranium africanum arborescens, foliis cucullatis angulosis. *Dill. elth.* 155. t. 129. f. 156.

Geranium capense frutescens, aceris folio. *Pet. gaz.* t. 84. f. 5.

Geranium africanum arborescens, ibisci folio rotundo, carlinæ odore. *Herm. lugdb.* 274. t. 275.

Geranium africanum arborescens, ibisci folio anguloso, floribus amplis purpureis. *Mart. cent.* 28, t. 28.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

4. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis lobatis undatis villosis.

Geranium africanum frutescens, malvæ folio laciniato odorato. *Herm. lugdb.* 277. t. 278.

Habitat ad Caput b. spei.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

Obs. Flores in capitulum: singulis stamina 10, quorum 3 alterna infima sterilia, reliqua antheris instructa, omnia coalita.

5. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis adscendentibus lobatis pubescentibus.

Gera-

Geranium africanum arborescens, vitis folio: odore mellissæ. Dill. elth. 152. t. 126. f. 153.

Habitat ad Caput spei.

Hospitatur in *Frigidario*, Frutex.

Obs. Hæc præcedentii simillima, sed major; folia minus undulata, majora, rigidiora, minus sæveolentia,

6. GERANIUM calycibus monophyllis, corollis papilionaceis: vexillo dipetalo maximo, foliis angulatis. *Hort. cliff. 345.*

Geranium africanum arborescens, flore veluti dipetalo eleganter variegato. Dill. elth. 154. t. 128. f. 155.

Geranium africanum arborescens, maluæ folio mucronato, petalis florum inferioribus vix conspicuis. Mart. cent. 15. t. 15.

Habitat ad Caput b. spei.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex inter reliquos maximus.

7. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis orbiculatis palmatis incisissimis pilosis, caule herbaceo. *Vir. cliff. 67.*

Geranium calycibus monophyllis longissimis sessilibus, fructu assurgente, foliis palmatis crenatis. Hort. cliff. 345.

Geranium africanum, alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis. Herm. lugd. 282. t. 283. Stiff. botan. 107. t. 107.

Habitat ad Caput bonæ spei.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

Obs. Caules annui, diffusi. Folia subpeltata, orbiculata. Corollæ parvæ, reflexæ, incarnatæ: petalis 2 superioribus apice sanguineis: Stamina 10; quorum 3 inferiora alterna sterilia: apicibus sursum flexis; reliqua 7 antheris instructa, horum 5 superiora coherentia. Stylus in hac specie nullus.

8. GERANIUM calycibus monophyllis: tubis longissimis subsessilibus, radice subrotunda. *Hort. cliff. 344.*

Geranium noctu olens æthiopicum, radice tuberosa, foliis myrrhidis latioribus & angustioribus. Breyn. cent. 126. t. 58.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis.

- * GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris. *Hort. cliff. 344. Fl. svec. 579.*

β. *Geranium pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, foliis cordatis laciniatis. Hort. cliff. 344.*

Geranium folio althææ. Baub. pin. 318.

Geranium malacoides. Lob. ic. 662.

γ. *Geranium pedunculis multifloris pentandris. Hort. cliff. 498.*

Geranium acu longissima. Baub. pin. 319.

Geranium speciosum annuum, longissimis rostris, creticum. Baub. hist. 3. p. 479.

Habitat circa Hispalim, Monspelium & in Creta.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Omnibus hujus speciei, quamvis primo intuitu diversissimis, sunt stamina interiora 5 fertilia, juxta basin utrinque dentata; exteriora vero 5 lanceolata, membranacea, sterilia. Folia pinnatifida.

10. *GERANIUM pedunculis bifloris alternis cauli erecto superne insidentibus. Hort. cliff. 343.*

Geranium phæum, flore reflexo. Baub. hist. 3. p. 477.

Geranium montanum fuscum. Baub. pin. 318.

Geranium montanum. Dod. pempt. 64.

Habitat in alpihus Helveticis, Styriacis.

Hospitatur sub dio, perennis.

POLYANDRIA.

SIDA.

1. *SIDA foliis palmatis: laciniis lanceolato-attenuatis. Hort. cliff. 346.*

Althæa virginiana, ricini folio. Herm. lugdb. 22. t. 23.

Malva, aceris folio, virginiana. Tournef. inst. 95.

Habitat in Virginia.

Hospitatur in Frigidario, Caldario, & sub dio, perennis.

Obs. Hæc differt in non paucis a reliquis, ut facile novum genus constitueret.

2. *SIDA foliis subrotundo-cordatis acuminatis. Hort. cliff. 346. Fl. zeyl. 219. Gron. virg. 78.*

Althæa theophrasti, flore luteo. Baub. pin. 316.

Althæa altera f. Abutilon. Cam. epit. 668.

Abutilon. Dod. pempt. 656. Dalech. hist. 592.

β. *Abutilon indicum, flore luteo minore. Breyn. prodr. 2. p. 1. Bum. zeyl. 1. Fl. zeyl. 520.*

Alcææ

Alceæ affinis indica. *Abutilon* dicta, flore flavo, foliis mollibus profunde venosis, filiculis lanuginosis.

Pluk. phyt. 126. f. 5.

Habitat in *Zeylonia*, *Virginia*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

Obs. Differt β caule brevior, foliis utrinque tomentosis & mollioribus a præcedenti α , et margine foliorum inflexo durior et obtusior: cætera omnia eadem.

3. *SIDA* foliis inferioribus cordato - angulatis, superioribus hastatis, petalis integris. *Roy. lugdb.* 349.

Habitat in *Vera cruce* forte?

Hospitatur in *Vaporario*, annua.

Obs. Accedit proxime ad *ABUTILON* lavateræ flore, fructu inflato. *Dill. elth.* 3. t. 2. f. 2. sed caulis inferne magis lævis. Folia inferiora pentagona, nec ovata, absque angulis. Petala emarginata. Cæterum pedunculi uniflori & calyces patentes. Capsulæ extrorsum mucronatæ. Flos cæruleus.

4. *SIDA* foliis cordato - ovatis ferratis, stipulis fetaceis, alis spinosis, *Roy. lugdb.* 349. *Fl. zeyl.* 254.

Sida foliis cordato - ovatis, capsulis quinis bicuspidatis. *Hort. cliff.* 346.

Malvinda bicornis, sanguisorbæ folio villoso & glabro. *Dill. elth.* 214. t. 171. f. 210.

Alcea, carpini folio, americana frutescens, flosculis luteis, semine duplici nostro donatis. *Comm. hort.* 1. p. 3. t. 2.

Alcea virginiana bidens, pimpinellæ majoris acutiore folio, flosculis luteis minimis. *Pluk. alm.* 25. t. 9. f. 6. 3.

Habitat in utraque *India*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

Obs. Semina 5, bicuspidata. Floret hora 12.

5. *SIDA* foliis lanceolato - rhomboidibus ferratis. *Hort. cliff.* 68. *Fl. zeyl.* 252. *Vir. cliff.* 68. *Gron. virg.* 78.

Malvinda unicornis, folio rhomboide, perennis. *Dill. elth.* 216. t. 172. f. 212.

Althæa carpini folio, flosculis luteis. *Bocc. sic.* 11. t. 6. f. 2.

Alcea pernambucana, carpini folio, flosculis minimis luteis, semine simplici rostro donato. *Moris. hist.* 2. p. 528.

Habitat in Zeylona, Jamaica, Brasilia, Virginia.

Hospitatur in Caldario, perennis.

Obs. Huic semina 10.

6. SIDA foliis orbiculatis spicatis ferratis. *Hort. cliff.* 346.

Fl. zeyl. 253.

Malvinda stellata alnifolia. *Dill. elth.* 215. *t.* 172. *f.* 211.

Althæa indica, latiori folio cordiformi ad summum sinuato. *Pluk. alm.* 26. *t.* 9. *f.* 2.

Habitat in Benghala, Zeylona, Malabaria,

Hospitatur in Caldario, perennis.

U R E N A.

1. URENA foliis angulatis. *Hort. cliff.* 348. *Fl. zeyl.* 256.

Urena sinica, xanthii facie. *Dill. elth.* 430. *t.* 319. *f.* 412.

Trifolio adfinis indiæ orientalis, xanthii facie. *Breyn. cent.* 82. *t.* 35.

Habitat in China.

Hospitatur in Caldario, Frutex.

M A L V A.

1. MALVA caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis. *Hort. cliff.* 502.

Malva annua, flosculis albis verticillatim nascentibus. *Tournef. inst.* 96.

Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis albis pentaphyllis verticillatim genicula ambientibus & seminibus arcte iisdem verticillatim adhærentibus. *Morif. hist.* 2. *p.* 521. *Raj. hist.* 598.

Malva sylvestris erecta, flosculis albis minimis. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 268.

Habitat in China, Syria,

Hospitatur sub dio, annua.

2. MALVA foliis angulatis crispis, floribus axillaribus glomeratis. *Hort. cliff.* 347.

Malva foliis crispis. *Bauh. pin.* 315.

Malva crispa. *Bauh. hist.* 2. *p.* 952. *Dod pempt.* 653.

Habitat - - - sine dubio ex præcedente orta,

Hospitatur sub dio, annua.

3. MALVA hederaceo folio. *Bauh. pin.* 315.

Malva major altera. *Matth. diosc.* 340.

Malva major tertia. *Dalech. hist.* 586.

Malva rotundifolia italica, flore amplo purpurascente. *Tournef. inst.* 268.

Malva

Malva perennis hispanica, flore carneo amplo. *Morif. hist.* 2. p. 522.

Malva virens rotundifolia, flore amplo purpurascen-
te, italica. *Barr. rar.* 479.

Malva, folio ficus, altera. *Bauh. pin.* 315. *prodr.* 137.

Habitat in Italia, Lusitania, Hispania.

Hospitatur sub dio, annua.

Obi. Differt a *Malva Fl. Svec.* 581 magnitudine florum & glabritie totius
plantæ, nec non in aliis pluribus notis, quæ distinctam indicant speciem.

4. *MALVA* foliis multifidis, caule repente. *Hort. cliff.* 347.

Abutilon carolinianum repens, alceæ foliis, gilvo flo-
re. *Mart. cent.* 34. t. 34.

Abutilon repens, alceæ foliis, flore helvulo. *Dill. elth.* 5. t. 4. f. 4.

Alcea caroliniana, flore parvo saturate purpureo. *Pet. mus.* 744.

Habitat in Carolina.

Hospitatur in Tepidario, annua, rarius perennis.

5. *MALVA* foliis subcordatis laciniatis glabris, caule
arborescente. *Hort. cliff.* 347.

Malva capensis frutescens, grossulariæ folio majore
hirsuto. *Dill. elth.* 209. t. 169. f. 207.

Malva africana frutescens, flore rubro. *Comm. hort.* 2.
p. 171. t. 86.

Malva africana frutescens, flore parvo carneo: ungui-
culis atro-rubentibus. *Pluk. amalth.* 140. t. 431. f. 5.

Althæa africana arborescens purpurea, grossulariæ vel
ribes folio. *Herm. afr.* 3.

Habitat ad Caput b. spei.

Hospitatur in Tepidario, perennis.

6. *MALVA* foliis ovato-oblongis acute ferratis, capsu-
lis tricuspидatis. *Hort. cliff.* 346. *descr.*

Althæa coromandeliana, angustis prælongis foliis, se-
mine bicorni. *Pluk. alm.* 10. t. 334. f. 2.

Habitat in utraque India.

Hospitatur in Caldario, annua.

Obi. Floret hora 12. Capsulæ 10 apice setacea, ad tergi latera utrinque den-
ticula notata.

*. *MALVA* caule erecto, foliis multipartitis. *Hort. cliff.* 347. *Fl. svec.* 582.

β. *Alcea vulgaris major*, flore candidiore. *Tournef. inst.* 97.

Habitat in *Europa*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

*. **MALVA** foliis radicalibus reniformibus incisfis, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis.

Malva montana f. *Alcea rotundifolia laciniata*. *Col. ecphr.*

i. p. 148. *t.* 147. *Fl. suec.* 583.

Alcea folio rotundo laciniato, flore rubro. *Boerb. lugdb. i. p.* 270.

Habitat in *Europa australiori*.

Hospitatur *sub dio*, perennis, cicur.

LAVATERA.

1. **LAVATERA** caule arboriformi, foliis septem-angularibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus.

Lavatera foliis septemangularibus obtusis plicatis villosis, caule fruticoso, floribus ad alas confertis.

Hort. cliff. 348.

Malva arborea veneta dicta, parvo flore. *Bauh. pin.* 315.

Malva arborescens. *Dod. pempt.* 653.

Habitat in *Italia* inter *Pisas* & *Liburnum* portum.

Hospitatur in *Frigidario*, biennis.

2. **LAVATERA** caule fruticoso, foliis quinquelobatastatis.

Lavatera foliis quinquangularibus acutis crenatis : lacinia media productiore. *Hort. cliff.* 348.

Althæa frutescens, folio acuto, parvo flore. *Bauh. pin.* 316.

Althæa arborea olbia in galloprovincia. *Lob. ic.* 653.

Habitat in *Galloprovincia* insula *Olbia*.

Hospitatur in *Frigidario* & *Tepidario*, frutex.

3. **LAVATERA** caule erecto, ramis inferioribus diffusis, pedunculis confertis unifloris axillaribus.

Malva cretica annua, flore parvo ad alas umbellato.

Tournef. cor. 2.

Habitat in *Creta*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Desc. Facies *MALVÆ* folio rotundo. *Fl. suec.* 580; sed altitudo humana; Rami inferne longi, diffusi, procumbentes. Folia inferiora rotundata, superiora angulata. Calyces undique villosi. Corollæ purpurascences.

4. **LA-**

4. LAVATERA caule herbaceo, fructibus denudatis, calycibus incis.

Lavatera foliis inferioribus cordato-subrotundis, superioribus lobatis crenatis, calycibus utrinque incis, caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 355.

Althæa thuringiaca. *Cam. hort.* 12. t. 6.

Althæa thuringiaca grandiflora. *Dill. elth.* 9. t. 8. f. 8.

Althæa flore majore. *Baub. pin.* 316.

Habitat in *Pannonia*, *Moravia*, *Thuringia*, *Tataria* ad sepes montium. Hospitatur *sub dio*, perennis.

5. LAVATERA foliis glabris, caule scabro herbaceo, pedunculis unifloris, fructibus orbiculo tectis.

Lavatera foliis subcordatis obtusis & angulatis serratis, caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 355.

Lavatera africana, flore pulcherrimo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 268.

Malva annua trimestris, flore cum unguibus purpureis, feminibus multis nigris rotundis subter membranæ duplicatis orbiculis latentibus. *Morif. hist.* 2. p. 520. f. 5. t. 17. f. 2.

Malva trimestris, flore cum unguibus purpureis. *Baub. hist.* 2. p. 950.

Malva rotundifolia glabra ex hispania, flore amplo rubello. *Pluk. alm.* 238. t. 44. f. 3.

Habitat in *Syria*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs Radix annua. Caules diffusi vel erectiusculi, ad radicem Rami longi vix subramosi, pilis scabri, purpurascens. Folia petiolata, nutantia, supra lævia, & subtus plerumque lævia, obtusiuscula, parum serrata: inferiora subrotunda, cordata; intermedia obtuse quinquangularia; summa fere hastata. Corollæ maximæ, incarnatæ unguibus sanguineis. Styli staminibus longiores, arcuati.

GOSSYPIUM.

1. GOSSYPIUM foliis quinquelobis.

Gossypium caule decumbente. *Hort. cliff.* 350.

Gossypium frutescens, semine albo. *Baub. pin* 430.

Gossypium. *Cam. epit.* 203.

Xylon f. Gossypium herbaceum. *Baub. hist.* 1. p. 343. *Tournef. inst.* 101.

Svecis Bomull.

Pharm.

Pharm. GOSSYPHII Semina, BOMBYCIS Lana.

Habitat in America, Jamaica, nunc in Græcia.

Hospitatur in Caldario, annua.

2. GOSSYPIUM foliis trilobis integerrimis.

Gossypium frutescens annuum, folio trilobato barba-
dense. *Pluk. alm.* 172. t. 188. f. 1.

Habitat in Barbados.

Hospitatur in Caldario, biennis, altero anno fructificans.

Desc. Folia cordata, triloba, integerrima, hinc diversa, licet fruticosa videan-
tur, a GOSSYPHIO caule erecto. *Hort. cliff.* 350.

A L C E A.

1. ALCEA foliis sinuato-angulosis. *Hort. cliff.* 348.

Malva rosea, folio subrotundo. *Baub. pin.* 315.

Malva hortensis. *Dod. pempt.* 652.

a. Malva rosea, folio subrot, flore candido. *Tournef. inst.* 94.

β. - - - - - luteo simplici. *Tournef. inst.*

γ. - - - - - dilutius rubente. *Tournef. inst.*

δ. - - - - - saturatius rubente. *Tournef. inst.*

ε. - - - - - purpuræ modo relucente *Tourn. inst.*

ζ. - - - - - ex rubro nigricante. *Tournef. inst.*

η. - - - - - violaceo. *Tournef. inst.*

θ. - - - - - pleno albo. *Tournef. inst.*

ι. - - - - - luteo. *Tournef. inst.*

κ. - - - - - incarnato. *Tournef. inst.*

λ. - - - - - puniceo. *Tournef. inst.*

μ. - - - - - nigricante. *Tournef. inst.*

Svecis Stäckros.

Habitat - - -

Hospitatur *sub dio*, hyeme tegitur frondibus, biennis.

2. ALCEA foliis palmato-digitatis. *Hort. cliff.* 348.

Malva rosea folio ficus. *Baub. pin.* 315.

Malva rosea simplex peregrina. *Tabern. hist.* 1149.

Habitat - - -

Hospitatur *sub dio*, biennis.

A L T H A E A.

1. ALTHAEA foliis simplicibus tomentosis. *Hort. cliff.*
348. *Gvett. flor.* 2. p. 169.

Althæa

Althæa dioscoridis & plinii. Baub. pin. 315.

Althæa. Fuchf. hist. 15. Cam. epit. 667.

- β. *Althæa dioscoridis & plinii, folio magis angulato. Tournef. inst. 97.*

Pharm. ALTHÆÆ Radix, Herba, Semina.

Habitat in pratis humidis Hollandiæ, Angliæ, Galliæ & β Sibiricæ duplo altior. Hospitatur sub dio, perennis.

2. *ALTHÆA foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis, caule fruticoso.*

Althæa foliis compositis scabris. Hort. cliff. 349.

Alcea cannabina. Baub. pin. 316.

Alcea fruticosa, cannabino folio. Clus. hist. 2. p. 25.

Habitat in Hungaria, G. Narbonensi, Italia, Sicilia.

Hospitatur in Frigidario, fruticosa.

HIBISCUS.

1. *HIBISCUS foliis ovatis acuminatis ferratis, caule simplicissimo, petiolis floriferis.*

Hibiscus foliis ovatis crenatis: angulis lateralibus obsoletis. Hort. cliff. 349. Gron. virg. 79. Roy lugdb. 358.

Ketmia americana, populi folio. Tournef. inst. 100.

Alcea rosea peregrina, forte Rosa moscheutos plinii.

Corn. can. 144. t. 145. Moris. hist. 2. p. 532. f. 5. t. 19. f. 6.

Habitat in Canada, Virginia.

Hospitatur in Caldario, perennis, florens, fructificans.

Obs. Caulis quotannis perit, illeque simplicissimus est & pedunculus exit e petiolo, non vero e caule, quod indicat affinitatem cum Turnera. Flos vere speciosus & pulcherrimus.

2. *HIBISCUS foliis cordato-quinquangularibus obsolete serratis. Hort. cliff. 349. Roy. lugdb. 358.*

Althæa arborea, Rosa Sinensis. Moris. hist. 2. p. 530. f. 5. t. 18. f. 2.

Rosa sinensis. Ferr. flor. 493. t. 497. Mer. sur. 31. t. 31.

Habitat in China, Malabarica.

Hospitatur in Caldario, Arbor.

Obs. HIBISCUS foliis ovatis acuminatis ferratis Fl. Zeyi. 260. longe diversa est planta a nostrate.

3. *HIBISCUS foliis ovato-lanceolatis: superne incisoferratis. Hort. cliff. 350.*

Alcea arborescens syriaca. Baub. pin. 316.

Alcea arborescens. Cam. hort. t. 3. 4.

Habitat in *Syria*.

Hospitatur in *Frigidario*, æstate in terra *sub dio*, arbutula.

4. **HIBISCUS** foliis peltato-cordatis septemagularibus serratis hispidis. *Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 358. *Fl. Zeyl.* 261.

Alcea ægyptiaca villosa. Baub. pin. 317.

Mosch f. Bammia muschata. Alp. exot. 197. *t.* 196.

Muscus bloem. Mer. surin. 42. *t.* 42.

Pharm. ABELMOSCHI Semina.

Habitat in *Ægypto*, *Brasilia*, *Jamaica*, *Malabaria*, *Zeylona*.

Hospitatur in *Caldario* caule perenni, fructificans.

5. **HIBISCUS** foliis palmato-digitatis septempartitis. *Hort. cliff.* 350. *Roy. lugd.* 358.

Ketmia folio manihot serrato, flore amplo sulphureo. Dill. elth. 189. *t.* 156. *f.* 189.

Alcea finica, manihot stellato folio, capsula longa pilosa pyramidata quinqvesariam divisa. Pluk. amalth. 7. *t.* 355. *f.* 2.

Habitat in *China* & *America*.

Hospitatur in *Caldario*, perennis, egregie fructificans.

Obs. Facies antecedentis statura, hispiditate, altitudine, floribus, capsulis, maculis fuscis ad foliorum exortum etc. sed foliorum figura & semina inodora differunt.

6. **HIBISCUS** foliis tripartitis incisiss, calycibus inflatis capsulam obtegentibus.

Trionum Hort. cliff. 349.

Ketmia vesicaria vulgaris. Tournef. inst. 101.

Alcea vesicaria. Baub. pin. 317. *Dod. pempt.* 643.

Alcea folisequa. Lob. hist. 374.

Habitat in *Italia*, inque littore *Venetiano*.

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

Obs. Pedunculus in hac articulatus est, et calycis stricæ dentatæ sunt. Aliæ species indicant hanc plantam ab *Hibiscis* genere non esse distinguendam.

M A L O P E.

1. **MALOPE** foliis ovatis crenatis glabris. *Hort. cliff.* 347.

Malacoides betonicæ folio. Tournef. inst. 98.

Malva betonicæ folio. Meris. hist. 2. *p.* 522. *f.* 5. *t.* 17. *f.* 11. *Bocc. sic.* 15. *t.* 8. *f.* 2.

Habitat in *Hetruriæ* pratis.

Hospitabatur nuper, ante brumam enata, in *Caldario*, sed prima hyeme periit.



CLASSIS. XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

FUMARIA.

1. FUMARIA filiquis paniculatis linearibus, caule erecto.

Fumaria caule erecto ramoso, filiquis filiformibus corymbosis. *Hort. cliff.* 352.

Fumaria filiquosa sempervirens. *Corn. canad.* 57. t. 58. *Morif. hist.* 2. p. 259. f. 3. t. 12. f. 1.

Capnoides. *Tournef. inst.* 423.

Habitat in Canada.

Hospitatur sub dio, cicur, annua.

2. FUMARIA filiquis globosis inflatis.

Fumaria foliis cirrhiferis, filiquis ovatis inflatis pendulis. *Hort. cliff.* 351.

Fumaria alba vesicaria, capreolis donata, sub exitu autumnii florens, æthiopica. *Pluk. alm.* 400.

Cysticapnos africana scandens. *Boerb. lugdb.* 1. p. 310. t. 310.

Habitat in Æthiopia.

Hospitatur in Tepidario, annua.

DECANDRIA.

ERYTHRINA.

1. ERYTHRINA foliis ternatis, caule spinoso. *Hort. cliff.* 354. *Fl. zeyl.* 275.

Corallodendron triphyllum americanum spinosum, flore ruberrimo. *Tournef. inst.* 661.

Coral arbor filiquosa. *Comm. hort.* 1. p. 211. t. 108.

Ceratia f. Siliqua sylvestris spinosa arbor indica. *Baub. pin.* 402.

Habi-

Habitat in sepibus *Jamaica*, *Malabarica*, *Zeylonica*, *Java*.
Hospitatur in *Caldario*, Arbor.

A M O R P H A.

1. AMORPHA. *Hort. cliff.* 353. *Tab.* 19. *Roy. lugdb.* 393.
Barba jovis americana, PseudoAcaciae foliis, flosculis
lis purpureis minimis. *Angl. hortul.* 11. t. 4.
Habitat in *Carolina*.
Hospitatur in *Tepidario*, frutex †.

S P A R T I U M.

1. SPARTIUM ramis oppositis teretibus versus apicem
floriferis, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 356.
Spartium arborescens, seminibus lenti similibus.
Baub. pin. 396.
Spartium macrolobium. *Reneal. spec.* 34. t. 33.
Genista juncea. *Baub. hist.* 1. pp. 395.
Habitat in *G. Narbonensi*, *Italia*, *Sicilia*, *Turcia*.
Hospitatur in *Frigidario*, Arbuscula.
2. SPARTIUM ramis spinosis angulatis, foliis ternatis.
Hort. cliff. 356.
Cytisus spinosus. *Herm. lugdb.* 218.
Acacia trifolia. *Baub. pin.* 392.
Aspalatus secunda trifolia. *Baub. hist.* 1. pp. 375.
Habitat in sepibus asperis maritimis *Hetrurica*, *Italica*, *Sicilica*, *Galloprovincica*.
Hospitatur in *Frigidario*, Arbuscula †.

G A L E G A.

1. GALEGA. *Dod. pempt.* 548. *Lob. hist.* 509. *Dalech. hist.* 976.
Galega vulgaris. *Baub. pin.* 352.
Galega vulgaris, floribus cæruleis. *Tournef. inst.* 398.
- β. Galega vulgaris, floribus penitus candicantibus.
Tournef. inst. 398.
- γ. Galega africana, floribus majoribus & siliquis crassioribus.
Tournef. inst. 398.
Pharm. GALEGÆ Herba.
Habitat ad aquarum rivos *Italica*, *Hispanica*, *Syrica*.
Hospitatur in *Frigidario* & sæpe sub dio, perennis.

I N D I G O F E R A.

1. INDIGOFERA leguminibus arcuatis incanis, racemis folio brevioribus. *Fl. zeyl.* 273. Indio-

Indigofera foliis nudis. *Hort. cliff.* 487.

Anil f. Indigo indica. *Moris. hist.* 2. p. 202.

Ameri. *Rheed. mal.* 1. p. 101. t. 54.

Pharm. INDIGO commune, optimum.

Svecis Indigo.

Habitat in aridis sterilibus arenosis petrosis, ubi pluviae rarius cadunt,
Jamaica, Caribæarum, Zeylonæ, Malabarica.

Hospitatur in *Caldario*, petennis.

LUPINUS.

1. LUPINUS calycibus alternis absque appendiculis.
Hort. cliff. 349.

Lupinus caule composito. *Hort. cliff.* 359.

Lupinus sativus, flore albo. *Glus. hist.* 2. p. 228.

Pham, LUPINI Semina.

Habitat - - - -

Hospitatur *sub dio*, annua.

2. LUPINUS calycibus alternis utrinque appendiculatis. *Hort. cliff.* 499.

Lupinus caule simplici ramoso. *Hort. cliff.* 359.

Lupinus sylvestris, flore cæruleo. *Baub. pin.* 348.

Lupinus sylvestris, flore purpureo, semine retundo vario. *Baub. hist.* 2. p. 291.

Habitat inter segetes *Messanæ et Monspelii.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

3. LUPINUS calycibus verticillatis, labio inferiore trifido. *Hort. cliff.* 499.

Lupinus sylvestris, flore luteo. *Baub. pin.* 348.

Lupinus flore luteo, semine compresso vario. *Baub. hist.* 2. p. 291.

Habitat in arenosis *Siciliæ.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

4. LUPINUS calycibus verticillatis; labio inferiore integerrimo. *Hort. cliff.* 499.

Lupinus peregrinus major f. villosus cæruleus major.

Baub. pin. 348. *prodr.* 148.

Lupinus exoticus hirsutissimus. *Baub. hist.* 2. p. 280.

Habitat - - -

Hospitatur *sub dio*, annua.

CROTALARIA.

1. CROTALARIA foliis lanceolatis petiolatis sessilibus, caule striato. *Hort. cliff.* 357.

Crotalaria benghalensis, foliis genistæ hirsutis. *Pluk. alm.* 122. *t.* 169. *f.* 5.

Crotalaria asiatica, folio argenteo villoso, flore luteo filiquis pendulis in spica. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 25.

Habitat in *Italia orientali*.

Hospitatur in *Caldario*, sed semina non perficit, annua †.

2. CROTALARIA foliis ternatis, petiolis nudis. *Hort. cliff.* 358.

Crotalaria trifolia fruticosa, foliis rotundis incanis, floribus spicatis e viridi luteis, fructu pubescente. *Sloane flor.* 141. *hist.* 2. *p.* 34. *t.* 179. *f.* 1. *Raj. suppl.* 446.

Habitat in agris sterilibus *Jamaicae* & *Caribæarum*.

Hospitatur in *Caldario*, sed non maturat facile semina †.

ONONIS.

1. ONONIS stipulis floralibus ovatis membranaceis integerrimis. *Roy. lugdb.* 376.

Anonis alopecuroides mitis annua purpurascens. *Dill. elth.* 28. *t.* 24. *f.* 27.

Anonis alopecuroides annua purpurea. *Pluk. alm.* 398.

Anonis purpurea spicata erecta annua latifolia, filiquis rectis lentiformibus. *Moris. hist.* 2. *p.* 169. *f.* 2. *t.* 179. *f.* 4. *male*.

Habitat in *Lusitania* & *Barbados*.

Hospitatur in *Tepidario*, annua †.

CYTISUS.

1. CYTISUS foliolis ovato-oblongis racemis simplicibus pendulis. *Hort. cliff.* 354. *Roy. lugdb.* 369. *Hall. belv.* 591.

Cytisus alpinus latifolius, flore racemoso pendulo. *Tournef. inst.* 648.

Laburnum arbor trifolia anagyridi similis. *Bauh. hist.* 2. *p.* 361.

Anagyris non foetida major vel alpina. *Bauh. pin.* 391.

Anagyris non foetens minor. *Bauh. pin.* 391.

Habi-

Habitat in alpinis calidioribus *Helvetiæ, Genevæ, Sabaudia.*

Hospitatur in *Frigidario*, interdum *sub dio*, frutex.

2. CYTISUS floribus capitatis, ramis decumbentibus.

Roy. lugdb. 370. n. 6.

Cytisus supinus, foliis intra & filiquis molli lanugine pubescentibus. *Bauh. pin. 390.*

Cytisus VII. species altera. Clus. hist. 1. p. 67.

Cytisus VII. Best. eyft. vern. 11. f. 2.

Habitat in sylvis *Pannoniæ.*

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

3. CYTISUS calycibus hirsutis trifidis obtusis ventricoso-oblongis, pedunculis simplicibus.

Cytisus calycibus hirsutis sessilibus, pedunculis simplicibus brevissimis. *Hort. cliff. 355.*

Cytisus foliis subruffa lanugine hirsutis. Bauh. pin. 390.

Cytisus hirsutus. Bauh. hist. 1. pp. 378.

Cytisus III. Clus. 1. p. 94.

Habitat ad radices montium *Calpen, Boetiæ, Italiæ, Sicilia.*

Hospitatur in *Frigidario*, frutex †.

Desc. Folia, rami tenelli, petioli, pedunculi, legumina hirsuta sunt. Calyces subsessiles propriis pedunculis, inflati, oblongi: dentibus duobus superioribus & unico infimo acutiore.

4. CYTISUS foliolis sublanceolatis tomentosis: intermedio longius petiolato, pedunculis axillaribus erectis. *Fl. zeyl. 354.*

Cytisus foliolis ovato-lanceolatis: intermedio petiolato, pedunculo ex alis multifloro. *Hort. cliff. 354.*

Cytisus folio molli incano, filiquis orobi contortis & acutis. *Burm. zeyl. 86. t. 37.*

Phaseolus erectus incanus, filiquis torosis, *Kayan dictus. Pluk. alm. 293. t. 213. f. 3.*

Habitat in *Malabaria, Zeylona, Caribæis.*

Hospitatur in *Caldario*, frutex †.

A N A G Y R I S.

1. ANAGYRIS. *Clus. hist. 1. p. 93. Dod. pempt. 785.*

Anagyris floribus lateralibus. Roy. lugdb. 371.

Anagyris foetida. Bauh. pin. 391.

Habitat in montibus *Siciliæ, Italiæ, Hispaniæ.*

Hospitatur in *Frigidario*, Arbor.

U L E X.

1. ULEX folio sub singulis spinis subulato plano acuto.

Hort. cliff. 356.

Genista spartium majus, longioribus aculeis. *Tournef.*

inst. 645.

Genista spinosa major, longioribus aculeis. *Bauh. hist.*

394.

Genista spinosa. *Dod pempt.* 659.

Habitat in arenosis sabulosis squalidis sepibus Germaniæ, Angliæ, Brabantia, Galloprovincia.

Hospitatur in *Frigidario*, sed non facile fert clima horti nostri, hinc omni hyeme perit, frutex.

R O B I N I A.

1. ROBINIA pedunculis racemosis, foliis pinnatis.

Robinia aculeis geminatis. *Hort cliff.* 354. *Gron. virg.* 82.

PseudoAcacia filiquis glabris. *Boerb. lugdb.* 1. p. 39.

Acacia americana, filiquis glabris. *Raj. hist.* 1719.

Acaciæ affinis virginiana spinosa, filiqua membranacea plana, floribus albis papilionaceis anagrydis modo in uvam propendentibus. *Pluk. alm.* 6. t. 73. f. 4.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Frigidario*. Arbor.

2. ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis pinnatis.

Aspalathus arborescens, pinnis foliorum crebrioribus oblongis. *Amm. rhut.* 210. n. 285.

Caragana sibirica. *Roy. lugdb.* 537.

Habitat in *Sibiria* in tractibus fluvii *Tom.*

Hospitatur *sub dio*, Arbor.

3. ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis petiolatis.

Aspalathus frutescens major latifolius, cortice aureo.

Amm. Rhut. 206.

Habitat in *Sibiria* & *Tataria* cum præcedente.

Hospitatur *sub dio*, frutex altus.

- 4 ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis subsessilibus.

Aspalathus frutescens minor angustifolius, cortice aureo. *Amm. rhut.* 204. n. 282. t. 35.

Habitat ubique in *Sibiria*.

Hospitatur *sub dio*, sed difficile. Frutex parvus

P H A S E O L U S.

1. PHASEOLUS radice annua, caule volubili, legumini-
bus pendulis compressis torosis. *Roy. lugdb.* 367.

a Phaseolus vulgaris. *Lob. ic.* 59. *Hort. cliff.* 359.

Smilax hortensis f. *Phaseolus major.* *Baub. pin.* 339.

Dolichos f. *Phaseolus.* *Dod. pempt.* 519.

β. Phaseolus vulgaris, fructu violaceo. *Tournef. inst.* 412.

γ. Phaseolus vulgaris, fructu ex rubro & nigro variega-
to. *Tournef. inst.* 412.

δ. Phaseolus fructu albo venis nigris & lituris distincto.
Tournef. inst. 413.

Pharm. PHASEOLI Semina.

Svecis Turkiska bönor.

Habitat in *India orientali.*

Hospitatur *sub dio*, annua, frequens.

2. PHASEOLUS caule erecto lævi, leguminibus ere-
ctiusculis compressis rugosis.

Phaseolus vulgaris italicus humilis f. minor albus cum
orbita nigricante. *Baub. hist. 2. p.* 358. *Raj. hist.* 885.

Phaseolus minor, filiqua sursum rigente, fructu albo.
Tournef. inst. 413.

Smilax filiqua sursum rigente f. *Phaseolus parvus ita-*
licus. *Baub. pin.* 339.

Svecis Kryp-bönor.

Habitat in *India orientali.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

3. PHASEOLUS puniceo flore. *Cornut. canad.* 184.

Phaseolus indicus, flore coccineo f. puniceo. *Morif.*
hist. 2. p. 69.

Habitat - - -

Hospitatur *sub dio*, annua.

4. PHASEOLUS caule erecto tereti, floribus capita-
tis, leguminibus cylindraceis horizontalibus. *Act.*
stockh. 1742. *p.* 202. *t.* 7. *f.* 2.

Phaseolus zeylanicus, filiquis radiatim digestis. *Dill.*
eltb. 315. *t.* 235. *f.* 304.

Habitat in *Zeylonia, China.*

Hospitatur in *Caldario*, annua.

5. PHASEOLUS caule volubili, floribus subcapitatis, feminibus tetragono-cylindricis pulverulentis.

Phaseolus peregrinus, flore roseo, semine tomentoso.

Niss. act. 1730. p. 577. t. 42.

Phaseolus indicus, hederæ folio anguloso, semine oblongo lanuginoso. *Raj. suppl.* 438.

Habitat in India

Hospitatur in *Caldario*, annua.

DOLICHOS.

1. DOLICHOS leguminibus ovato-acinaciformibus, feminibus ovatis hilo arcuato versus alteram extremitatem. *Roy. lugdb.* 368.

Phaseolus ægyptiacus, nigro semine. *Baub. pin.* 341.

Phaseolus niger, Lablab. *Alp. ægypt.* 74. t. 75.

Lablab *Vest. ægypt.* 24.

Habitat in *Ægypto*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

2. DOLICHOS leguminibus subcylindræis capitatis: acumine recurvo concavo.

Phaseolus barbadiensis, filiqua tenui recta, semine ex purpureo nigricante.

Habitat in *Barbados*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

Obs. Flos purpureus est.

3. DOLICHOS minimus, floribus luteis. *Hort. cliff.* 360. t. 21.

Phaseolus minimus fœditus, floribus spicatis e viridi luteis, semine maculato. *Sloan. hist.* 1. p. 182. t. 115. f. 1.

Phaseolus fructu minimo, semine variegato. *Plum. spec.* 8.

Habitat in *Jamaica*.

Hospitatur in *Caldario*, frutescens.

CLITORIA.

1. CLITORIA foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 360. *Fl. zeyl.* 283.

Flos Clitoridis ternatensibus. *Breyn. cent.* 76. t. 31.

Ternatea flore simplici cæruleo. *Tournef. act.* 1706. p. 84.

Phaseolus indicus, glycyrrhizæ foliis, flore amplo cæruleo. *Comm. hort.* 1. p. 47. t. 24.

Habi-

Habitat in *Malabaria*, *Zeylona*, *Ternateis*.

Hospitatur in *Caldario*, vix florens, nobis annua †.

2. **CLITORIA** foliis ternatis, calycibus campanulatis.

Clitoria foliis ternatis. *Hort. cliff.* 361.

Phaseolus floris vexillo amplissimo, filiquis rectis teretibus. *Plum. spec.* 8.

Planta leguminosa brasiliiana, phaseoli facie, flore purpureo maximo *Breyn. cent.* 78. t. 32.

Habitat in saltibus & dumetis *Brasilie*.

Hospitatur in *Tepidario*, non floruit, nobis annua †.

PISUM.

1. **PISUM** stipulis deorsum gibbis crenatis, petiolis teretibus, caule tereti, pedunculis multifloris.

Pisum stipulis crenatis. *Hort. cliff.* 369.

- a. *Pisum* arvense, fructu viridi. *Tournef. inst.* 394.

Pisum arvense. *Baub. pin.* 342.

Pisum minus. *Dod. pempt.* 521.

Svecis Gröna ärtar.

- β. *Pisum* hortense majus. *Baub. pin.* 342.

Svecis Stora hvita ärtar.

- γ. *Pisum* cortice eduli. *Tournef. inst.* 394.

Pisum sine cortice durior. *Baub. pin.* 343.

Svecis Socker-ärtar.

- δ. *Pisum* umbellatum. *Baub. pin.* 344.

Svecis Kron-ärtar.

- ε. *Pisum* majus quadratum. *Baub. pin.* 342.

Svecis Stora kantärtar, *Holländska* ärtar, *Har* ärtar.

- ζ. *Pisum* humile, caule firmo. *Tournef. inst.* 394.

Pisum nanum rotundum sine adminiculis erectum. *Hort. paris.* 143.

Svecis Krypärtar.

Habitat inter segetes *Europæ*.

Hospitatur ubique *sub dio*, annua.

2. **PISUM** petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis. *Hort. cliff.* 370.

Ochrus folio integro capreolos emittente. *Baub. pin.* 343.

Ervilia sylvestris. *Dod. pempt.* 522.

Habitat inter segetes *Italiae*, *Creta*.
Hospitatur *sub dio*, annua.

LATHYRUS.

1. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ovalibus, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 367.
Lathyrus arvensis repens tuberosus. *Baub. pin.* 344.
Apios. *Fuchs. hist.* 131.
Terræ glandes. *Dod. pempt.* 550.
Svecis Jordmös. *Belgis* Aardakers.
Habitat inter segetes *Geldriae*, *Brabantiae*, *Geneva*, *Tatariae*.
Hospitatur *sub dio*, cicur, perennis.
2. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, radicibus etiam sub terra fructificantibus. *Hort. cliff.* 367.
Lathyrus amphicarpos, supra & infra terram siliquas gerens. *Moris. hist.* 2 p. 51.
Viciæ similis, supra & infra terram fructus gerens. *Baub. pin.* 345.
Arachnidna vel potius Arachoides honorii belli, *Baub. hist.* 2. p. 323.
Arachydna lusitanica. *Pet. mus.* 35.
Habitat in *Syria*, forte & in *Lusitania*.
Hospitatur *sub dio*, annua.
Obl. Leguminum figura valde accedit ad sequentem & magnam indicat affinitatem.
3. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis: dorso bimarginatis. *Hort. cliff.* 367.
Lathyrus annuus, flore cæruleo, ochri siliqua. *Herm. lugdb.* 357.
Lathyrus angustifolius, siliqua alata, vexillo cæruleo, alis variegatis. *Boerb. lugdb.* 2. p. 42.
Habitat in *Hispania*.
Hospitatur *sub dio*, annua.
4. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliis ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. *Hort. cliff.* 368.
a. Lathyrus ficulus. *Rupp. jen.* 210.
Lathyrus distoplatyphyllos hirsutus mollis, magno &

& peramœno flore odoro. *Comm. hort. 2. p. 159. t. 80.*

β. *Lathyrus zeylanicus*, odorato flore amœne ex albo & rubro vario. *Burm. zeyl. 138.*

Habitat & in *Sicilia*, β in *Zeylona*.

Hospitatur in *ollis*, annua.

Obs. *Hæc coronaria, suaveolens; in β vexillum rubrum, alæ albæ, carina alba apice rufescente.*

γ. *LATHYRUS* pedunculis subunifloris, cirrhis polyphyllis: foliolis alternis. (*Hort. cliff. 368.*)

Lathyrus, angustissimo folio, americanus variegatus. *Bauh. pin. 344.*

Lathyrus annuus, siliquis orobi. *Raj. hist. 898.*

Clymenum hispanicum, flore vario, siliqua articulata. *Tournef. inst. 396.*

Habitat in *Bætica Hispania*.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. *E semine enascitur facie Ochri petiolis scilicet ensiformibus aphyllis decurrentibus basi utrinque denticulatis, dein faciem mutat. Legumina seminibus protuberantibus quasi articulata rhomboide impressa.*

δ. *LATHYRUS* pedunculis bifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis dentatis. *Hort. cliff. 368.*

Clymenum flore vario, siliqua plana. *Tournef. inst. 396.*

Habitat in agro *Tingitato*.

Hospitatur sub dio, annua.

ε. *LATHYRUS* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis: internodiis membranaceis. *Hort. cliff. 367.*

Lathyrus latifolius. *Bauh. pin. 344. Moris. hist. 2. p. 51. f. 2. t. 2. f. 3.*

Lathyrus major latifolius, flore majore purpureo, speciosior. *Bauh. hist. 2. p. 303.*

Habitat *Monspeli*.

Hospitatur sub dio & in *Frigidario*, perennis.

Obs. *Differt a Lathyro Fl. suec. 598. Folia enim ovato-lanceolata nec linearia. Stipulæ lineares utrinque mucronatæ ut in suecico. Petioli margine læves nec ita scabri. Corollæ saturatissime purpureæ nec luteo-purpurascens.*

ζ. *LATHYRUS* pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis lunatis.

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Accedit proxime ad Lathyrum ultimum *Fl. svec.* 600, sed differt latitudine foliorum, stipularum, caulis altitudine, floribus densioribus, cætera alibi.

9. **LATHYRUS** cirrhis aphyllis. *Hort. cliff.* 367.

Lathyrus annuus luteus, foliis convolvuli minoris.

Moris. hist. 2. p. 52. f. 2. t. 4. f. 7.

Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. Baub. pin. 345.

Aphaca. Lob. hist. 518.

Habitat inter segetes *Angliæ, Galliæ, Italiæ.*

Hospitabatur sub dio, annua †.

V I C I A.

1. **VICIA** caule recto, petiolis absque cirrhis. *Hort. cliff.* 369.

Faba. Baub. pin. 338.

Faba major f. Bona major. Moris. hist. 2. p. 83. f. 2. t. 7. f. 1.

Bona f. Phaseolus. Dod. pempt. 513.

β. *Faba flore ex purpura nigrescente. Tournef. inst. 391. Svecis Bönor.*

γ. *Faba minor f. equina. Baub. pin. 338.*

Pharm. FABÆ Semina, Farina, Cineres, Sal, Flores, Aqua.

Svecis Håstbönor.

Habitat - - -

Hospitatur ubique sub dio, annua.

2. **VICIA** leguminibus erectis subsessilibus, foliolis subovatis, stipulis dentatis.

Vicia petiolis tetraphyllis cirrhiferis. Hort. cliff. 369.

Vicia narbonensis maxima, fructu rotundo atro, foliis ferratis & integris. Moris. hist. 2. p. 61. f. 2. t. 4. f. 3.

Vicia narbonensis. Riv. tetr. 57.

Faba sylvestris, fructu rotundo atro. Baub. pin. 338.

Bona sylvestris. Dod. pempt. 516.

Habitat in campestribus *Narbonæ, Aquitaniæ, Angliæ.*

Hospitatur sub dio, annua.

3. **VICIA** leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, stipulis dentatis. *Hort. cliff. 368. Fl. svec. 601.*

β. *Vicia*

β. *Vicia vulgaris sativa*, semine nigro. *Baub. pin.* 344.

Vicia vulgaris sativa. Baub. hist. 2. p. 310.

Habitat in *Europa*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

4. *VICIA* pedunculis subquinquefloris longitudine foliorum. *Hort. cliff.* 368.

Vicia benghalensis hirsuta & incana, filiquis pisi. *Herm. lugdb.* 623. t. 625.

Habitat in *Benghala*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

5. *VICIA* pedunculis multifloris, foliolis ovatis: infimo pari caulino.

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrhosis, foliolis ovatis: infimis sessilibus. *Hort. cliff.* 369.

Pisum sylvestre perenne. Baub. pin. 343.

Pisum sylvestre Clus. hist. 2. p. 129.

Cracca flore ochroleuco. Riv. tetr. 57.

Habitat in montibus sylvestris *Pannonia*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

6. *VICIA* pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis, foliolis sub lanceolatis glabris.

Vicia perennis maxima. Kalm. act. stockh. 1747. p. 64.

Vicia perennis multiflora, majori flore cæruleo ex albo mixto. *Magn. monsp.* 306.

Habitat forte in *Sibiria*, e seminibus certe Siberiacis mixtis enata, biennis.

Desc. Radix fibrosa; Caulis primo anno non floret, sed superne perit; altero anno major nascitur ad humanam vel duplo, imo saepe & triplo humanam altitudinem, glaber, sulcatus, angulatus. Stipulae utrinque acutae, raro uno alterove dente notatae, pedicellatae. Petioli canaliculati, angulati, sulcato-striati, in cirrhos desinentes. Foliola 11, 12, 13, lato-lanceolata, ad angulum acutum nervosa, glabra, acuta, acumine reflexo, subpetiolata. Pedunculi solitarii, folio longiores, angulati, sulcati, terminati Racemo simplici florum imbricatorum, nutantium, quorum basis alba, vexillum cæruleum venis violaceis, magnitudine craccæ vulgaris, cætera alba. Legumina floribus pauciora, oblonga, compressa, utrinque mucronata, glabra, pendula. Adeoque accedit ad vicias 603. 605. Floræ sueciæ, sed differt a 603. Stipulis non sessilibus nec adeo crenatis; nec odore gaudet foetido, nec foliolis ovatis. a 605 vero quod non villosa, quod altior, quod petiolis sulcatis &c. gaudeat.

7. *VICIA* pedunculis unifloris, foliolis integerrimis, stipulis alternis dentatis.

Lens

Lens monanthos, *Herm. lugdb.* 360.

Vicia pedunculis unifloris, *Kalm. act. stockh.* 1747. p. 60.

Habitat in *Asia rhutenica*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. *Species diffimillima*. Cicere 2:de f. Lente vulgari duplo major. cirrhis scandens. Foliola obtusiora. Calyces corollæ longe breviores. Legumina seminibus 2 vel 3, oblongiora; Semina compressa sed non margine acuto uti lentis, alba.

OROBUS.

1. **OROBUS** foliolis conjugatis subsessilibus, stipulis dentatis.

Lathyroides erecta, folio ovato acuminato, cæruleis viciæ floribus & siliquis, sibirica. *Amm. rhut.* 114.

n. 151. *t.* 7. *f.* 2.

Habitat in pinetis *Nertschiensibus* & campis *Arguniensibus* *Sibiria*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

LOTUS.

1. **LOTUS** leguminibus solitariis membranaceo-quadrangularibus, foliolis floralibus ovatis.

Lotus leguminibus subsolitariis, angulis quatuor membranaceis. *Hort. cliff.* 372.

Lotus ruber, filiqua angulosa. *Bauh. pin.* 332.

Lotus pulcerrima tetragonolobus. *Cam. hort.* 91. *t.* 26.

Lotus filiquosus, rubello flore. *Clus. hist.* 2. p. 244.

Habitat in collibus *Sicilia*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

2. **LOTUS** leguminibus subquinatis arcuatis. *Hort. cliff.* 372.

Lotus filiquis ornithopodii. *Bauh. pin.* 332.

Lotus peculiaris, filiquis ornithopodii. *Cam. hort.* 91. *t.* 25.

Habitat in *Sicilia*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

3. **LOTUS** caule erecto hirtio, capitulis hirsutis, leguminibus ovatis.

Lotus caule fruticoso, florum capitulis depressis, calycibus lanigeris. *Hort. cliff.* 372.

Lotus pentaphyllus filiquosus villosus. *Bauh. pin.* 332.

Lotus polykeratos frutescens incana alba, filiquis erectis

ctis crassioribus & brevioribus rectis. *Moris. hist. 2. p. 177. f. 2. t. 18. f. 14.*

Habitat *Monspelii*, *Romæ*, *Messanæ*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis †.

4. LOTUS caule erecto, capitulis subglobosis, leguminibus rectis glabris.

Lotus caule fruticoso, florum capitulis globosis. *Hort. cliff. 372.*

Lotus filiquosus glaber, flore rotundo. *Bauh. pin. 332.*

Lotus polykeratos frutescens hirsuta alba major latifolia, filiquis tenuibus curtis rectis. *Moris. hist. 2. p. 177. f. 2. t. 18. f. 13.*

Habitat in humidis *Monspelii*, *Messanæ*, & *Tropiæ Calabriae*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis.

A N T H Y L L I S.

1. ANTHYLLIS herbacea, foliis quaterno-pinnatis, floribus lateralibus.

Anthyllis foliis quinato-pinnatis: foliolo terminatrice maximo. *Hort. cliff. 371.*

Lotus pentaphyllus vesicaria. *Bauh. pin. 332.*

Vulneraria pentaphyllos. *Tournef. inst. 391.*

Trifolium halicacabum. *Cam. hort. 171. t. 47.*

Habitat in *Italia* & *Sicilia*.

Hospitatur *sub dio*, vix maturescit, annua †.

Obs. Legumina disperma, Folia pinnata ex foliolis quatuor, quorum extremum majus, lateralibus inferiora duo opposita; laterale vero inferius unicum est, ejusque oppositum deest.

2. ANTHYLLIS fruticosa, foliis ternatis: intermedio productiore.

Barba jovis hispanica incana, flore luteo. *Tourn. inst. 651.*

Cytisus incanus, folio medio longiore. *Bauh. pin. 390.*

Cytisus VI. *Clus. hist. 1. p. 96.*

Habitat in *Hispania*, præsertim in regno *Valentino*.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

Obs. Rami foliis denudati supra tegetes sparguntur ab iis qui Bombyces alunt, ut satiri Bombyces mori foliis, sericea sua stamina his ramis advolvunt, quæ dein a pueris & mulierculis explicantur.

3. ANTHYLLIS fruticosa, foliis pinnatis: foliolis æqualibus. *Hort. cliff. 371.*

Barba jovis. *Bauh. pin. 397.*

Barba jovis pulchre lucens. *Baub. hist.* 1. p. 385.

Habitat in clivis maritimis *Helvetia*.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

TRIFOLIUM.

1. TRIFOLIUM spicis ovatis, calycibus patulis: lacinia infima maxima, foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 373.

Trifolium clypeatum argenteum. *Alp. exot.* 307. t. 306. *bona*.

Habitat in *Creta*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

2. TRIFOLIUM spicis villosis conico-oblongis: denticulis calycinis setaceis subæqualibus, foliolis linearibus. *Hort. cliff.* 375.

Trifolium montanum angustissimum spicatum. *Baub. pin.* 328. *Segu. veron.* 102.

Trifolium alopecurum latifolium, spica longa. *Barr. rar.* 72. t. 697.

Habitat in montibus *Messanæ*, *Monspeli*, *Veronæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua †.

3. TRIFOLIUM spicis oblongis villosis obtusis nudis, foliolis subrotundis. *Roy. lugdb.* 380.

Trifolium albo-incarnatum spicatum. *Baub. hist.* 2. p. 376.

Lagopus latifolius. *Riv. tetr.* 17.

Lagopum maximum, folio & facie trifolii pratensis. *Lob ic.* 39.

Habitat in pratis *Genevæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

4. TRIFOLIUM capitulis villosis, involucro terminali reflexo rigido capitulum involvente. *Hort. cliff.* 374.

Trifolium pratense supinum cathobleps s. capite humimerso. *Bar. rar.* 73. t. 881.

Trifolium album tricoccum subterraneum gastonium reticulatum. *Morif. hist.* 2. p. 132. f. 2. t. 14. f. 5.

Habitat in ericetis, humidis, sterilibus, arenosisque pratis *Monspeli*, *Paris*, *Lugduni Gallorum*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. Planta capitulum fructus intra terram condit absoluta florescentia. Pedunculus capitulum profert erectum ex 5 floribus in umbellam; hi amissis corollulis reflectuntur ad pedunculum, cujus apex terebrat terram, sed juxta hunc apicem 5. squamæ emergunt, excrescunt, reflectuntur, elongantur, involunt calyces in globum cancellatum.

5. TRIFOLIUM capitulis dimidiatis, foliis quinatis sessilibus, leguminibus polyspermis.

Lupinaster. Buxb. act. 2. p. 345. t. 20.

Lupinaster floribus purpureis, siliqvis minoribus.

Amm. ruth. 107. n. 143.

β. Lupinaster floribus albis, siliqvis minoribus. Amm. rhut. 109. n. 144.

Habitat in Sibiria.

Hospitatur sub dio, perennis.

6. TRIFOLIUM fruticosum hirsutum, spicis oblongis pedunculatis. Gron. virg. 173.

Habitat in Virginia.

Hospitatur in Tepidario, sed prima hyeme perit †.

7. TRIFOLIUM spicis subrotundis, leguminibus seminudis acuminatis, caule erecto. Hort. cliff. 375.

Melilotus major odorata violacea. Moris. hist. 2. p. 162.

f. 2. t. 16. f. 10.

Lotus hortensis odorata. Bauh. pin. 330.

Lotus sylvestris. Cam. epit. 724.

Habitat in Bohemia, Lybia.

Hospitatur in sub dio, annua.

8. TRIFOLIUM floribus racemosis, leguminibus nudis dispermis, caule erecto. Hort. cliff. 376. Fl. suec. 617.

β Melilotus italica. Camm. hort. 99. t. 29.

γ Melilotus officinarum germaniæ, flore albo. Tournef. 10 inst. 407.

Lotus sylvestris, flore albo. Tabern. hist. 893.

Pharm. MELILOTI ALBI Flores, Herba.

Svecis Amur.

Habitat in Carelia, Germania, Gallia.

Hospitatur sub dio, biennis, cicur.

9. TRIFOLIUM floribus racemosis, leguminibus nudis monospermis, caule erecto.

Trifolium erectum, caule teretiusculo, pedunculis

com-

compresso-angulatis, pericarpis racemosis rotundis
rugosis nudiusculis monospermis. *Fl. Zey.* 552.

Melilotus lutea indiae orientalis erecta, folliculis ro-
tundis parvis, spica florum ex foliorum alis multi-
plici. *Pluk. alm.* 246. t. 45. f. 4.

β Melilotus indica humilis erecta, floribus exiguis odo-
ratis albis, pericarpis spicatum densius stipatis.
Pluk. alm. 247. t. 45. f. 5.

Habitat in India & Africa.

Hospitatur sub dio, annua.

C I C E R.

1. CICER foliis ferratis. *Hort. cliff.* 370.

Cicer sativum. *Bauh. pin.* 347.

Cicer arietinum. *Bauh. hist.* 2. p. 292. *Dod. pempt.*
525.

Pharm. CICERIS Semina alba, rubra.

Svecis Fontenell-ärter.

Habitat inter segetes Hispaniae, & Italiae.

Hospitatur sub dio, raro semina maturans, annua.

2. CICER pedunculis bifloris, foliolis integerrimis, sti-
pulis indivisis.

Cicer pedunculis bifloris, seminibus compressis. *Hort.*
cliff. 370.

Lens major. *Bauh. pin.* 346.

Lens. *Dod. pempt.* 526.

Adaschim. *Cel. hierob.* 2. p. 103.

Pharm. LENTIIUM Semina.

Habitat inter segetes Galloprovinciae, Narbonae.

Hospitatur sub dio annua.

3 CICER pistillorum germinibus undulato-plicatis.

Ervum leguminibus pendulis. *Hort. cliff.* 370.

Orobis filiquis articulatis, flore majore. *Bauh. pin.*
346.

Molochus s. Cicer sativum. *Dod. pempt.* 254.

Pharm. ERVI Semina. ORODI Farina.

Habitat inter segetes Monspeli & Genevae.

Hospitatur sub dio, annua.

PSORALEA.

1. PSORALEA foliis pinnatis.

Psoralea foliis pinnatis, foliolis linearibus acuminatis.

Roy. lugdb. 373.

Dorycnium caule fruticoso, foliis pinnatis: foliolis linearibus. *Hort. cliff.* 370.

Spartium africanum. *Riv. tetr.* 5.

Genistæ affinis arbor africana monospermos, flore cæruleo, foliis pinnatis. *Herm. lugdb.* 272. t. 273.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

Obs. Calyx est solitarius absque glumis & villosus quod non in reliquis obtinet.

2. PSORALEA foliis omnibus ternatis, pedunculis spicatis folio longioribus.

Trifolium capitulis subrotundis, calycibus ventricosis, caule arborescente. *Hort. cliff.* 373.

Trifolium bitumen redolens. *Bauh. pin.* 327.

Trifolium bituminosum. *Dod. pempt.* 566.

Habitat in collibus maritimis saxosis *G. Narbonensis*, *Italiae*, *Siciliae*.

Hospitatur in *Tepidario* (nobis annua), frutex.

3. PSORALEA foliis digitato-quinatis: foliolis inæqualibus.

Contrajerva alba mexicana. *B. Jussiei*.

Habitat in *Mexico*.

Hospitatur in *Tepidario*, sed culturam nostram respuit, perennis.

4. PSORALEA foliis simplicibus ovatis.

Dorycnium foliis simplicibus ovatis. *Roy. lugdb.* 389.

Loto affinis *coryli* folio. *Dodart. act.* 4. p. 289. t. 289.

Pluk. alm. 227. t. 96. f. 5.

Habitat in *India*.

Hospitabatur in *Caldario*, sed tenera periit.

ASTRAGALUS.

1. ASTRAGALUS caulescens procumbens, leguminibus prismaticis rectis triquetris, ramis procumbentibus.

Astragalus canadensis, flore viridi flavescente, fructu triangulari. *Walth. hort.* 120.

Habitat - - -

Hospitatur sub *dio*, annua.

2. **ASTRAGALUS** caulescens procumbens, leguminibus scrotiformibus inflatis mucronatis pilosis.
Astragalus leguminibus subglobosis, floribus spicatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 362.
Astragalus luteus perennis, siliqua gemella rotunda vesicam referente. *Moris. hist.* 2. p. 108. f. 2. t. 9. f. 2.
Cicer sylvestre, foliis oblongis hispidis, majus. *Bauh. pin.* 347.
Cicer sylvestre. *Cam. epit.* 205.
 Habitat inter segetes *Genevæ* & calidioris *Helvetiæ*.
 Hospitatur sub dio, perennis.
3. **ASTRAGALUS** caulescens erectus, leguminibus erectiusculis nudis tumidis tereti-depressis: mucrone reflexo.
 Habitat in *Sibiria*.
 Hospitatur sub dio, perennis.
 Desc. Facies duorum antecedentium, sed brevior & erectior; ad *Astragalum* villosum erectum spicatum, floribus flavescentibus. *Ann. rhut.* n. 166. proxime accedit, sed caulis, tota planta & legumina minime villosa. Flores ex albido flavescentes. Foliola ovato-lanceolata. Legumina subcylindracea, inflata, oblonga, sed parum depressa (non lateribus compressa), erectiuscula, apice non rigido, sed horizontaliter extrorsum flexo.
4. **ASTRAGALUS** caulescens erectus, leguminibus erectiusculis pilosis subulatis: acumine erectiusculo.
Astragalus villosus erectus spicatus, floribus flavescentibus. *Ann. rhut.* 125. n. 166.
Cicer montanum lanuginosum erectum. *Bauh. hist.* 347. *prodr.* 148.
 Habitat in *Sibiria*, *Valesia*.
 Hospitatur sub dio, perit primo anno, hinc forte annua.
 Obs. Adeo convenit cum præcedente 3, ut utrum specie differat ipse hæreo, licet hæc minor & hirsuta, illa vero minime.
5. **ASTRAGALUS** caulescens procumbens, leguminibus subulatis recurvatis glabris.
Astragalus monpelianus. *Clus. hist.* 2. p. 234.
Securidaca lutea minor, corniculis recurvis. *Bauh. pin.* 349.
Hedysarum alterum. *Dod. pempt.* 546.
 Habitat in collibus *Messanæ* & *Monspeli*.
 Hospitatur sub dio, annua.
6. **ASTRAGALUS** acaulis, scapo erecto foliis longiore, leguminibus subulatis inflatis villosis erectis.

Astra-

Astragalus non ramosus villosus & incanus spicatus, floribus purpureo violaceis. Amm. rhut. 126. n. 167. forte?

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Desc. Radix vivax: Folia pinnata petiolis obsolete triangularibus. Folia 23-33, ovata, acuta, sessilia, pilis albidis parvis adspersa. Scapi radicati, foliis duplo longiores, teretes, fistulosi, substriati, asperiusculi: Spica brevis, oblongiuscula. Flores sessiles. Bractæ lanceolatæ, calyce breviores. Calyces ovati, inflati, dentibus quinque brevibus. Corolla purpurea violaceo-cærulea. Legumen Calyce longius, subpilosum.

7. **ASTRAGALUS** acaulis, scapo declinato longitudine foliorum, leguminibus subulatis teretibus subarcuatis glabris.

Astragalus monspessulanus. Baub. hist. 3. p. 338. Magn. monsp. 33.

Habitat in aridis glateosis *Monspeli*, misus ab amicis. *D. Sauvages*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Desc. Radix vivax: Folia pinnata petiolis rotundatis, supra planiusculis. Foliola 21-23, ovata, acuta (non emarginata), sessilia, glabra, nitida. Scapi radicales, longitudine foliorum, teretes, procumbentes, apice ascendentes, glabri. Spica brevis, obtusiuscula: Flores sessiles. Bractæ parvæ. Calyces cylindrici: dentibus quinque subularis longis: summis profundo obtuso sinu divisis. Corolla purpurea. Vexillum longum, lateribus reflexis ut se invicem tangant, quod non in præcedenti. Legumina glabra, subulata, subarcuata.

8. **ASTRAGALUS** acaulis, scapo foliis brevior, leguminibus subulatis canaliculatis retortis hirsutis.

Habitat: ad *Astracan*.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix fibrosa. Folia pinnata, pilosa: Foliola 15-17, ovalia, emarginata, pilosa (Tragacantæ) petiolo communi tereti supra canaliculato. Pedunculi decumbentes, folio dimidio breviores. Flores spicati, albidi, vexillo striis aliquot incarnatis & carina apice parum incarnata. Legumina conferta, lineari-subulata, apice ad basin recurvata in orbem, canaliculata, latiuscula, valde hirsuta.

GLYCINE.

1. **GLYCINE** foliis pinnatis alternis: foliolis ovato-lanceolatis.

Glycine radice tuberosa. Hort. cliff. 361. Gron. virg. 85.

Apios americana. Corn. canad. 200. t. 201. Stiff. bot. 29. t. 29.

Astragalus tuberosus scandens, fraxini folio. Tournef. inst. 415.

Astragalus perennis spicatus americanus, scandens caulis, radice tuberosa. *Morif. hist.* 2. p. 102. f. 2. t. 9. f. 1.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis.

2. **GLYCINE** foliis pinnatis conjugatis: foliolis partibus ovali-oblongis obtusis. *Fl. zeyl.* 284. *synon.*

Phaseolus arborescens alatus & volubilis major orientalis, fructu coccineo hilo nigro notato. *Pluk. alm.* 294. t. 214. f. 5.

Pisum indicum minus coccineum. *Bauh. pin.* 313.

Abrus. Vest ægypt. 25. *Hort. cliff.* 488.

Konni. Rheed. mal 8. p. 71. t. 39.

Habitat in *Malabaria*, *Zeylona*, *Java*, *Ægypto*, *Jamaica*.

Hospitatur in *Caldario*, biennis †.

P H A C A.

1. **PHACA** leguminibus inflatis.

Astragaloides elatior erecta, viciæ foliis, floribus luteis, siliquis pendulis. *Amm. rhut.* 111. n. 148.

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Obs. Non dum flores protulit, hinc de genere ulterius inquirendum.

C O L U T E A.

1. **COLUTEA** foliolis obverse cordatis, caule arboroso. *Hort. cliff.* 365.

Colutea vesicaria. Bauh. pin. 396.

Colutea. Dod. pempt. 784.

Habitat in montanis *Austriæ*, *Monspeli*, *Italiæ* præsertim ad summities *Vesuvii*, ubi nullæ aliæ plantæ.

Hospitatur in *Frigidario*, Arbuscula.

2. **COLUTEA** foliolis ovato-lanceolatis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 366.

Colutea æthiopica, flore purpureo. *Breyn. cent.* 70. t. 29.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur in *Tepidario*, frutex.

A R A C H I S.

1. **ARACHIS.** *Hort. cliff.* 353.

Arachis hypogajos americanus. *Raj. hist.* 919.

Ara-

Arachidna quadrifolia villosa, flore luteo. *Plum. gen.* 49.
 Senna tetraphylla s. absi congener hirsuta maderaspatensis, folliculos sub terra condens. *Pluk. alm.* 341.
t. 60. f. 2.

Habitat in *Brasilis & Peru.*

Hospitatur in *Tepidario*, sed semina fructumque non præparavit, annua.

TRIGONELLA.

1. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis pendulis ovalibus compressis, caule diffuso, foliolis subrotundis.

Melilotus supina latifolia, filiqua lata membranacea compressa. *Amm. rhut.* 119. n. 158.

Melilotus filiqua membranacea compressa. *Act. petrop.* 8. p. 209. t. 12.

Habitat in montosis *Arbutis, Jabasch, Abacan.*

Hospitatur *sub dio*, cicur, perennis.

2. TRIGONELLA leguminibus sessilibus strictis subfalcatis erectiusculis acuminatis.

Trigonella leguminibus sessilibus. *Vir. cliff.* 76.

Medicago leguminibus subsolitariis sessilibus erectis reflexo-falcatis acuminatis. *Hort. cliff.* 376.

Fœnum græcum sativum. *Bauh. pin.* 348.

Fœnum græcum. *Fuchsf. hist.* 798. *Cam. epit.* 199.

Pharm. FOENI GRÆCI Semina, Oleum.

Habitat *Monspeli.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

MEDICAGO.

1. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule recto glabro. *Hort. cliff.* 377.

Medica sativa s. Trifolium sativum, filiqua cornuta magis tortili. *Moris. hist.* 2. p. 158. f. 2. t. 16. f. 2.

Medica major erectior, floribus purpurascens. *Bauh. hist.* 2. p. 382.

Medica legitima. *Clus. hist.* 2. p. 242.

Fœnum burgundicum. *Lob. hist.* 498.

2. Medica major erectior floribus ex violaceo & luteo mixtis. *Tournef. inst.* 410.

Gallis Lucerne.

Habitat in apricis pratis *Hispaniæ*, *Galliæ*.
Hospitatur *sub dio*, perennis.

2. **MEDICAGO** leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Hort. cliff.* 378.

Medica cochleata minor polycarpus annua, capsula nigra hispidiore. Moris. hist. 2. p. 144. f. 2. t. 15 f. 1-21.

Trifolium cochleatum, fructu nigro hispido. Bauh. pin 329.

Trifolium cochleatum alterum. Dod. pempt. 575.

- β. *Medica scutellata. Bauh. hist. 2. p. 384.*

- γ. *Medica orbiculata. Bauh. hist. 2. p. 384.*

- δ. *Medica cochleata polycarpus, fructu ovali: spinis brevioribus & rigidioribus. Raj. hist. 963.*

- ε. *Medica ternata minor lævis. Parck. theatr. 1116.*

Habitat ad agrorum margines interque legetes, inque arenosis *Angliæ*, *Galliæ*, *Italiæ*, *Siciliæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

3. **MEDICAGO** leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 377.

Loto affinis, filiquis hirsutis circinatis. Bauh. pin. 333.

Auricula muris, Cam. hort. 24. t. 8.

Habitat in collibus siccis *Hispaniæ*, *Romæ*, *Salaminiæ*.

Hospitatur *sub dio*, sed semina vix maturat, annua †.

4. **MEDICAGO** leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis ternatis. *Hort. cliff.* 377.

Medicago annua, filiqua falcata striata. Moris. hist. 2. p. 158. f. 2. t. 16. f. 3.

Trifolium filiqua falcata. Bauh. hist. 330.

Lunaria radiata italorum. Lob. hist. 498.

Habitat in *Italia*.

Hospitatur *sub dio*, annua †.

5. **MEDICAGO** leguminibus lunulatis margine integerimis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 376.

Cytisus incanus, filiquis falcatis. Bauh. pin. 389.

Cytisus marantæ. Lob. hist. 503.

Falcata. Riv tetr.

Habitat in *Rhodo* & *Neapoli*.

Hospitatur in *Frigidario*, *Arbuscula*.

GLYCYRRHIZA.

1. **GLYCYRRHIZA** leguminibus echinatis, *Roy, lugdb.*
386. Gly-

Glycyrrhiza capite echinato. *Baub. pin.* 352.

Glycyrrhiza vera dioscoridis. *Dod. pempt.* 341.

Pseudo Glycyrrhiza. *Riv. tetr.* 53.

Dulcis radix. *Cam. epit.* 423.

Pharm. LIQUIRITIÆ Radix, succus, Extractum, Es-
sentia, Syrupus, Baculi, Trochisci.

Svecis Lakriz.

Habitat in monte Gargano Apuliæ inque deserto Nagaico Tataricæ ad flu-
vium *Jack.*

Hospitatur sub dio, perennis.

H E D Y S A R U M.

1. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articula-
tis aculeatis nudis rectis, caule diffuso. *Hort. cliff.* 365.

Hedysarum clypeatum, flore svaviter rubente. *Tournef.*
inst. 401.

Onobrychis, semine clypeato aspero, major. *Baub.*
pin. 350.

Onobrychis altera. *Dod. pempt.* 549.

- β. Hedysarum clypeatum, flore albo. *Tournef. inst.* 401.

Habitat in pratis *Senesium & Messanæ.*

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

2. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articula-
tis aculeatis flexuosis, caule diffuso.

Hedysarum annuum, filiqua aspera undulata intorta.
Tournef. inst. 401.

Onobrychis major annua, filiculis articulatis asperis
clypeatis undulatim junctis, flore purpureo-ruben-
te. *Morif. hist.* 2. p. 130. *Raj. hist.* 929.

Habitat in *Asia.*

Hospitatur sub dio, annua.

3. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articu-
latis aculeatis tomentosis, caule diffuso.

Hedysarum clypeatum asperum, filiqua spinosissima,
flore purpureo. *Boerb. lugdb.* 2. p. 51.

Habitat in *Hispania.*

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Flores parvi, vicia, albi: vexillo striis purpureis. Fructus speciei primæ
sed tomentosus & parum recurvus.

4. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus subro-
tundis aculeatis. *Hort. cliff.* 365.

Onobrychis folio viciæ, fructu echinato, major. Baub. pin. 350.

Caput gallinaceum belgarum. Lob. hist. 527.

Gallis Saint foin.

Habitat in pratis apricis sterilibus cretaceis Angliæ, Bohemiæ, Sibiria.
Hospitatur sub dio, perennis.

5. **HEDYSARUM** foliis pinnatis, leguminibus articulatis glabris, caule erecto, leguminibus pendulis.

Hedysarum saxatile, filiqua lævi, floribus purpureis, inodorum. Amm. rhut. 116. n. 152. 153.

Hedysarum alpinum, floribus purpureo-cæruleis, filiqua levi. Hall. gott. 59.

Habitat in Sibiria ad Jeniseam fluvium.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Pulchra, erecta & angusta planta.

6. **HEDYSARUM** foliis simplicibus ternatisque, floribus racemosis.

Hedysarum foliis radicalibus simplicibus, caulinis ternatis, floribus laxè spicatis, leguminibus undulatis. Hort. cliff. 365.

Hedysarum triphyllum canadense. Corn. canad. 44. t. 45. Raj. hist. 928.

Onobrychis major perennis canadensis triphylla, filiculis articulatis asperis triangularibus. Moris. hist. 2. p. 130. f. 2. t. 11. f. 9.

Habitat in Canada, Virginia.

Hospitatur sub dio, in Tepidario, Caldario, perennis.

7. **HEDYSARUM** foliis ternatis subtus scabris, caule hispido, floribus conjugatis racemosis.

Hedysarum foliis ternis solitariisque, caule hispido fruticoso. Hort. cliff. 365. Gron. virg. 87.

Hedysarum triphyllum fruticosum supinum, flore purpureo. Sloan. flor. 73. hist. 1. p. 185. t. 118. f. 2. Raj. suppl. 458.

Hedysarum triphyllum canescens, floribus albis spicatis. Boerb. lugdb. 2. p. 51.

Onobrychis americana, floribus spicatis, foliis ternis canescentibus, filiculis asperis. Pluk. alm. 270. t. 308. f. 7.

Habitat in *Virginia*, *Jamaica*.

Hospitatur in *Caldario*, perennis.

8. HEDYSARUM foliis simplicibus ovatis obtusis integerrimis. *Hort. cliff.* 499. *Fl. zeyl.* 290.

Hedysarum humile, cappardis folio maculato. *Dill. elth.* 170. *t.* 141. *f.* 161.

Habitat in *Zeylona*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis †.

ÆSCHYNOMENE.

1. ÆSCHYNOMENE caule scabro, folio infimo quadruplini. *Hort. cliff.* 365.

Hedysarum annuum majus zeylonicum, mimosæ foliis. *Tournef. inst.* 402.

Mimosa non spinosa major zeylonica. *Breyn. cent.* 51. *t.* 52.

Habitat in *Zeylona*.

Hospitatur in *Caldario*, nunquam mihi floruit, annua.

HIPPOCREPIS.

1. HIPPOCREPIS leguminibus solitariis sessilibus. *Hort. cliff.* 364.

Ferrum equinum, filiqua singulari. *Baub. pin.* 349.

Ferrum equinum vulgare. *Column. ecphr.* 1. *p.* 302. *t.* 300.

Habitat circa *Liburnum* & *Neapolim*.

Hospitatur sub dio, annua †.

2. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis confertis margine exteriori lobatis. *Hort. cliff.* 364.

Ferrum equinum germanicum, filiquis in summitate. *Baub. pin.* 346.

Ferrum equinum comosum. *Column. ecphr.* 1. *p.* 302. *t.* 301.

Habitat in montosis cretaceis *Angliæ*, *Æquicorum*, *Monspelii*.

Hospitatur sub dio, vix semina maturans.

SCORPIURUS.

1. SCORPIURUS. *Hort. cliff.* 364.

Scorpioides bupleuri folio. *Baub. pin.* 287.

Scorpioides prius. *Dod. pempt.* 71.

2. Scorpioides bupleuri folio, corniculis asperis magis in se contortis & convolutis. *Moris. hist.* 2. *p.* 127. *f.* 2.

t. 11. *f.* 2.

P 5

γ. Scor-

2. Scorpioides filiqua crassa boëlii. *Tournef. inst.* 402.

Habitat *Monspeli*.

Hospitatur *sub dio*, & in *apricario*, annua.

ORNITHOPUS.

1. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis.

Ornithopus foliis pinnatis, articulis leguminum subrotundis lævibus. *Hort. cliff.* 364.

Ornithopodium minus. *Bauh. pin.* 350.

Ornithopodium perpusillum. *Dalech. hist.* 487.

Habitat in arenosis glareosis arvis apricis *Angliæ*, *Geldricæ*.

Hospitatur *sub dio*, cicur, annua.

Obs. Differt ab *Ornithopo* majore, leguminibus arcuato-spiralibus.

2. ORNITHOPUS foliis ternatis subsessilibus appendiculatis impari maximo. *Hort. cliff.* 364.

Scorpioides portulacæ folio. *Bauh. pin.* 287. *Segu. veron.* 78.

Scorpioides matthioli. *Dod. pempt.* 71.

Habitat in vineis & agris *Monspeli*, *Liburni*, *Messanæ*, *Veronæ*.

Hospitatur in *Tepidario*, vix maturefcit, annua †.

CORONILLA.

1. CORONILLA fruticosa, leguminibus teretibus, pedunculis multifloris.

Coronilla leguminibus teretibus, unguibus corolla brevioribus, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 363.

Polygala altera. *Bauh. hist.* 349.

Polygala valentina. *Clus. hist.* 1. p. 98.

Habitat in collibus arenosis agri *Neapolitani*, *Salmanticensis*, *Murciani*, *Valentini*.

Hospitatur in *Frigidario*, frutex.

2. CORONILLA herbacea, leguminibus falcato-glabratis. *Hort. cliff.* 363.

Securidaca lutea major. *Bauh. pin.* 348. *Tournef. inst.* 399.

Hedysarum primum. *Dod. pempt.* 546.

Habitat inter segetes *Hispaniæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. Caules decumbentes, sulcati, cavi, pedunculi inferne hispidi.

3. CORONILLA leguminibus teretibus torosis, foliis glabris, caule herbaceo. *Hort. cliff.* 363.

Coronilla herbacea, flore vario. *Tournef. inst.* 650.

Securidaca dumetorum major, flore vario, filiquis articulatis. *Bauh. pin.* 349.

Securidaca 2, altera species. *Clus. hist.* 2. p. 237.

Habitat in *Germania, Paannonia, Austria, Moravia, Stiria, Bohemia* in pratis agris & prepe vias.

Hospitatur *sub dio*, annua.



CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA
ICOSANDRIA.

CITRUS.

1. CITRUS petiolis linearibus. *Hort. cliff.* 379.
 Citreum vulgare. *Tournef. inst.* 621.
 Citria mala f. Mala medica. *Cam. epit.* 148.
 Malus medica. *Baub. pin.* 435.
Pharm. CITRI Flavedo, Cortex, Condit. Essentia, Aqua,
 Spiritus, oleum, Succus, Conserva, Syrupus, Semina.
Svecis Citron.
 Habitat Citrus apud Medos & Persas imprimis frequens, dein Palladii di-
 ligentia in Italiam translata fuit, postea in Hispania in usu venit ut ne-
 mora & campos occupaverit, Pl,
 Hospitatur in Frigidario.
2. CITRUS petiolis alatis. *Hort. cliff.* 379. *Fl. zeyl* 304.
 a. Aurantia mala. *Cam. epit.* 150.
 Malus aurantia major. *Baub. pin.* 436.
Pharm. NAPHÆ Conditæ, Conserva, Aqua, Spiritus.
 AURANTIORUM Cortex, conditus, Syrupus,
 Essentia, Aqua Spiritus, Oleum, flavedo, Essentia.
Svecis Pomerants.
- β. Malus aurantia, cortice dulci eduli. *Baub. pin.* 436.
 Malus aurantia sinensis. *Sloan. flor.* 11.
Svecis Appelsin.
 Habitat in India orientali.
 Hospitatur in Frigidario.

POLYANDRIA.

HYPERICUM.

1. HYPERICUM corollis pentagynis, caule tetrago-
 no herbaceo simplici, foliis lævibus integerrimis.
 Hype-

Hypericum floribus pentagynis, foliis ovato-oblongis glabris integerrimis. *Hort. cliff.* 380.

Ascyrum magno flore. *Tournef. inst.* 256. (non C. B.)

Androsæmum flore & theca quinquecapsulari omnium maximis. *Morif. hist.* 2. p. 472.

Androsæmum constantinopolitanum, flore maximo. *Whel. itin.* 172. *Raj. hist.* 1017.

Habitat in *Sibiria*, & *Oriente*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

2. **HYPERICUM** floribus trigynis, fructu baccato, caule ancipiti.

Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, foliis ovatis pedunculo longioribus. *Hort. cliff.* 380.

Androsæmum maximum frutescens. *Baub. pin.* 280.

Androsæmum. *Dod. pempt.* 78. *Dalech. hist.* 1156.

Habitat in *Angliæ*, & *Ilvæ* sepibus.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

3. **HYPERICUM** floribus trigynis, staminibus petalo longioribus, caule fruticoso ancipiti. *Hort. cliff.* 331.

Hypericum foetidum frutescens minus. *Dill. elth.* 182. t. 151. f. 182.

Androsæmum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis. *Baub. pin.* 280.

Tragium. *Clus. hist.* 2. p. 305.

Habitat secus fontes & rivulos *Siciliæ*, *Calabriæ*, *Cretæ*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.



CLASSIS. XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

HIERACIUM.

1. **HIERACIUM** caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus. *Roy. lugdb.* 124.

Hieracium fruticosum latifolium hirsutum. Baub. pin. 129.

Hieracii fabaudi varietas 1, Erinus quibusdam mathioli dicta. Baub. hist. 2. p. 1030.

Habitat in *Germania.*

Hospitatur *sub dio*, cicur, perennis.

2. **HIERACIUM** foliis radicalibus obverse ovatis denticulatis, caulinis oblongis semiamplexicaulibus. *Roy. lugdb.* 124.

Hieracium pyrenaicum, foliis cerinthes, latifolium. Tournef. inst. 472.

Habitat in *Pyrenæis.*

Hospitatur *sub dio*, perennis.

3. **HIERACIUM** foliis integris, caule subnudo simplicissimo piloso corymbifero. *Hort. cliff.* 388.

Hieracium hortense, floribus atro-purpurascens, Baub. pin. 128.

Pilosella indica. Corn. canad. 209.

Habitat - -

Hospitatur *sub dio*, perennis.

CREPIS.

1. **CREPIS** foliis amplexicaulibus oblongis acuminatis inferioribus superne: summis inferne denticulatis.

Hieracioides annua, endiviæ folio, capite magno. Vaill. act. 1721. p. 246.

Hieracium foliis endiviæ, capite magno striato. Boerb. lugdb. 1. p. 88.

Hie-

Hieracium alpinum, scorzonæræ folio. *Tournef. inst.*
472.

Habitat in *Alpibus Italicis*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Desc. Radix annua; Caulis fere pedalis, erectus, herbaceus; Folia inferiora cuneiformi-lanceolata, apice denticulata; superiora cordato-lanceolata, amplexicaulia, versus basin denticulata, utrinque viridia, nuda. Rami ex alis, parvi, foliosi, vix subramosi. Pedunculi firmi, sulcati, vix tomentosi. Calyces ovato-oblongi, sulcati, pilosi foliolis 13 circiter, æqualibus, linearibus, convexis, præterea foliola 9 circiter, ovata, acuminata, brevissima, arida, glabra, calycem ad basin ambiunt, calyce dimidio breviora, acuminata; Pappus extra calycem eminens albus, semina in stipitem desinentia.

2. *CREPIS* foliis amplexicaulibus lanceolatis: omnibus dentatis, radicalibus sinuatis. *Virid. cliff.* 79.

Hieracium foliis caulinis sinuatis, calycibus ante florescentiam nutantibus. *Hort. cliff.* 388.

Hieracium apulum, flore svaverubente. *Col. ecphr.* 1.
p. 244.

Hieracium dentis leonis folio, flore svaverubente.
Bauh. pin. 127.

Hieracioides foetida, flore svaverubente. *Vaill. act.*
1721. p. 247.

Chondrilla purpurascens foetida. *Bauh. pin.* 130. prod.
68. t. 68.

Habitat in *Apulia*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

3. *CREPIS* foliis ovatis denticulatis, pedunculis alatis amplexicaulibus dentatis.

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Desc. Radix vivax. Caulis tripedalis vel humanæ altitudinis, minime ramosus, striatus, rubescens, pilis patulis rubicundis apice albis, superne in paniculam parvam desinens. Flores primores brevioribus pedunculis insidentes. Calyx ventricosus ex foliis plurimis, oblongis, linearibus, glabris, longitudinaliter linea pilis nigris notata. Calycis squamæ exteriores, breviores, fere totaliter glabræ, inbricatæ nec ut in reliquis speciebus adeo distinctæ. Folia ampla, ovata, inæqualiter dentata, subtus venosa, petiolo alato amplexicauli, dentato, sæpe undulato; subtus in foliis costæ & vasa pilosa, non vero tomentosa. Corollæ luteæ, amplæ, laxæ; Semen absque stipite pappo simplici. An itaque potius *Hieracii* species?

4. *CREPIS* involucris calyce longioribus, squamis fetaceis sparsis.

Hieracium calycibus fetis longissimis distantibus patentibus, obvallatis. *Hort. cliff.* 387. Hie-

Hieracium proliferum falcatum. Baub. pin. 128

*Hieracium calyce barbato. Column. ecphr. 2. p. 28.
t. 27. f. 1.*

Hieracium boeticum. Clus. cur. 25.

Habitat in littoribus maritimis arenosis *Messanae*, *Siciliae*, *Vesuvii*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

ANDRYALA.

1. *ANDRYALA* foliis integris. *Guett. flor. 2. p. 384.*

Andryala foliis inferioribus dentatis, summis integerrimis. *Hort. cliff. 387.*

Eriophorus foliis dentatis, floribus utrinque luteis.
Vaill. act. 1721. p. 277.

Hieracium villosum; *Sonchus lanatus dalechampi* dictum. *Raj. hist. 231.*

Sonchus villosus luteus major. Baub. pin. 124.

Sonchus lanatus. Dalech. hist. 1116.

Habitat in apicis saxosis *Siciliae*, & *G. Narbonensis*.

Hospitatur *sub dio*, semina raro maturans, biennis.

HYPOCHÆRIS.

1. *HYPOCHÆRIS* calycibus æqualibus hispidis. *Hort. cliff. 385.*

Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque folio. *Vaill. act. 1721. p. 278.*

Hieracium ramosum, floribus amplis, calycibus valde hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus inæqualibus incis. *Raj. app. 144.*

Habitat in *Creta*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Desc. Radix annua. Caulis semipedalis, filiformis, ramis axillaribus, viridis, teres. Folia obverse-ovata in petiolos desinentia, denticulata aut integerrima. Pedunculi sæpius simplices uniflori; foliolis duobus alternis remotis, linearibus, acuminatis. Calyces cylindrici sulcati foliolis 8--12 æqualibus, ad basin squama una alterave. Tota planta pilis albis patentibus remotis, sed calycis foliola dorso maxime pilis adspersa. Corolla lutea.

2. *HYPOCHÆRIS* (calycibus oblongis inbricatis glabris,) caule nudo glabro, foliis dentato sinuatis.
Hort. cliff. 386. n. 4.

Hy-

Hypochæris chondrillæ folio, parvo flore. Vaill. act. 1721. p. 214.

Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro. Baub. pin. 127.

Hyoseris altera. Tabern. hist. 490.

Habitat in Dania & septentrionali Europa.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Facies omnino *Hyoseridis* caule diviso nudo. Hort. cliff. 386. Folia lanceolata, sinuato-dentata, glabra. Caules erectiusculi, uno alterove ramo, nudi, juncei, supra concavi, infra solidi, læves. Calyces ut in *Leontodontoide* 3. Flor. Sveciæ 629. vel *Scorzoneta*, at paleæ inter semina. Semina omnia pappo plumoso coronata, at marginalia pappo sessili, disci vero pappo stipite elevato instructa. Corolla lutea, parva, arcta. Facies *Leontodontoidis* ultimæ. Flor. svec. 629.

P I C R I S.

1. PICRIS perianthiis involucro magno cinctis.

Picris calycibus simplicibus, perianthio maximo obvallatis. Hort. cliff. 387. Guett. flor. 2. p. 385.

Helminthotheca hispida vulgaris annua, Vaill. act. 1721. p. 268.

Hieracium echioides, capitulis cardui benedicti. Baub. pin. 128.

Buglossum echioides luteum hieracio cognatum. Lob. ic. 577.

Habitat in sylvis cædulis & aggeribus sepium Angliæ, Galliæ.

Hospitatur sub dio, annua. Flos explicatur mane hora VII.

2. PICRIS perianthiis aculeatis, foliis inermibus hastato-sinuatis.

Tragopogon calycibus corolla brevioribus aculeatis. Hort. cliff. 382.

Tragopogonoides annua sonchifolia, ovariis aduncis. Vaill. act. 1721. p. 267.

Sonchus asper laciniatus creticus. Baub. pin. 124. prodr. 60.

Hieracium majus, folio sonchi, semine incurvo. Baub. pin. 127.

Chondrillæ creticæ nomine missa, semine crispo. Baub. hist. 2. p. 1022.

Habitat in Cræta.

Hospitatur sub dio, annua.

242 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

Obs. Radix fibrosa, Caulis altus, ramosus. Folia sinuata denticulis spinosis.
Pedunculi laeves. Calyces adpersi setis tandem rigidescentibus.

L A C T U C A.

1. LACTUCA sativa. *Baub. pin. 122. Dod. pempt. 644.*
Dalech. hist. 546.

Pharm. LACTUCÆ Herba, Aqua, Semina.
Svecis Lactuc.

- β. Lactuca capitata. *Baub. pin. 122.*

Pharm. LACTUCÆ HISPANICÆ Herba condita.
Svecis Hufvud - Sallat.

- γ. Lactuca crispa.

Svecis Krus lactuc.

Habitat in Europæ aggeribus.

Hospitatur sub dio, annua.

S C O R Z O N E R A.

1. SCORZONERA caule ramoso, foliis amplexicaulibus integris undulatis. *Hort. cliff. 383.*

Scorzonera latifolia sinuata. Baub. pin. 275.

Scorzonera major hispanica I. Clus. hist. 2. p. 137.

Pharm. SCORZONERÆ Radix, Condita, Aqua, Semina.

Habitat in Hispania.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Adeo affinis Scorzoneræ *Flor. svec. 647, ut sola magnitudine & ramositate fere differat.*

2. SCORZONERA foliis linearibus dentatis. *Roy. lugdb. 120.*

Scorzonera laciniatis foliis. Tournef. inst. 477.

Scorzoneroides vulgaris. Vaill. act. 1721. p. 209.

Tragopogon laciniatum luteum. Baub. pin. 274. Raj. hist. 251.

Habitat in Germania.

Hospitatur sub dio, biennis.

3. SCORZONERA foliis extrorsum sinuatis denticulatis amplexicaulibus, squamis calycinis margine membranaceis.

Sonchus floribus solitariis, foliorum laciniis extrorsum flexis. Hort. cliff. 385.

Sonchus tingitanus, papaveris folio, Tournef. inst. 475.
Raj. suppl. 137.

Cre-

Crepis tingitana, papaveris folio. *Vaill. act.* 1721. p. 255.
Chondrilla tingitana, floribus luteis, papaveris hortensis folio. *Herm. lugdb.* 657. t. 659.

Habitat in Tingide.

Hospitatur sub dio, maturefcit fero mense augufti rarius.

Obf. Flos explicatur hora matutina VII, clauditur hora 10 seu poft tres horas.

TRAGOPOGON.

1. TRAGOPOGON calycibus corollæ difco longioribus, foliis integris acuminatis undulatis.

β. *Tragopogon orientale anguftifolium*, flore maximo luteo. *Tournef. cor.* 36.

Barbula hirci. *Cam. epit.* 312. quoad figuram.

Habitat in Oriente.

Hospitatur sub dio, biennis.

Obf. Varietas hæc β. differt a *Tragopogone* Fl. Sv. 548. quod calyx in hortensi hac β. corollæ radio brevior eft, in fæcica vero calyx longitudinem radii æquat.

2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris acuminatis ftrictis, pedunculis fuperne incraffatis.

Tragopogon purpureo-cæruleum, porri folio, quod Artifi vulgo. *Bauh. pin.* 274. *Morif. hift.* 3. p. 80. f. 7. t. 9. f. 5.

Tragopogon alterum feu *Barba hirci*. *Dalech. hift.* 1079.

Habitat - - - -

Hospitatur sub dio, biennis.

Obf. Flos expanditur primo mane hora III, clauditur vero hora IX, uti præcedens.

3. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris, feminibus lævibus: difci papposis; radii calyculatis.

Tragopogon gramineis foliis hirsutis. *Bauh. pin.* 275.

Tragopogon alterum, gramineo folio, flore fvaaverubente. *Col. ecphr.* 1. p. 232. t. 231.

Habitat in Italia.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix annua. Caulis brevis, ramis divaricatus. Folia glabra, graminea. Pedunculi fuperne vix manifefte incraffati. Calyx flore duplo longior, corolla purpurea. Abfolute florescentia Calyx non contrahitur, ut in præcedentibus, fed rectus latus patulus perfiftit. Semina omnia lævia non punctato-scabra; femina radii fubulata, terminata calyculo ex fetis 4 vel 5 inæqualibus fubulatis patulis; femina difci

244 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

apice articulata terminata pappo. Hinc manifeste diversa a præcedentibus. Discus paleis instructus. An hybrida planta e Tragopogone purpureo & Rhagadiolo?

NB. Ex caractere est omnino Lapsana, ex planta vero Tragopogon!

4. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus intermixtis (foliis lyrato-sinuatis). *Hort. cliff.* 382.

Hieracium magnum. *Dalech. hist.* 569. male.

Chondrilla foliis cichorei tomentosis. *Bauh. pin.* 130.

Chondrilla prior. *Dod. pempt.* 637. *Clus. hist.* 2. p. 143.

Habitat in Hispania.

Hospitatur in Frigidario, perennis.

SCOLYMUS.

1. SCOLYMUS annuus.

Scolymus. *Hort. cliff.* 388.

Scolymus Chrysanthemus annuus. *Vaill. act.* 1721. p. 286.

Scolymus theophrasti narbonensis. *Clus. hist.* 2. p. 153.

Habitat in Gallia Narbonensi.

Hospitatur sub dio, semina non maturans, annua.

SONCHUS.

1. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis, floribus corymbofo-distantibus.

Sonchus caule erecto, foliis pinnato hastatis apiceque hastatis, floribus congestis villosis. *Hort. cliff.* 385.

Sonchus tricubitalis, folio cuspidato. *Raj. syn.* 3. p. 163.

Sonchus asper arborescens. *Bauh. pin.* 124.

Sonchus lævior austriacus 5 altissimus. *Clus. hist.* 2. p. 147.

Habitat in paludibus graminosis inter arundines Belgii, Angliæ, Galliæ, Hungariæ.

Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

2. SONCHUS pedunculis squamatis, foliis lanceolatis indivisis sessilibus.

Lactuca falicis folio ferrato, flore cæruleo. *Amm. rhut.* 150. n. 212.

Lactuca falicis folio, flore cæruleo. *Amm. rhut.* 150. n. 211.

Habitat in Sibiria.

Hospitatur sub dio, cicur, perennis.

Obs. Cum pappus sit sessilis, Lactuca esse nequit.

L A P S A N A.

1. LAPSANA calycibus fructus undique radiis subulatis patentibus, foliis lyratis.

Rhagadiolus lapsanæ foliis. *Tournef. cor.* 36.

Habitat in Oriente.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix annua. Caulis sesquipedalis, crassitie pennæ anserinæ. Folia tam radicalia quam caulina lyrata, obtusa, lævia, caulina tamen acutiora: Calyx calyculatus, basi squamis minutissimis, corpore 5 vel 6 foliolis parallelis angulatis lævibus constante. Corollulæ quinque, dentatæ; panicula divaricata. Fructus radii teretes, glabri; Flores primarii subsessiles.

2. LAPSANA calycibus fructus undique radiis subulatis patentibus, foliis lanceolatis indivisis.

Rhagadiolus alter. *Cæsalp. syst.* 5:1.

Hieracium filiqua falcata. *Bauh. pin.* 128.

Hieracium stellatum. *Bauh. hist.* 2. p. 1014.

Habitat Monspeli, Bononiæ.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix annua. Caules plures semipedales tantum, filiformes, ramosi. Flores tantum primarii petiolati. Calyces calyculati, foliolis 8 parallelis angulatis: carina ciliata. Fructus radiis patulis subulatis, sed extus s. carina hispida. Folia radicalia lanceolata, integra, ut & caulina pauciora minora. Semina solitaria, nuda, latent intra singula cornicula.

3. LAPSANA calycibus pyramidatis, seminibus papposis, foliis oblongis subdentatis scabris.

Chondrilla, hieracii folio, annua. *Tournef. inst.* 457.

Vaill. parif. 36.

Hieracioides annua glutinosa, floribus parvis. *Vaill. aët.* 1721.

Hieracium montanum alterum leptomacrocaulon. *Col. ecphr.* 1. p. 248. t. 249.

Hieracium annum montanum fruticosius, caule canaliculato. *Morif. hist.* 2. p. 68. f. 7. t. 5. f. 37.

Habitat in sepibus Galliæ, Italiæ.

Hospitatur sub dio, cieur, annua.

Desc. Radix annua. Planta pedalis ramosissima, subnuda, glabra, erecta. Folia radicalia & ad radicem lanceolato-cuneiformia, scabra, vix manifeste dentata. Caules fere juncei, glanci, ad ramificationes folio minimo acuminato. Calyx glaber, calyculatus, ad basin foliolis 5 minutissimis; at corpus pyramidatum ex 18 circiter foliolis carinatis glaberrimis. Calyx maturo fructu horizontaliter dehiscens. Semina 9, subfiliformia, calyce dimidio breviora, distantia, coronata pappo simplici calyces æquanti. Paleæ nullæ.

4. LAPSANA capitulis fructus subglobosis glabris, seminibus disci calyculato-papposis.

Lapsana calycibus fructus capitatis dehiscentibus, pedunculis incrassatis, floribus nutantibus. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 131.

Rhagadioloides calthæ folio, calyce glabro. *Vaill. act.* 1721. p. 202.

Hedypnois annua. *Tournef. inst.* 478.

Habitat in Europa australi.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix annua. Caules infirmi, glabri, parum ramosi, ramis longis. Folia oblonga, dentata, parum pilosa, basi angustiora amplexicaulia; summa vero foliola integerrima. Pedunculi sursum ampliores. Fructus globosus ex squamis incurvis teretibus acutis conniventibus glabris semper; hinc calyx calyculatus est minimis foliolis. Semina disci coronata calyculo setaceo, radii vero margine.

5. LAPSANA capitulis fructus globosis pilosis, seminibus disci calyculato-papposis.

Habitat in Europa australi.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Radix annua. Folia amplexicaulia, oblonga, uti in antecedenti & sequenti, sed magis pallida, minus pilosa. Calyces subglobosi, seq. apice truncati ex squamis incurvis sepe obliquis, semper undique villosis & mollibus, quæ nota ab antecedenti & sequenti differt.

6. LAPSANA capitulis fructus ovatis scabris, seminibus disci calyculato-papposis.

Hedypnois cretica minor annua. *Tournef. cor.* 36.

Habitat in Creta.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Radix annua. Caulis & planta magis vivescens, alta & glabra. Fructus magis ovatus & folia calycina extus, præsertim versus apices, serrato-denticulata, in pilis desinentibus serraturis; hinc scabra; hæc foliola lateribus non sunt hirsuta. Conveniunt 4, 5, 6, seminibus incurvis exterioribus nudis, margine coronatis, disci vero coronatis calyculo pappiformi. Flores ante explicationem nutantes, fructus vero maturus depressus. Pedunculus fructus inflatus superne amplior. Calyx calyculatus.

*. LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Hort. cliff.* 389. *Fl. svec.* 649.

Lapsana folio amplissimo crispo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 93.

Habitat in Europa.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Nil differt a naturali planta, nisi uti Malva, Apium, Lactuca, Brassica, Endivia, Nasturtium, Asplenium, Rumex, Tanacetum, Lapsana, Cardiacæ Crispæ a suis simplicibus plantis; quemadmodum flores petalis multiplici-

cantum

cantur & pleni evadunt, sic etiam folia margine multiplicantur & crispa fiunt,

C I C H O R I U M.

1. CICHORIUM caule simplici, foliis integris crenatis. *Hort. cliff.* 389.

Cichorium latifolium seu Endivia vulgaris. *Baub. pin.* 125.

Intubum sativum. *Dod. pempt.* 634.

- β. Cichorium crispum. *Tournef. inst.* 479.

Endivia crispa. *Baub. pin.* 125.

Intubus crispa. *Cam. epit.* 283.

Pharm. ENDIVIÆ Herba, Syrupus, Aqua, Semina.
Svecis Endivia.

Habitat in *Europa*.

Hospitatur *sub dio*, biennis.

C A T A N A N C H E.

1. CATANANCHE squamis calycinis inferioribus lanceolatis. *Hort. cliff.* 390.

Catanance flore luteo, latiore folio. *Tournef. inst.* 478.

Chondrilla cyanoides lutea, coronopi folio non diviso.

Bocc. mus. 2. p. 21. t. 7.

Stoebe plantaginis folio. *Alp. exot.* 287. t. 286.

Habitat in *Creta*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

E L E P H A N T O P U S.

1. ELEPHANTOPUS foliis ovatis serratis. *Hort. cliff.* 390.

Elephantopus conyzæ folio. *Dill. elth.* 126. t. 106. f. 126.

Bidens frutescens, foliis oblongis utrinque acuminatis venosis & lanuginosis. *Breyn. ic.* 32. t. 24.

Scabiosæ affinis anomala sylvatica, enulæ folio. *Sloan. flor.* 127. *hist.* 1. p. 263. t. 156. f. 1. 2.

Echinophoræ indicæ affinis, femine & floribus in capitulis lævibus, in caulium cymis, *Pluk. alm.* 132. t. 388. f. 6.

Ana-schovadi. *Rheed. mal.* 10. p. 13. t. 7.

248 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

Habitat in *Malabar*a, *Jamaica*.

Hospitatur in *Caldario*, & *Tepidario*, perennis.

Obs. Corolla semper apud nos alba; planta nec villosa nec glabra; folia nec ovata, nec oblonga, sed medio modo se habentia.

ECHINOPS.

1. ECHINOPS floribus capitatis, calycibus unifloris.

Hort. cliff. 390.

Echinopus major. *Baub. hist.* 3. p. 69. *Tournef. inst.* 463.

Cardus sphærocephalus latifolius vulgaris. *Baub. pin.* 381.

Chalcejos. *Dalech. hist.* 1480.

Habitat in *Italia*.

Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

2. ECHINOPS caule subunifloro,

Echinopus minor. *Baub. hist.* 3. p. 72.

Cardus sphærocephalus cæruleus minor. *Baub. pin.* 381. *Magn. monsp.* 50.

Retro floribus cæruleis. *Lob. ic.* 2. p. 8.

Crocodylium monspeliensium. *Dalech. hist.* 1476.

- ? Echinopus græcus tenuissime divisus & lanuginosus, capite minori cæruleo. *Tournef. cor.* 34. an?

Habitat *Monspeli*i, *Narbonæ*, inque *Sibiria*, accepi e *Russia*.

Desc. Radix perennis. Folia pinnatifida, dentata, supra viridia, nitida, infra tomentosa, vasis nullo modo pilis patulis aut erectis instructa, sed æque tomentosa ac reliqua inferior superficies folii, multoque tenerius dissecta quam in præcedente specie. Caulis simplex, semipedalis, absque ramis, tomentosus, non striatus at exaratus purpureis striis, superne versus capitulum omnino nudus. Capitulum globosum, paulo minus quam præcedentis, foliolis calycinis magis subulatis glabris, minimeque, uti præcedentis, hispidis seu pilis adspersis.

SERRATULA.

1. SERRATULA foliis lanceolatis integris amplexicaulibus: ferraturis spinoso setaceis.

Habitat in *Sibiria*, *Helvetia*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Planta ita refert *Serratulam*, *Fl. suec.* 622. ut facile pro varietate habuerem, sed præcipue difert. 1. caule altiore & duplo crassiore magisque striato. 2. radice minus repente. 3. floribus quadruplo majoribus, sed omnibus partibus similibus, etiam calycis squamis dorso versus apicem purpureo carinatis. 4. corollulis erectis nec recurvatis & reflexis. 5. foliis margine integris æqualiter serratis, ferraturis ut in altera spinoso-setaceis, nec ullo modo dentatis aut sinuatis. 6. foliis semiamplexicaulibus, nec in petiolos desinentibus. Variat flore albo. *Burserus* hanc eandem in *Helvetia* repe-

reperit, & pro *Cirsio* singularibus capitulis parvis *Casp.* *Baub.* habuit.

* **SERRATULA** foliis pinnatifidis: lacinia terminali maxima. *Flor. svec.* 660.

β. *Serratula* foliis laciniatis, capitulis magnis lanuginosis. *Amm. rhut.* 136. n. 181.

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Differt β a *Svecica* caule magis ramoso altiore, Foliis majoribus magnitudine *Sambuci*, calycibus subrotundis subvillosis.

ONOPORDUM.

1. **ONOPORDUM** calycibus imbricatis.

Carduus tomentosus, acanthi folio, altissimus lusitanicus. *Tournef. inst.* 441.

Acanthium altissimum lusitanicum. *Morif. hist.* 3. p. 153.

Habitat in *Lusitania*.

Hospitatur sub dio, biennis.

Obs. Differt a vulgari. *Flor. svec.* 653. foliis magis tomentosis arvis, minus ramoso caule & Calycis squamis non squarrosis.

CARDUUS.

1. **CARDUUS** foliis sessilibus bifariam pinnatifidis: laciniiis alternis erectis, calycibus globosis.

Carduus foliis sinuatis decurrentibus: denticulis superficieque spinosis, calycibus lanigeris. *Roy. lugdb.* 133. *Guett. flor.* 2. p. 326.

Carduus capite rotundo tomentoso. *Baub. pin.* 382.

Carduus eriocephalos. *Dod pempt.* 723.

Carduus tomentosus Corona Fratrum herbariorum. *Lob. ic.* 2. t. 9.

Habitat in *Anglia*, *Gallia*, *Hispania*, *Lusitania*.

Hospitatur sub dio, biennis, cicur.

Obs. Caulis bipedalis, ramosus: Radix biennis, altero anno florens. Calyx magnitudine ovi, squamarum apicibus linearibus, horizontalibus, integris, lana intertextis. Folia pinnata denticulata, alternis dentibus erectis, alternis reflexis.

CARDUUS foliis semidecurrentibus duplicato pinnatifidis laciniiis alternis erectis, calycibus ovatis. *Carduus tomentosus pyrenaicus*, floribus purpureis glomeratis. *Tournef. inst.* 441. ? ex prioris generis semina quotannis in horto excrescit. Facies & folia exacte præcedentis, sed calyces quadruplo minores subfusi & folia semidecurrentia, quod in præcedenti non obtinet; vix tamen has duas pro specie distinctis haberem, antequam certius innotuerit num altera proveniat e seminibus radii aut disci, vel ex copula hybrida.

250 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

2. **CARDUUS** squamis calycinis margine apiceque spinosis. *Hort. cliff.* 393.

Carduus albis maculis notatus vulgaris. Baub. pin. 381.

Carduus leucographus. Dod. pempt. 722.

Silybum albis maculis notatum, flore purpureo. Vaill. act. 1718. p. 219.

Pharm. CARDUI MARIE Herba, Aqua, Semina.

Svecis Sempertin.

Habitat in *Angliæ, Galliæ, Italiæ* ruderatis & ageribus.

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur.

3. **CARDUUS** foliis amplexicaulibus angulis spinosis, floribus solitariis subsessilibus: foliolis aliquot obval-latis. *Hort. cliff.* 393.

Carduus albis maculis notatus exoticus. Baub. pin. 381.

Carduus lacteus syriacus. Cam. hort. 35. t. 10.

Polyacantha major, lanceolato folio, flore purpureo. Vaill. act. 1718. p. 199.

- β. **Cnicus** albis maculis notatus, flore albo. *Tournef. inst.* 450.

Habitat in *Creta & Hispania*,

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. *Radix fibrosa. Caulis bipedalis, parum ramosus. Folia inferiora obver-se ovata, sinuata angulis spinosis, superiora sinuato-dentata, dentibus alter-nis erectis, alternis reflexis validioribus. Folia 3 vel 4 calyces circumstant, longia, pinnato dentata, erectiuscula; vasa foliorum alba.*

4. **CARDUUS** foliis lanceolatis dentatis: margine spinulis inæqualibus ciliatis, caule lævi. *Hort. cliff.* 392.

Cirsium anglicum. Raj. hist. 306.

Cirsium anglicum, radice hellebori nigri modo fibro-sa, folio longo. Baub. hist. 3. p. 45.

Habitat in *Anglia, & Sibiria*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Obs. *Differt a Cirsio pratensi Fl. Svec. 657. Foliis omnibus integris, subtus albis, licet non niveis, margine magis inæqualiter serrato & ciliato. Caule altiore magis paniculato, pilis patentibus adperso.*

C N I C U S.

1. **CNICUS** caule diffuso, foliis dentato-sinuatis. *Hort. cliff.* 395.

Cnicus sylvestris hirsutus sive Carduus Benedictus. Baub. pin. 378.

Carduus Benedictus. Cam. epit. 562.

Pharm.

Pharm. CARDUI BENEDICTI Herba, Conserva,
Aqua, *Acetum*, Flores, Semina.

Habitat in Chio & Lemno.

Hospitatur sub dio, annua.

2. CNICUS foliis cordatis: petiolis crispis spinosis amplexicaulibus, floribus nutantibus.

Habitat in Sibiria.

Hospitatur sub dio, biennis forte.

Obs. Radix perennis sæpius. Folia cordata, Arctii, venosa, subtus subtomentosa, alba, denticulata, inermis spinulosa. Pedunculi alati, inferne amplexicaules latiores, spinis pungentibus dentati. Caulis humanæ altitudinis, striatus, cinereus striis concavis purpureis; superne paniculatus. Flores magni, nutantes. Calyx imbricatus, squamis reflexis infimis subulatis, summis membranaceo cochleatis; intermediis membranaceo cochleatis apice subulatis. Flosculi æquales lutei cum staminibus & pistillo longioribus.

CYNARA.

1. CYNARA foliis pinnatis: laciniis ferratis.

α. Cinara hortensis aculeata. *Baub. pin.* 383.

Scolymus dioscoridis. *Clus. hist.* 2. p. 153.

Svecis Kron - årtskåckor.

β. Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur. *Baub. pin.* 383.

Scolymus aculeatus. *Tabern. hist.* 1075.

Gallis Chardon.

Habitat in lætis agris Gallie Narbonensis, Italiae, Siciliae.

Hospitatur sub dio vel in Frigidario, perennis.

CARTHAMUS.

1. CARTHAMUS foliis ovatis integris serrato-aculeatis. *Hort. cliff.* 394.

Cnicus fativus five Carthamus afficinarum. *Baub. pin.* 378.

Cnicus vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 152.

Pharm. CARTAMI Flores, Semina.

Svecis Saffler.

Habitat in Ægypto, vix maturans Semina.

Hospitatur sub dio, absque potu, annua.

2. CARTHAMUS caule piloso superne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis: summis amplexicaulibus dentatis.

Carthamus foliis amplexicaulibus acuminato-dentatis. *Hort. cliff.* 394.

Atrac-

252 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

Atractylis lutea. Baub. pin. 379.

Atractylis theophrasti & dioscoridis, succo sanguineo.

Colum. ecphr. 1. p. 19. t. 23.

Atractylis. Dod. pempt. 736.

Habitat in Narbona, Italia, Creta.

Hospitatur sub dio, annua, florens, sed semina non perficiens.

C A R L I N A.

1. *CARLINA* caule unifloro. *Hort. cliff. 395.*

Carlina acaulos, magno flore albo. Baub. pin. 380.

Chamæleon albus. Clus. hist. 2. p. 155. Cam. epit. 428.

Pharm. CARLINÆ Radix.

Habitat in montosis Italiæ, Germaniæ.

Hospitatur sub dio, rarius & in Frigidario.

Obs. Si planta in olla confectim servetur caulis fit pedalis, at in aprico vix manifestus.

S A N T O L I N A.

1. *SANTOLINA* foliis quadrifariam dentatis, pedunculis unifloris. *Hort. cliff. 397.*

Abrotanum fæmina vulgare. Clus. hist. 1 p. 341.

Abrotanum fæmina, foliis teretibus. Baub. pin. 136.

ChamæCyparissus. Baub. hist. 3. p. 133.

Pharm. SANTOLINÆ Herba.

Habitat in salebrosis Galliæ Narbonensis, Hispaniæ, Hetruriæ.

Hospitatur in Frigidario, fruticulus.

2. *SANTOLINA* corymbo simplici, foliis trifidis. *Hort. cliff. 397.*

Coma aurea africana fruticans, foliis crithmi marini.

Comm. hort. 2. p. 99. t. 50.

Jacobæa æthiopica, foliis abrotani trifidis, summo caule capitulis parvis glomeratis. Pluk. alm. 194. t. 302. f. 7.

Habitat ad Caput bonæ spei.

Hospitatur in Tepidario, perennis.

C H R Y S O C O M A.

1. *CHRYSOCOMA* fruticosa, foliis linearibus dorso decurrentibus. *Hort. cliff. 397.*

Coma aurea africana fruticans, foliis liniariæ angustis, major. Comm. hort. 2. p. 89. t. 45.

Cony-

SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS. 253

Conyza æthiopica, flore bullato aureo, pinastri brevioribus foliis læte viridibus. *Pluk. alm.* 400. t. 327. f. 2.

Habitat ad Caput bonæ spei.

Hospitatur in Tepidario, suffrutex.

AGERATUM.

1. *AGERATUM*. *Hort. cliff.* 396.

Carelia americana, lamii folio. *Pont. diff.* 184.

Eupatorium humile africanum, senecionis facie, folio lamii. *Herm. parad.* 161. t. 161.

Conyza americana, lamii folio, flore albo. *Tournef. inst.* 455.

Habitat in America.

Hospitatur in Caldario, annua, cicur.

EUPATORIUM.

1. *EUPATORIUM* caule volubili, foliis cordatis dentatis acutis. *Hort. cliff.* 396. *Gron. virg.* 93.

Eupatorium americanum scandens, hastato magis acuminato folio. *Vaill. act.* 1719. p. 401.

Clematitis novum genus, cucumeris folio, virginianum. *Pluk. alm.* 109. t. 163. f. 3.

Habitat in aquosis Virginia.

Hospitatur sub dio, & in Frigidario, perennis.

Obs. Flosculi huic 4 intra calycem communem.

2. *EUPATORIUM* foliis lanceolatis nervosis: inferioribus extimo subserratis, caule suffruticoso.

Eupatorium virginianum, longissimis & angustissimis foliis. *Moris. hist.* 3. p. 97. *Raj. suppl.* 187.

Habitat in Pennsylvania, Pastor Dylander misit.

Hospitatur sub dio, & in Frigidario, perennis.

Desc. Radix perennis. Caules erecti humanæ altitudinis, sublignosi (sed pereunt quotannis), teretes, purpurascens. Folia lanceolata, internodiis triplo longiora, subtus venosa, trinervia, versus apicem subdentata. Corymbus florum albus folis antheris fusco purpurascens. In hac specie flosculi in singulo flore 5, ut in *Eupatorio Flor. svec.* 65, non corollis in incarnatis uti in *svecica*, sed albis, antheris subviolaceis.

3. *EUPATORIUM* foliis connatis tomentosis. *Hort. cliff.* 396. *Gron. virg.* 177.

Eupatorium virginianum, salviæ foliis longissimis acuminatis, perfoliatum. *Pluk. alm.* 140. t. 87. f. 6. bona.

Eupa-

254 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

Eupatorium virginianum, mucronatis rugosis & longissimis foliis, perfoliatum. *Morif. hist.* 3. p. 97.

Habitat in *Virginia* aquosis.

Hospitatur in *Frigidario*, & sub dio.

Obs. Flosculi in singulo flore 15 saepius, albi antheris purpurascens.

4. EUPATORIUM foliis sessilibus amplexicaulibus distinctis lanceolatis.

Eupatorium virginianum, flore albo, folio menthae angustioribus sessilibus minutim dentatis. *Morif. hist.*

3. p. 98. n. 13. *Raj. suppl.* 188.

Habitat in *Virginia*. *Clayt.* 820.

Hospitatur sub dio, & in *Frigidario*.

Obsc. Flosculi in singulo flore 5, albi antheris subviolaceis.

5. EUPATORIUM foliis ovatis serratis petiolatis, caule glabro.

Eupatorium caule erecto, foliis cordatis serratis. *Hort. cliff.* 396. *Gron. virg.* 93.

Eupatorium scrophulariae foliis glabris, flore albo. *Morif. hist.* 3. p. 98. f. 7. t. 18. f. 11.

Valeriana urticae folio, flore albo. *Corn. canad.* 20. t. 21.

Habitat in *Canada*, *Virginia*.

Hospitatur sub dio, in *Frigidario*.

Obs. Flosculi albi una cum antheris, numero viginti.

K L E I N I A.

1. KLEINIA caule herbaceo, foliis hastato-sagittatis denticulatis, petiolis superne dilatatis.

Porophyllum foliis deltoidibus angulatis. *Gron. virg.* 94.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Frigidario* & *Tepidario*, perennis.

Desc. Radix perennis. Caulis humanae altitudinis, striatus, annuus, simplicissimus. Folia sagittata, interdum parum hastata, longa, glabra, venosa, margine denticulata seu serrata, petiolis superne latiora seu folia per petiolos decurrentia, subtus glabra, non glauca. Corymbus ramos terminans floribus albis. Ex America plantam habemus, cujus folia in petiolum desinunt magis hastata. Planta sicca suavissime olet. In hac specie Calyx cingitur involucri seu foliolis 4, 5, vel 6 linearibus, patulis. Corollulae nigrae, antherae flavae, Styli bifidi, incarnati, obtusi, canaliculati.

T A N A C E T U M.

*. TANACETUM foliis pinnatis: foliolis pinnatifidis incisissimis serratis. *Hort. cliff.* 398. *Fl. suec.* 666.

β. Tanacetum foliis crispis. *Bauh. pin.* 132.

Tanacetum crispum. *Dod. pempt.* 36.

Pharm.

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 255

Pharm. TANACETI Herba, *Aqua*, *Oleum*.

- γ. Tanacetum foliis vulgaris Tanaceti minoribus & tenuioribus, grati odoris. *Amm. rhut.* 147. p. 205.

Habitat in *Europa* et in *Sibiria*.

Hospitatur *sub dio*, perennis, cicur.

2. TANACETUM foliis ovatis integris ferratis. *Hort. cliff.* 398.

Mentha hortensis corymbifera. *Baub. pin.* 226.

Balsamita major. *Dod. pempt.* 295.

Pharm. BALSAMITÆ Herba,

Svecis Svånsk Salvia.

Habitat in squalidis *Narbonæ* & *Hetruriae*.

Hospitatur *sub dio*, perennis, cicur.

B I D E N S.

1. BIDENS corona feminum retrorsum aculeata, seminibus undique patentibus. *Hort. cliff.* 399.

Bidens latifolia hirsutior, semine angustiore radiato.

Dill. elth. 51. t. 3. f. 51.

Habitat in *America*.

Hospitatur in *Tepidario*, & *Caldario*, annua.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

X E R A N T H E M U M.

1. XERANTHEMUM receptaculis paleaceis feminum pappo quinque-seto. *Hort. cliff.* 400.

Jacea oleæ folio, capitulis simplicibus. *Baub. pin.* 272.

Ptarmica austriaca. *Clus. hist.* 2. p. 11.

Habitat in campis aridis marginibusque agrorum *Vienna*, *Florentii*, *Monspeli*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

G N A P H A L I U M.

1. GNAPHALIUM foliis lineari-lanceolatis acuminatis alternis, caule superne ramoso, corymbis fastigiatis. *Hort. cliff.* 401.

Gnaphalium latifolium americanum. *Baub. pin.* 263.

Gnaphalium americanum. *Clus. hist.* 1. p. 327.

Svecis

256 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

Svecis Pårlegrås.

Habitat in *America* septentrionali.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

2. GNAPHALIUM foliis amplexicaulibus integerri-
mis acutis subtus tomentosis, caule ramoso. *Hort.*
cliff 402.

Elichrysum africanum latifolium foetidum, capitulo
argenteo. *Comm. hort.* 2. p. 111. t. 56.

Conyza africana graveolens, capitulis argenteis. *Pluk.*
alm 117. t. 243. f. 1.

Habitat in *Aethiopia*.

Hospitatur in *Frigidario*, biennis.

3. GNAPHALIUM foliis confertis angusto lanceolatis,
caule fruticoso, corymbo composito. *Hort. cliff.* 402.

Elichrysum orientale. *Bauh. pin.* 264. *prodr.* 123.

Elichrysum africanum frutescens, angustis & longio-
ribus foliis incanis. *Comm. hort.* 2. p. 109. t. 55.

Habitat in *Africa*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

4. GNAPHALIUM foliis linearibus, caule fruticoso
ramoso, corymbo composito terminali. *Hort. cliff.* 401.

Elichrysum sylvestre angustifolium, capitulis conglo-
batis. *Bauh. pin.* 264.

Stœchas citrina. *Dod. pempt.* 268. *Dalech. hist.* 779.

Habitat in *Gallia Narbonensi*, *Hispania* & *Tunis*.

Hospitatur in *Frigidario*, suffrutex.

A R T E M I S I A.

1. ARTEMISIA foliis lanceolato linearibus alternis in-
tegerrimis. *Hort. cliff.* 403.

Absointhium edule, lini folio viridi. *Vaill. act.* 1719.
p. 374.

Abrotanum lini folio acriori & odorato. *Tournef. inst.*
459.

Dracunculus hortensis. *Bauh. pin.* 98.

Draco herba. *Dod. pempt.* 709.

Svecis Dragon.

Habitat in *Tataria* & *Sibiria*, *Adieles* & deserta *Casacorum* & *Donnensium*.

Hospitatur *sub dio*, locis succulentis, perennis.

2. ARTE--

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 257

2. ARTEMISIA foliis ramosisimis setaceis, caule erecto. *Hort. cliff.* 403.

Abrotanum mas angustifolium majus. *Baub. pin.* 136.

Abrotanum mas. *Dod. pempt.* 21.

Pharm. ABROTANI Herba, Aqua, Cineres.

Svecis Abrodd.

Habitat in montibus apricis Cappadociae, Syriae, Galatiae.

Hospitatur sub dio, suffrutex.

3. ARTEMISIA foliis compositis multifidis (subtus tomentosis), floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. *Hort. cliff.* 404.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum. *Baub. pin.* 138.

Absinthium tenuifolium. *Dod. pempt.* 24.

Pharm. ABSINTHII PONTICI Herba, Conserva.

Svecis Romerik malört.

Habitat in incultis Thraciae, Mysiae, Pannoniae.

Hospitatur sub dio, semina non maturans, perennis.

4. ARTEMISIA foliis triplicato pinnatis utrinque glabris, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo glabro conico.

Absinthium, tanaceti folio, odoratissimum. *Amm. rhut.*

142. n 193. t. 23. mala.

Habitat in montosis Sibiriae.

Hospitatur sub dio, annua, humanae altitudinis, odore fragrantissimo suavi.

C O N Y Z A.

1. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymbofo. *Hort. cliff.* 404.

Conyza major vulgaris. *Baub. pin.* 265.

Conyza. *Cam. epit.* 612.

Baccharis monspeliensium. *Dalech. hist.* 917.

Habitat in Angliae, Germaniae, Belgii, Galliae liceiis.

Hospitatur sub dio, perennis.

Desc. Radix biennis. Caules pedales erecti, superne paniculati, purpurascētes villo albo. Folia ovato oblonga, in petiolos desinentia, rugosa, serrata, patentia, recurva. Rami recti; flores terminiales, recti, calyce squarroso.

C A R P E S I U M.

1. CARPESIMUM. *Act. upf.* 1741. p. 81.

Conyzoides flore flavescente cernuo. *Tournef. act.* 1706.

R

After

Aster cernuus. *Col. ecphr.* 1. p. 251. t. 252. *Raj. hist.* 338.
Aster atticus, foliis circa florem mollibus. *Baub. pin.*
 266.

Chrysanthemum asteris facie, foliis circa florem mollibus. *Herm. lugdb.* 144.

Chrysanthemum conyzoides cernuum, foliis circa florem mollibus. *Moris. hist.* 3. p. 18. f. 6. t. 5. f. 26.

Habitat in *Italia*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

Obs. Pedunculi apice incrassati; flos ante florescentiam inflexus cum rigiditate, calycis folia reflexa.

ERIGERON.

1. *ERIGERON* floribus panniculatis. *Hort. cliff.* 407.
Gron. virg. 96.

Conyzella. *Dill. gen.* 142. *giff.* 160.

Conyza canadensis annua acris alba, *linariæ folio.* *Bocc. sicc.* 85. t. 46.

Conyza annua acris alba elatior, *linariæ foliis.* *Moris. hist.* 3. p. 115. f. 11. t. 20. f. 29.

Virga aurea virginiana annua. *Zan. hist.* 205. *Tournef. inst.* 484.

Habitat in *Canada*, *Virginia*.

Hospitatur *sub dio*, annua, cicur luxurians.

2. *ERIGERON* pedunculis unifloris lateralibus, calycibus squarrosis.

Aster foliis ferratis, pedunculis simplicibus lateralibus unifloris longitudine folii, foliosis. *Hort. cliff.* 409.

Virga aurea major (& minor) foliis glutinosis & graveolentibus. *Tournef. inst.* 484. *Vaill. act.* 1720. p. 398.

Conyza mas theophrasti, *major dioscoridis.* *Baub. pin.* 265.

Conyza major. *Dod. pempt.* 51.

Habitat ad vias & agros *Italiæ*, *Hispaniæ*, *Narbonæ*.

Hospitatur in *Tepidario*, biennis.

Obs. Corollæ primum luteæ, dein purpurascens, calyces oblongi sunt.

3. *ERIGERON* foliis inferioribus dentato-laciniatis, superioribus integris. *Hort. cliff.* 407.

Senecio bonariensis purpurascens, foliis imis coronopi. *Dill. elth.* 344. t. 257. f. 334.

Habi-



Habitat in *America*.

Hospitatur ubique, nimis sese multiplicans, annua.

4. **ERIGERON** foliis lanceolato ovatis villosis ferraturis apice cartilagineis.

Baccharis foliis ovato-lanceolatis ferratis, caule herbaceo. *Gron. virg.* 96.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Caldario*, & *Tepidario*, annua.

Obs. *Herba odore camphorato suaveolens.*

T U S S I L A G O.

1. **TUSSILAGO** scapo unifloro, calyce clauso. *Tab.*

Anandria. Tursen. anand. 14. t. 1.

Habitat in succulentis umbrosis *Sibiriae*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obs. Descriptionem dedi in *diff. acad. de Anandria. Upsal.* 1745. 4to, cum figura; Planta sub dio profert caulem fere pedalem, capitulo sive Calyce globoso clauso, uti *Ficus*, in cujus fundo flosculi latitant, nec unquam expanditur Calyx, quemadmodum in plantæ figura majore videre est. At eadem planta loco aprico sicciori vel in olla asservata longe minor evadit, sed Folia promit subtus magis tomentosa & versus petiolum parum lyrata, tum etiam scapum minorem exserit, vix digiti longitudinem excedentem, plane nudum, cum Calyce cylindrico: squamis lanceolatis, subcarinatis, apice purpureis, cujus Corolla est expansa facie *Bellidis*, ex Radio longitudine calycis albo: flosculis Femineis linearibus trifidis vel sæpe quadripartitis ad basin, laciniis linearibus aequalibus, stigmate simplici. Discus parvus ex corollulis campanulatis albis quinquefidis acutis recurvis. Antheræ albido flavescentes brevissimæ. Stylus flore longiur: stigmate obtuso bifido uti in figura minore delineatur, qualem plantam etiam inter siccas e *Sibiria* allatas a *Clariss. D. Gmelino* vidi.

S O L I D A G O.

1. **SOLIDAGO** paniculato-corymbosa, racemis reflexis, floribus confertis adscendentibus. (*Hort. cliff.* 409. *Gron. virg.* 97.) foliis trinerviis subseriato scabris.

Virga aurea angustifolia, panicula speciosa, canadensis. *Pluk. alm.* 387. t. 235, f. 2.

Habitat in *Virginia*, *Canada*.

Hospitatur sub dio, omnes hyemes spernens, perennis.

2. **SOLIDAGO** paniculato-corymbosa, racemis reflexis, floribus adscendentibus, foliis enerviis integerimis.

Virga aurea altissima serotina, panicula speciosa patula.

Martyn. hist. 14. t. 14.

Habitat in *Malandia*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Obi. *Præcedenti valde affinis a qua differt: 1. Foliis crassioribus, margine vix vel parum scabris, superficie vix manifeste trinervi. 2. Caule duplo altiore, seu quadrupedali. 3. Tempore florendi seriore, scilicet octobri.*

SENECIO.

1. **SENECIO** corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis ferratis glabriusculis.

Senecio foliis lanceolatis ferratis, floralibus pedunculosis æquantibus. Vir. cliff. 84. Roy. lugdb. 163.

Solidago caule simplici, corymbo terminatrici, pedunculis partialibus alternis nudis longitudine foliis Hort. cliff. 410.

Solidago faracenea. Fuchs. hist. 728.

Virga aurea angustifolia ferrata. Bauh. pin. 268.

Consolida aurea. Tabern. hist. 946.

Habitat in sylvis montanis *Helvetiæ*.

Hospitatur *sub dio*, luxurians, perennis.

2. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis pinnatifidis æqualibus patentissimis rachi inferne angustata. *Hort. cliff. 406.*

Jacobæa africana frutescens, flore amplo purpureo elegantissimo, senecionis folio. Volk. norib. 225 t. 225.

Aster africanus frutescens, foliis senecionis crassioribus. Comm. hort. 2. p. 61. t. 31.

Habitat ad *Caput bonæ spei*.

Hospitatur in *Tepidario*, & *Caldario*, raro semina maturans, annua apud nos.

3. **SENECIO** corollis radiantibus planis calyce longioribus integris, foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis distantibus.

Jacobæa laciniatis foliis, tanaceti odore. Dill. m. s. s.

Habitat in australibus *Europæ*?

Hospitatur *sub dio*, annua.

4. **SENECIO** corollis revolutis, foliis amplexicaulibus

bus apice trilobis, squamis calycinis sphacelatis laceris.

Jacobæa hispanica, senecionis folio, flore amplo. *Juss.*
m. f. f.

Habitat in *Hispania*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Desc. Radix fibrosa. Caulis spithameus, erectus, crassus firmus angulatus, villosus. Folia amplexicauli-oblonga crassa inciso-serrata apice triloba, subvillosa. Rami ex summis alis parvi. Corymbi arcti terminant caulem ramosque. Calycis foliola apice nigra, & ejus squamæ ad basin brevissimæ laceræ apicibus nigris, hinc quasi nigro ciliatæ. Calyces crassi breves ovati. Pedunculi lanati.

7. SENECIO corollis revolutis, foliis sessilibus sinuatis, calycibus conicis: squamis minimis intactis.

Jacobæa ægyptiaca, senecionis folio, semiflosculis vix conspicuis. *Vaill. act. 1720. p. 298.*

Habitat in *Ægypto*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. Facies *Senecionis vulgaris*. Fl. *svec. 690.* sed folia minus divisa. Pedunculi longi nudi trifidi. unica vel altera tantum squama notati. Calyces conici striati non sphacelati; basi subtus squamis aliquot non sphacelatis.

5. SENECIO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus sinuatis, squamis calycinis brevibus integris sphacelatis

Jacobæa ægyptiaca, senecionis folio, flore minore. *Vaill. act. 1720. p. 298.*

Habitat in *Ægypto*,

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. Facies *senecionis vulgaris* Fl. *svec. 690.* sed folia minus divisa. Pedunculi nudi biflori squama una alterave notati. Calycis folia apice sphacelata, & squamæ basin cingentes simplicissimæ sphacelata.

7. SENECIO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, squamis calycinis brevissimis intactis.

Iacobæa hispanica minor, petalis brevissimis. *Dill. m. f. f.*

Habitat in *Hispania*.

Hospitatur *sub dio*, cicur, annua.

Obs. Variat sæpe foliis subtus incarnato-glaucis. Folia cordato-lanceolata. Calyces apice colorati, sed squamæ basin cingentes setaceæ non sphacelatae sunt. Calyx pulchre striatus, & parum viscidus, non vero reliqua plantæ pars.

8. SENECIO corollis nudis, foliis amplexicaulibus laceris, caule herbaceo erecto.

Senecio foliis lanceolatis amplexicaulibus lævibus acu-

te sinuatis denticulatis, caule herbaceo. *Hort. cliff.* 406.

Senecio americanus altissimus, blattariæ vel hieracii folio. *Pluk. alm.* 343. t. 226. f. 2.

Senecio africanus altissimus, blattariæ vel hieracii folio. *Herm. parad.* 226. t. 226.

Habitat in America septentrionali.

Hospitatur in ollis, annua †.

A S T E R.

1. ASTER foliis lanceolatis: lateribus inferiorum crenatis, radice annua, caule corymbofo, pedunculis nudis. *Hort. cliff.* 409.

Aster annuus ramosus albus latifolius canadensis. *Morif. hist.* 3. p. 122.

Bellis ramosa umbellifera. *Corn. canad.* 193. t. 194.

Habitat in Canada.

Hospitatur sub dio, cicur, annua.

Obs. Radix annua. Caulis angulatus, piloso-scaber, superne corymbosus; Calyces hæmisphærici cum disco globosi pillosi, nec calycis squamæ patentibus sunt.

2. ASTER foliis lanceolato-linearibus medio ferratis, pedunculis foliosis, caule racemoso, radice perenni. *Hort. cliff.* 408.

Aster serotinus procerior ramosus, bellidis sylvestris flore. *Tournef. inst.* 482.

Aster virginianus ramosissimus serotinus, parvis floribus albis tradescanti. *Morif. hist.* 3. p. 121.

Habitat in Virginia.

Hospitatur sub dio, luxuriat, non semina perficit, perennis.

Obs. Radix vivax. Caulis lævis. Folia lanceolata, lævia, pleraque integerrima.

3. ASTER foliis lanceolatis subserratis sessilibus, caulis paniculato, ramulis unifloris solitariis. *Hort. cliff.* 408.

Aster novæ belgiæ latifolius umbellatus, floribus dilute violaceis. *Herm. lugdb.* 66. t. 67.

Habitat in Pennsylvania, Virginia.

Hospitatur sub dio, perennis.

Desc. Radix vivax. Caulis teres brevissimus. Folia lanceolata sessilia acumina, acute serrata sed serraturis raris. Flores paniculati, floribus solitariis, pedunculis foliolis linearibus adspersis.

4. ASTER foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis, calyce terminali folioso patente.

Aster

Aster, chenopodii folio, annus, flore ingenti specioso.

Dill elth. 38. t. 34. f. 38.

Habitat forte in *China*.

Hospitatur in *Caldario*, annua. varians radio albo & violaceo.

Observe in *Flora svecica* plantas 694, 695, 696 esse genuinas species
INULÆ, nec Asteris, cum in illis antheræ non modo non caudatæ sunt, sed
& corollulæ infundibuliformes, nec ut in Asteribus campanulatæ.

CHRYSANTHEMUM.

1. CHRYSANTHEMUM foliis pinnatifidis incisissimis extrorsum latioribus. *Hort. cliff. 416.*

Chrysanthemum foliis matricariæ. *Baub. pin. 134.*

Chrysanthemum creticum. *Clus. hist. 1. p. 334.*

β. Chrysanthemum creticum, flore polypetalo five pleno. *Tournef. inst. 491.*

γ. Chrysanthemum flore partim candido partim luteo.

Baub. pin. 134.

Habitat in *Creta*, *Sicilia*.

Hospitatur sub dio, annua.

MATRICARIA.

1. MATRICARIA foliis compositis planis, foliolis ovatis incisissimis, pedunculis ramosis. *Hort. cliff. 416.*

Matricaria vulgaris five sativa. *Baub. pin. 133.*

Matricaria. *Dod. pempt. 35.*

β. Matricaria vulgaris & sativa, florum petalis fistulosis brevioribus. *Boerb. lugdb. 1. p. 110.*

Matricaria foliis florum fistulosis. *Tournef. inst. 493.*

Pharm. MATRICARIÆ Herba, ∇, ʒss; Flores.

Svecis Matram.

Habitat in ruderalibus sepibus & agris *Europæ australioris*.

Hospitatur sub dio, annua cicur.

Obs. In hac specie observatur floris plenitudo corollulis albis fistulosis elongatis, ut in *Tagete* & *Bellide*. Datur & varietas simplex radio omni destituta.

BUPHTHALMUM.

1. BUPHTHALMUM caulibus simplicissimis unifloris, foliis pinnato-multifidis. *Hort. cliff. 414.*

Bupthalmum creticum, cotulæ facie, flore luteo & albo. *Breyn. cent. 150. t. 75.*

Chamæmelum specioso flore, radice longa fervida.

Shaw. afric. 138.

Pyretrum flore bellidis. *Baub. pin.* 148.

Pyretrum officinarum. Salivaris. *Lob. ic.* 774.

Pharm. PYRETRI VERI Radix, *Condit.*

Habitat in *Arabia*, *Syria*, *Creta*, *Aprutio*, *Jenæ*.

Hospitatur *sub dio*, & in *Frigidario*, perennis.

2. BUPHTHALMUM caule decomposito, calycibus ramiferis. *Hort. cliff.* 413. t. 24.

Astericus annuus trianthophorus, Craffas arabibus dictus. *Shav. afric.* 58. t. 36. f. 58.

Habitat in *Arabia*.

Hospitatur in *Vaporario*, non semper semina perficiens, annua.

3. BUPHTHALMUM foliis lanceolatis subdenticulatis glabris, calycibus nudis. *Hort. cliff.* 415. n. 7.

Asteroides alpina, salicis folio. *Tournef. cor.* 4.

Aster luteus angustifolius. *Baub. pin.* 266.

Habitat in variis Alpibus *Austriae*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

4. BUPHTHALMUM calycibus obtuse foliosis sessilibus in alis ramorum, foliis oblongis obtusis. *Hort. cliff.* 414. n. 8.

Asteriscus aquaticus annuus patulus. *Tournef. inst.* 498.

Chrysanthemum conyzoides lusitanicum. *Breyn. cent.*

157. t. 77.

Habitat in *Lusitania*, *Creta*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

5. BUPHTHALMUM calycibus obtuse foliosis pedunculatis, ramis alternis, foliis cuneiformibus concavis. *Hort. cliff.* 414. n. 9.

Asteriscus maritimus perennis patulus. *Tournef. inst.* 498.

Aster supinus lignosus ficulus, conyzæ odore. *Bocc.*

mus. 2. p. 161. t. 129.

Habitat in *Sicilia*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis.

Obs. Folia radicalia magna, ramosa, obverse - ovata, crassa obtusa concava, respectu caulis maxima.

6. BUPHTHALMUM calycibus foliosis, foliis lanceolato-ovatis serratis trinerviis: basi hinc angustioribus. Helianthus foliis ovatis acuminatis serratis, pedunculis longissimis. *Gron. virg.* 179.

Chrysanthemum, scrophulariæ folio, americanum. *Pluk. alm.* 99. t. 22. f. 1.

Chry-

Chrysanthemum canadense elatius, virgæ aureæ vel scrophulariæ foliis. *Tournef. schol.* 199.

Corona folis altissima, virgæ aureæ foliis. *Tournef. inst.* 490.

Chrysanthemum virginianum, foliis glabris scrophulariæ vulgaris æmulis. *Morishist.* 3. p. 24. n. 73. *Raj. suppl.* 211.

Habitat in *Virginia*, *Canada*.

Hospitatur sub dio, perennis.

Obf. Radix vivax. Caulis teres, 4 à 5 pedum erectus lævis, ad genicula latior. Folia ovata acuminata trinervia lævia, convexa venosa, serrata petiolata, opposita, basi per petiolum proprium decurrentia sed altero latere latius. Rami ex alis oppositi, inter quos pedunculus longus lævis uniflorus. Calyx foliatus foliolis obtusis. Radius floris latus apice obtuse tridentatus hermaphroditus.

ACHILLEA.

*. *ACHILLEA* foliis acutis integris minutissime serratis. *Hort. cliff.* 412. *Flor. svec.* 706.

β. *Dracunculus pratensis*, flore pleno. *Baub. pin.* 98.

Ptarmica vulgaris, pleno flore. *Clus. hist.* 2. p. 12.

Svecis Pytter.

Habitat in *Europa*.

Hospitatur sub dio, perennis, cicur.

2. *ACHILLEA* foliis lanceolatis obtusis acute serratis. *Hort. cliff.* 413.

Ageratum foliis serratis. *Baub. pin.* 221.

Ageratum septentrionalium. *Lob. ic.* 489.

Pharm. AGERATI Herba.

Habitat circa *Monspeliū*, *Florentiam*, *Liburū*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

3. *ACHILLEA* foliis linearibus pinnatifidis pubescentibus: foliolis tripartitis transversalibus media longiore. *Hort. cliff.* 413.

Millefolium tomentosum luteum. *Baub. pin.* 140.

Stratiotes millefolia, flavo flore. *Clus. hist.* 1. p. 330.

Habitat in *Gallia Narbonensi* & *Tataria oroburgensi*, insulaque *Wolgæ*.

Hospitatur sub dio, & in *Frigidario* perennis.

BELLIS.

*. *BELLIS* scapo nudo unifloro. *Hort. cliff.* 418. *Fl. svec.* 707.

β. *Bellis hortensis*, flore pleno eoque magno vel parvo.

Baub. pin. 261.

R 5

Bellis

Bellis hortensis, multiplici flore seu Bellides Consolidae minores & mediae, tragi Primula veris. *Lob. ic.* 476.

2. Bellis hortensis rubra, flore multiplici fistuloso. *Tournef. inst.* 491.

Svecis Tusend-skion.

Habitat in *Europa*.

Hospitatur sub dio, in & *Frigidario*, frutex.

C O T U L A.

1. COTULA receptaculis fructificationum subtus inflatis turbinatis. *Hort. cliff.* 417.

Cotula africana, calyce eleganti caesio. *Tournef. inst.* 495.

Chamæmelum æthiopicum lanuginosum. *Breyn. cent.* 148. t. 73.

Habitat in *Æthiopia*.

Hospitatur sub dio, annua.

2. COTULA foliis lanceolato linearibus pinnatifidis amplexicaulibus. *Moehr. E. N. C.* 1742. vol. 6. p. 298.

Ananthocyclus coronopi folio. *Dill. elth.* 27. t. 23. f. 26.

Chrysanthemum exoticum minus, capite aphylo, chamæmeli nudi facie. *Breyn. cent.* 156. t. 76.

Habitat in *Æthiopia*, nunc in *Frisia*, ubi aquæ per hyemem stagnarunt.

Hospitatur sub dio, annua.

H E L E N I A.

1. HELENIA foliis decurrentibus. *Hort. cliff.* 418. *Gron. virg.* 101.

Heleniastrum folio longiore & angustiore. *Vail. act.* 1720. p. 406.

Chrysanthemum americanum perenne, caule alato, folio angusto glabro. *Morif. hist.* 3. p. 24. f. 6. t. 6. f. 74.

After floridanus aureus, caule alato: summa parte brachiato, petalorum apicibus profunde crenatis. *Pluk. amalth.* 43. t. 372. f. 4.

After luteus alatus. *Cornut. canad.* 62. t. 63.

Habitat in *Canada*, *Florida*.

Hospitatur sub dio, perennis.

V E R B E S I N A.

1. VERBESINA foliis decurrentibus undulatis obtusis.

Hort. cliff. 411.

Cannabina indica, foliis integris, alato caule. *Magn. hort.* 40. t. 40.

Chrysanthemum americanum, alato caule &c. *Comm. hort.* 1. p. 5. t. 3. *Herm. parad.* 125. t. 125. *Volk. norib.* 106. t. 106.

Habitat in *Curassao* aliisque Americis provinciis.

Hospitatur in *Caldario*, biennis, perennisque.

S I G E S B E C K I A.

1. SIGESBECKIA. *Hort. cliff.* 412. t. 23.

Bidenti similis, foliis latissimis serratis. *Buxb. cent.* 3. p. 29. t. 52.

Cichorio affinis *Lampfana sinica*, menthastri foliis, calyce fimbriato hispido. *Pluk. amalth.* 58. t. 380. f. 2.

Habitat juxta pagos *Chinae*, & *Medice*.

Hospitatur in *Caldario*, ubi nimis luxuriat & se ipsam ferit, annua.

Obs. Folia noctu reflectuntur petiolo tamen rigidiusculo facto, nec laxitate pendula. Calycis exterioris seu involucri folia patula, plana primo sunt, sed longitudinaliter reorquuntur ad latera, hinc teretia undiquaque & viscida visuntur. Totus Calyx hispidus est pilis patulis apice glandulosis. liquorem viscidum secernentibus; ex his motus seminum in manu dependet.

T A G E T E S.

1. TAGETES caule subdiviso diffuso. *Hort. cliff.* 418.

Tanacetum africanum seu Flos africanus minor. *Baub. pin.* 132.

Flos africanus. *Dod. pempt.* 255.

- β. Tagetes indicus minor, multiplicato flore. *Tournef. inst.* 488.

- γ. Tagetes minor, flore fulvo maculato. *Dill. elth.* 373. t. 279. f. 361.

Svecis Sammetsiosor.

Habitat in *Mexico*.

Hospitatur sub dio, annua.

2. TAGETES caule simplici erecto, pedunculis nudis unifloris. *Hort. cliff.* 418.

Tanacetum africanum majus, simplici flore. *Baub. pin.* 133.

Caryo-

268 SYNGENESIA POLYG. FRUSTRANEA.

- Caryophyllus indicus. *Cam epit.* 406.
 β. Tagetes indicus, flore simplici fistuloso. *Tournef. inst.* 488.
 Caryophyllus mexicanus, fistuloso flore, simplex. *Col. ecphr.* 2. p. 47. t. 46. f. 1.
 γ. Tagetes indicus, flore fistuloso duplicato. *Tournef. inst.* 488.
 Caryophyllus mexicanus alter polyanthos, fistuloso flore. *Col. ecphr.* 2. p. 48. t. 46.
 δ. Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato. *Baub. hist.* 3. p. 100.
 Othonna major polyanthos. *Lob. ic.* 713.
 Habitat in *Mexico*.
 Hospitatur *sub dio*, annua.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

HELIANTHUS.

1. HELIANTHUS radice annua. *Virid. cliff.* 88.
 Corona solis. *Tabern. ic.* 763.
 Helenium indicum maximum. *Baub. pin.* 276.
 Herba maxima. *Dod. pempt.* 264.
 Chrysis. *Reneal. spec.* 84. t. 83.
 β. Corona solis maxima, flore pleno aureo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 102.
Svecis Solblomma.
 Habitat in *Peru, Mexico*.
 Hospitatur *sub dio*, annua.
 2. HELIANTHUS radice tereti inflexa perenni. *Hort. cliff.* 419.
 Corona solis perennis & vulgaris. *Vaill. aët.* 1720. p. 432.
 Corona solis minor, foemina. *Tabern. ic.* 764.
 Helinium indicum ramosum. *Baub. pin.* 277.
 Habitat in *America*.
 Hospitatur in *Frigidario*, non nunquam tamen hyemes ferens *sub dio*, perennis.
 3. HELIANTHUS radice tuberosa. *Hort. cliff.* 419.
 Corona solis, parvo flore, tuberosa radice. *Tournef. inst.* 489.
 Hele-

Helenium indicum tuberosum. *Baub. pin.* 277.

Chrysanthemum latifolium brasilianum. *Baub. prodr.* 70.

Svecis Jord-årtskåcker.

Habitat in *Canada*.

Hospitatur *sub dio*, perennis, sed vix unquam heic floret.

R U D B E C K I A.

1. *RUDBECKIA* foliis compositis laciniatis. *Virid. cliff.* 88. *Gron. virg.* 180.

Rudbeckia foliis compositis. *Hort. cliff.* 420.

Obeliscotheca hydrophylli folio: lobis latioribus. *Vaill. act.* 1720. p. 426.

Chrysanthemum americanum perenne, foliis divisis dilutius virentibus, majus. *Morif. hist.* 3. p. 22. f. 6. t. 6. f. 53.

Aconitum helianthemum canadense. *Corn. canad.* 178. t. 179.

Habitat in *Canada* & *Virginia*.

Hospitatur *sub dio*, perennis, cicur.

2. *RUDBECKIA* foliis inferioribus trilobis: superioribus indivisis.

Rudbeckia foliis trilobis. *Gron. virg.* 180.

Obeliscotheca trifido folio. *Vaill. act.* 1720. p. 426.

Chrysanthemum cannabinum virginianum hirsutum disco magno: petalis aureis radiato. *Pluk. alm.* 100. t. 22. f. 2.

Chrysanthemum annuum majus virginianum, foliis laciniatis & hirsutis, umbone nigricante. *Morif. hist.* 3. p. 19. n. 37.

- β. *Rudbeckia* foliis lanceolato-ovatis alternis indivisis, petalis radii integris. *Gron. virg.* 181.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur *sub dio*, sed cum semina non maturet, perit biennis.

Desc. Radix biennis altero anno caulescens. Caulis hirsutus ramis alternis ramosissimis. Folia scabra serrata: infirma caulis triloba, reliqua ramorum & caulis superioris lanceolata sessilia. Flores numerosi terminales disco luteo sed ob paleas purpureo-fuscas obscuro; radius luteus. Dum flores erumpunt Folia triloba s. caulina marcescunt. altitudo pedis 1 vel 2.

C O R E O P S I S.

1. *COREOPSIS* foliis ternatis.

Rud-

270 SYNGENESIA POLYG. FRUSTRANEA.

Rudbeckia foliis compositis integris. *Roy. lugdb.* 181.

Ceratocephalus virginianus, tripteris foliis lævibus, flore luteo radiato, *Vaill. act.* 1720. p. 227.

Chrysanthemum virginianum, folio acutiore lævi trifoliato seu anagyridis folio. *Morif. hist.* 3. p. 21. f. 6. t. 3. f. 4. *Raj. suppl.* 215.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur sub dio, & in *Frigidario*, perennis.

Desc. Radix vivax. Caulis humanæ altitudinis lævis glaber articulatus. Folia opposita ternata glabra, foliolis lanceolatis sessilibus, introrsum angustioribus ad basim.

2. COREOPSIS foliis lanceolatis ferratis alternis petiolis decurrentibus, caule erecto.

Coreopsis foliis ferratis. *Roy. lugdb.* 181.

Corona solis altissima, caule alato. *Tournef. inst.* 462.

Ceratocephaloides altissima longifolia. *Vaill. act.* 1720. p. 328.

Chrysanthemum virginianum, alato caule, bidens altissimum, folio aspero, flore minore serotino. *Morif. hist.* 3. p. 25. f. 6. t. 7. f. 75. mala.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Frigidario*, & sub dio, perennis.

Obs. Flores conferti ad apicem caulis, radius quinqueslorus emarginatus.

C E N T A U R E A.

1. CENTAUREA calycibus ferratis, foliis lanceolatis integerrimis decurrentibus. *Hort cliff.* 422. n. 19.

Cyanus montanus latifolius, seu *Verbasculum cyanooides*. *Baub. pin.* 273.

Cyanus major. *Dod. pempt.* 251. *Lob. ic.* 548.

Habitat in Alpibus *Helveticis*.

Hospitatur sub dio, cicur, perennis

2. CENTAUREA calycibus ciliatis: ciliis setaceis reflexis. *Hort. cliff.* 422. n. 12.

Jacea latifolia, capite hirsuto. *Baub. pin.* 271.

Jacea cum squamis pinnatis seu capite villoso. *Baub. hist.* 3. p. 29.

Jacea 4. *austriaca*, villoso capite. *Clus. hist.* 2. p. 7.

Habitat in *Helvetia* & *Austria*.

Hospitatur sub dio, cicur, perennis.

3. CEN-

3. CENTAUREA calycibus ciliatis, foliis pinnatis glabris: foliolis lanceolatis integerrimis.

Jacea flore luteo, folio laciniato ferrato, calycis squamis obtusis. *Hall. gott.* 79.

Jacea laciniata, flore luteo magno, squamis calycum ciliaribus splendentibus. *Gerb. tanais.* 172.

Habitat in deserto ad Tanaim circa nova Pauloſka.

Hospitatur sub dio, perennis.

Desc. Caules bipedales duriusculi ramosi sulcati. Folia pinnata non decurrentia glabra, foliolis lineari-lanceolatis integerrimis acutis decurrentibus in petiolo: inferioribus minoribus: Calyces squamis ovatis membranaceis concavis ciliatis luteis. Corollæ luteæ.

4. CENTAUREA calycibus inermibus: squamis lineari-subulatis, foliis pinnatis ferratis. *Hort. cliff.* 420. n. 1.

Chondrilla foliis laciniatis ferratis, purpurascente flore. *Baub. pin.* 130.

Centaureum ciliare annuum, foliis laciniatis & ferratis. *Morif. hist.* 3. p. 131. f. 7. t. 25. f. 3.

Senecio-Carduus apulus. *Column. ecphr.* 1. p. 32. t. 34.

Crupina belgarum. *Rupp. jen.* 148.

Habitat in Hetruria & Gallia Narbonensis editioribus.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Semina in terra pulchre repunt ejusque rimas intrant.

5. CENTAUREA calycibus inermibus subrotundis glabris: squamis ovatis, foliis sinuatis. *Hort. cliff.* 421.

Cyanus floridus odoratus turcicus seu orientalis major, flore luteo. *Tournef. inst.* 441.

Cyanus orientalis major, foliis magis dissectis, flore luteo ex aleppo. *Morif. hist.* 3. p. 135. f. 7. t. 25. f. 9.

- β. Cyanus floridus odoratus turcicus, seu orientalis major, flore albo. *Tournef. inst.* 441.

- γ. Cyanus orientalis major moschatus, flore purpureo. *Morif. hist.* 3. p. 135. f. 7. t. 25. f. 5.

Amberboi flore purpureo odorato. *Vaill. act.* 1718. p. 230.

Habitat in arvis Constantinopolitanis inque deserto Nagaico Tataria.

Hospitatur sub dio, annua.

6. CENTAUREA calycibus squamosis, foliis tomentosis:

tofis : radicalibus lanceolatis ; caulinis pinnati-fidis ;
caule simplici. *Roy. lugdb.* 142.

Jacea montana incana, capite pini. *Baub. pin.* 272.

Jacea montana, capite magno strobili. *Baub. hist.* 3.
p. 30.

Chamæleon non aculeatus. *Lob. ic.* 7.

Habitat in saxosis glareosis *Monspelii*.

Hospitatur in variis locis ; vix unquam florens.

7. **CENTAUREA** calycibus palmato-spinosis : setis
æqualibus, foliis decurrentibus sinuatis spinulosis
Roy. lugdb. 141.

Jacea cyanoides altera, alato caule. *Herm. parad.* 189
t. 189. *

Jacea peregrina napifolia, echinatis capitulis, caule
alato. *Pluk. alm.* 192. t. 94. f. 2. *Moris. hist.* 3. p.
144. f. 7. t. 26. f. 20.

Carduus creticus, rapi folio. *Tournef. inst.* 442.

Habitat in *Creta*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Obs. Folia radicalia lyrata ovata dentata rugosa : Caulina lanceolata integerrima, decurrentia, margine per caulem hinc inde aculeato. Corollæ rubrae. Calyces nudi pectinati aculeis palmatis ex 7 dentibus subæqualibus. Capitula parva ovata.

8. **CENTAUREA** calycibus duplicato-spinosis lanatis
foliis semidecurrentibus integris sinuatisque.

Centaurea calycibus duplicato-spinosis, foliis decur-
rentibus integris. *Hort. cliff.* 423.

Carduus lusitanicus canescens, alato caule, capite
lanuginoso. *Tournef. inst.* 441.

Calcitrapa lutea, alato caule, capite eriophoro. *Vaill.*
act. 1718. p. 212.

Habitat in *Lusitania*.

Hospitatur *sub dio*, annua, rarius semina perficit.

Obs. Folia radicalia alternatim & extrorsum sinuata ; caulina decurrentia, sed non totaliter ad proximum folium in caule ; sæpe verò totaliter in ramis & altero marginè longius decurrit folium, altero brevius ; superiora folia integra. Calycis spinæ longitudine calycis, fuscae apice flavæ, basi utrinque spinulosæ ad latera & tela arenacea testæ. Pedunculi foliosi, hinc flores quasi sessiles. Flores lutei.

9. **CENTAUREA** calycibus duplicato spinosis, foliis
decurrentibus inermibus lanceolatis : radicalibus
hastato-pinnatis. *Hort. cliff.* 423. n. 21.

Carduus

Carduus stellatus luteus, foliis cyani. Bauh. pin. 387.

Leucacantha quorundam. Dalech. hist. 423.

Spina solstitialis. Dod. pempt. 734.

Habitat *Monspeli*, *Florentiæ*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Desc. Radix fibrosa. Caulis bipedalis ramosus patulus. Folia in ramis & caulē lanceolata integerrima brevia decurrentia undulata villo albo araneaceo adspersa. Folia radicalia hastata pinnata seu pinnata pinnis lateralibus lanceolatis dentatis; terminali vero pinnata triangulari hastata. Extimis ramis. Flores flavi insident capitulis ovatis solitariis; quorum squamæ basin capituli cingentes armantur spinis palmatis brevissimis subæqualibus; reliquæ vero squamæ gerunt spinas subulatas flavas; longitudine capituli, basi utrinque spinulis parvis armatas.

10. CENTAUREA calycibus duplicato spinosis, foliis lanceolatis subdentatis, capitulis subsessilibus lateralibus.

Habitat in *Europa* frequens.

Hospitatur *sub dio*, annua.

Desc. Radix fibrosa. Caulis pedalis debilis sæpe decumbens. Folia omnia lanceolata, inferiora obtusiora; pilis scabra, non tamen tomentosa, decurrentia: ala superne latiore undulata. Capitula subsessilia ad latera, ovata, parva. Flores minimi lutei. Spinæ reflexæ albidae basi lateribus spinosæ. Corollæ radii non sunt disci flosculis longiores; hinc corolla composita brevissima.

POLYGAMIA NECESSARIA.

OTHONNA.

1. OTHONNA foliis subcordatis, caule subnudo simplicissimo.

Jacobæastrum cacaliæ folio. Amm. rhut. 221. t. 24.

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Obs. Calyces ad basin usque multipartiti erecti. Corollæ radius est femineus; discus vero hermaphroditus. Folia *Calthæ*.

2. OTHONNA foliis pinnatifidis tomentosis: laciniis sinuatis, caule fruticoso.

Solidago foliis pinnatifidis: laciniis sinuatis, corymbis racemosis. Hort. cliff. 410.

Jacobæa maritima. Bauh pin. 131.

Cineraria. Dod. pempt. 642.

Habitat ad littora *Maris inferi*.

Hospitatur in *Frigidario*, suffrutesc.

Obs. Licet Calyx polyphyllus sit, debet tamen placita genus *Othonnæ* intrare cum destinatur ad basin calyculo.

CALENDULA.

* CALENDULA feminibus radii cymbiformibus echinatis, disci bicornibus. *Hort. cliff.* 425. *Fl. svec.* 712.

β. *Caltha vulgaris.* *Baub. pin.* 275.

γ. *Caltha flore pleno.* *Baub. hist.* 3. p. 101.

Caltha polyanthos major. *Baub. pin.* 275.

δ. *Caltha prolifera*, majoribus seu minoribus floribus. *Baub. pin.* 276.

Calendula prolifera 1. 2. *Tabern. hist.* 712.

Svecis. Ringblomma.

Habitat in *Europa.*

Hospitatur *sub dio*, cicur, annua.

2. CALENDULA foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis filiformibus.

Calendula foliis dentatis. *Roy. lugdb.* 177.

Calendula humilis africana, flore intus albo: foris violaceo simplici. *Herm. lugdb.* 104. t. 105. *Stiff. bot.* 59. t. 59.

Calendula africana procumbens, flore minore. *Herm. afric.* 5.

Dimorphotheca foliis incisfis, ovariis minoribus. *Vaill. act.* 1720. p. 361.

Svecis Dag och Natt.

Habitat ad *Caput bonæ spei.*

Hospitatur *sub dio*, annua.

3. CALENDULA foliis lanceolatis dentatis, pedunculis superne incrassatis.

Calendula foliis radicalibus sinuatis, caulinis superne denticulatis. *Roy. lugdb.* 177.

Cardispermum africanum pubescens, foliis incisfis, parvo flore. *Trant. act. paris.* 1724. p. 39. t. 2.

Calendula africana erecta, flore minore. *Herm. afric.* 5.

Habitat in *Æthiopia.*

Hospitatur in *Tepidario*, & *Vaporario*, annua.

OSTEOSPERMUM.

1. OSTEOSPERMUM foliis oppositis palmatis. *Hort. cliff.* 424. *Gron. virg.* 106.

Uvedalia virginiana, platani folio molli. *Pet. mus.* 78. n. 800. Moni-

Monilifera latissimis angulosis foliis. *Vaill. act.* 1720.
p. 374.

Chrysanthemum perenne virginianum majus, platani
orientalis folio. *Morif. hist.* 3. p. 22. f. 6. t. 7. f. 55.

Chrysanthemum, angulosis platani foliis, virginianum.
Pluk. alm. 99. t. 83. f. 3.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Tepidario*, & *Frigidario*, perennis.

A R C T O T I S.

1. ARCTOTIS foliis pinnato-sinuatis: laciniis oblongis
dentatis. *Hort. cliff.* 412.

Arctotheca jacobææ folio, radiis florum intus luteis,
extus purpureis. *Vaill. act.* 1720. p. 428.

Anemonospermus africana, foliis cardui benedicti, flo-
rum radiis intus sulphureis. *Comm. hort.* 2 p. 43. t. 22.

Habitat ad *Caput bonæ spei*.

Hospitatur in *Tepidario*, perennis.

M I L L E R I A.

1. MILLERIA foliis ovatis, pedunculis simplicissimis
confertis. *Hort. cliff.* 425. t. 25.

Milleria annua erecta minor, foliis parietariæ, floribus
ex foliorum alis. *Mart. cent.* 47. t. 47. f. 1.

Habitat in *Campechia*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

M I C R O P U S.

1. MICROPUS. *Roy. lugdb.* 145.

Gnaphalodes lusitanica. *Tournef. inst.* 439.

Gnaphalium supinum, echinato semine. *Grisl. luf.* 26.

Pluk. alm. 171. t. 187. f. 6. *Raj. suppl.* 191.

Pseudo-Gnaphalium supinum, semine echinato, *Morif.*
hist. 3. p. 93.

Habitat in *Lusitaniæ* maritimis,

Hospitatur *sub dio*, annua.

MONOGAMIA.

LOBELIA.

1. LOBELIA caule erecto, foliis lanceolatis serratis, spica terminali. *Hort. cliff.* 426. *Gron. virg.* 107.
 Rapuntium galeatum virginianum seu americanum, coccineo flore majore. *Moris. hist.* 2. p. 466. f. 5. t. 5. f. 54.
 Rapuntium maximum, coccineo spicato flore. *Hern. mex.* 879 t. 880.
 Cardinalis Rivini. *Rupp. jen.* 1. p. 201.
 Habitat in *Virginia*.
 Hospitatur sub dio, perennis.
2. LOBELIA caule erecto, foliis ovatis subserratis pedunculo longioribus, capsulis inflatis. *Aët. stockh.* 1741. p. 23. t. 1.
 Lobelia caule erecto brachiato, foliis ovato-lanceolatis obsolete incis, capsulis inflatis. *Hort. cliff.* 500.
 Habitat in *Virginia*.
 Hospitatur in vaporariis, annua.

VIOLA.

- *. VIOLA acaulis, stolonibus teretibus reptantibus, pedunculis radicalibus. *Hort. cliff.* 427. *Fl. svec.* 715.
- β. Viola martia multiplici flore. *Baub. pin.* 199. purpureo. *Tournef. inst.* 419.
 Viola purpurea. *Cam. epit.* 910. f. a.
 Habitat in *Europa*.
 Hospitatur sub dio, perennis.
- *. VIOLA foliis oblongis incis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Fl. svec.* 721.
- β. Viola hortensis repens, flore violaceo holosericeo purpureo & aureo. *Herm. lugdb.* 628.
 Viola tricolor hortensis repens, flore nigro purpureo & instar holoserici nitente. *Tournef. inst.* 421.
 Habitat in *Europa*.
 Hospitatur sub dio, cicur, annua.

IMPATIENS.

1. IMPATIENS pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis, nectariis flore brevioribus.

Impa-

Impatiens pedunculis confertis unifloris. *Hort. cliff.*
428.

Balsamina fœmina. *Bauh. pin.* 306.

Balsamina. *Dod. pempt.* 671.

β. Balsamina fœmina flore candido. *Tournef. inst.* 448.

γ. Balsamina fœmina flore partim candido partim rubro.
Tournef. inst. 448.

δ. Balsamina flore majore specioso. *Tournef. inst.* 448.

Habitat in Zeylona.

Hospitatur sub dio, & in Caldario, annua.

Obs. sub dio fructificat; in caldario etjam, sed hic producit flores speciosissimos δ, quod nunquam sub dio. Omni nocte dormit foliis pendulis uti sylvestris planta; de die vero vigilat foliis patentibus.



CLASSIS. XX.

GYNANDRIA

TRIANDRIA.

SISYRINCHIUM.

1. SISYRINCHIUM caule foliisque ancipitibus. *Hort. cliff.* 431. *Gron. virg.* III.
 Sisyrrinchium cæruleum parvum, gladiato caule, virginianum. *Pluk. alm.* 348. t. 61. f. 1.
 Bermudiana graminea, flore minore cæruleo. *Dill. elth.* 49. t. 41. f. 49.
 Habitat in *Virginia*.
 Hospitatur in *Tepidario*, & *Frigidario*, perennis.

PENTANDRIA

PASSIFLORA.

1. PASSIFLORA foliis palmatis integerrimis. *Halm. passifl.* 22. n. 20.
 Passiflora foliis palmatis quinquepartitis integerrimis, involucris cordatis triphyllis. *Hort. cliff.* 432.
 Granadilla pentaphyllos, flore cæruleo magno. *Boerb. lugdb.* 2. p. 81.
 Flos passionis. *Roche. antill.* 119. t. 118.
Svecis Passions-blomma.
 Habitat in *Brasilia*.
 Hospitatur in *Caldario*, & *Frigidario*, Frutex.
2. PASSIFLORA foliis trilobis serratis. *Halm. passifl.* 21. n. 19.
 Passiflora foliis semitrifidis serratis basi duabus glandulis convexis: lobis ovatis. *Hort cliff.* 432. *Gron. virg.* 112.
 Granadilla hispanis, Flos passionis italica. *Hern. mex.* 888. t. 888.

Clema-

Clematis trifolia, flore roseo clavato. *Bauh. pin.* 301.

Habitat in *Brasilia*, *Peru*, *Virginia*.

Hospitatur in *Caldario*, perennis.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

1. *ARISTOLOCHIA* foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis.

Aristolochia caule erecto simplicissimo, foliis cordatis petiolatis, floribus lateralibus confertis. *Hort. cliff.* 432.

Aristolochia clematidis recta. *Bauh. pin.* 307.

Aristolochia clematidis vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 71.

Pharm. *ARISTOLOCHIAE VULGARIS Radix*.

Habitat in fossis, aggeribus, vinetis *Galliae*, *Tatariae*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

POLYANDRIA.

GREVIA.

1. *GREVIA* foliis orbiculato-ovatis.

Grevia corollis acutis. *Hort. cliff.* 433.

Ulmifolia arbor africana baccifera, floribus purpureis.

Pluk. alm. 393. t. 237. f. 1.

Ulmi facie arbuscula aethiopica, ramulis alatis, floribus purpurascens. *Comm. hort.* 1. p. 165. t. 85.

Seb. thes. 1. p. 46. t. 29. f. 3.

Habitat in *Aethiopia*.

Hospitatur in *Tepidario*, Arbor †.

ARUM.

1. *ARUM* acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Hort. cliff.* 434.

Arum vulgare non maculatum. *Bauh. pin.* 195.

Arum. *Bauh. hist.* 2. p. 784. *Dod. pempt.* 328.

Pharm. *ARI Radix*, *Faecula*, *Herba*.

Habitat in umbrosis *Germaniae*, *Belgii*, *Angliae*, *Galliae*, *Italiae*.

Hospitatur in *Frigidario*, perennis.

2. ARUM acaule, foliis peltatis ovatis basi semibifidis ;
margine repandis. *Hort. cliff.* 435.

Arum maximum ægyptiacum quod vulgo Colocasía,
Bauh. pin. 195.

Arum ægypticum. *Column. ecphr.* 2. p. 1. t. 1.

Colocasía. *Clus. hist.* 2. p. 75.

Habitat in aquosis *Cretæ*, *Cypri*, *Ægypti*.

Hospitatur in *Caldario*, perennis.

3. ARUM acaule, foliis peltatis ovatis : basi semifidis ;
margine integerrimis. *Hort. cliff.* 435.

Arum minus, nymphææ folio, esculentum. *Sloan. flor.*
62. *hist.* 1. p. 167. t. 106. f. 1.

Brassica brasíliana, foliis nymphææ. *Bauh. pin.* 111.

Habitat in *Jamaica*.

Hospitatur in *Caldario*, perennis.



CLASSIS. XXI.

MONOECIA

MONANDRIA.

CERATOCARPUS.

1. CERATOCARPUS. *Dassow. gener. 28. n. 1069.*

Buxb. act. 1. p. 241.

Ceratosperrum, Gerb. volg. 55. tanais 90,

Planta nova incognita ramosa, foliis gramineis angustissimis & acutissimis, floribus staminosis ex alis caulium & foliorum, semine nudo unico bidentis.

Heintz. tart. 299.

Habitat in campis feris & desertis Samara, Czaritzin, Tanais, Stanitzæ, Melichowæ.

Hospitatur sub dio, annua.

Obs. Flores tres Masculi sessiles in singula caulis divaricatione; flores feminei solitarii sessiles in singula foliorum ala.

TRIANDRIA.

ZE A.

1. ZEA. *Hort. cliff. 437.*

Frumentum indicum Mays dictum. Baub. pin. 25. theat. 490.

Mays granis aureis. Tournef. inst. 531.

Frumentum indicum. Dod. pempt. 509. Cam. epit. 186.

Svecis Turkiskt-hwete.

Habitat in America.

Hospitatur sub dio, & in Tepidario, annua,

COIX.

1. COIX seminibus ovatis. *Hort. cliff. 437. Fl. zeyl. 330.*

Gron. virg. 114.

Lacryma Job. Clus. hist. 2. p. 216.

Lithospermum arundinaceum. Baub. pin. 258.

S 5

Habi-

Habitat in *Virginia*, *Malabaria*, *Zeylona*.

Hospitatur in *Caldario*, & sub *dio*, perennis.

PHYLLANTHUS.

1. PHYLLANTHUS foliis pinnatis floriferis, floribus pedunculatis, caule herbaceo erecto. *Fl. zeyl.* 331.

Phyllanthus foliis alternis alternatim pinnatis, floribus dependentibus ex alis foliorum. *Hort. cliff.* 440.

Urinaria indica erecta vulgaris. *Burm. zeyl.* 230. t. 93. f. 2.

Fruticulus capsularis hexapetalos, casia poetarum foliis brevioribus subrotundis & densius stipatis.

Pluk. alm. 159. t. 183. f. 5.

Niruri barbadense, folio ovali subtus glauco, petiolis florum brevissimis. *Mart. cent.* 9. t. 9.

Habitat in *Zeylona*, *Malabaria*, *Barbados*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

Obs. Flores sub petiolis dependentes, quorum cauli propiores gemini masculi, apici vero foliorum propiores feminei solitarii.

TETRANDRIA.

URTICA.

1. URTICA foliis oppositis tripartitis incis. *Am.*

Urtica foliis profunde laciniatis, semine lini. *Am.* *rhut.* 173. n. 249. t. 25.

Habitat in *Sibiria*.

Hospitatur sub *dio*, cicur, perennis.

Obs. Humanam altitudinem superat planta, saepius dioica; unus alterne flos masculus immixtus saepe femineis.

2. URTICA foliis oppositis, amentis fructiferis globosis. *Hort. cliff.* 440.

Urtica pilulifera, folio profundius urticae majoris in modum serrato, semine magno lini. *Raj. syn.* 3. p. 140.

Urtica urens, pilulas ferens. *Bauh. pin.* 232.

Urtica romana. *Lob. hist.* 281.

- β. Urtica pilulifera, parietariae facie, semine lini. *Morif. hist.* 3. p. 435.

Pharm. URTICAE ROMANAE Semina.

Svecis Romersk nätsla.

Habi-

Habitat in pratis *Angliæ*, *Helvetiæ*, *Galliæ Narbonensis*.
Hospitatur *sub dio*, annua.

B U X U S.

1. BUXUS. *Hort. cliff.* 441.

α. Buxus arborescens. *Baub. pin.* 471.

Buxus. *Dod. pempt.* 782.

β. Buxus humilis. *Dod. pempt.* 782.

Buxus foliis rotundioribus. *Baub. pin.* 471.

Teaffchur. Cels. hierob. 2. p. 153.

Pharm. BUXI Lignum, Oleum.

Svecis Buxbom.

Habitat in collibus clivosis incultis aliosis *Galloprovinciæ* copiosissime, nec
non *Helvetiæ*, *Sabaudicæ*, *Burgundiæ*, *Galliæ*.

Hospitatur β *sub dio*, α vero in *frigidario*.

Obs. In opere *topiario* nullus aptior fructus; β. nunquam floret.

M O R U S.

1. MORUS foliis cordatis hispidis. *Hort. cliff.* 441.

Morus fructu nigro. *Baub. pin.* 459.

Morus. *Dod. pempt.* 810. *Lob. hist.* 610.

Sycaminus. *Cels. hierob.* 1. p. 288.

Pharm. MORI Rob, Syrupus.

Svecis Mulbärstrå.

Habitat in *China* & sabulosis maritimis *Italiæ*.

Hospitatur in *Frigidario*, & interdum *sub dio*, Arbor.

2. MORUS foliis oblique cordatis lævibus. *Hort. cliff.*
441.

Morus fructu albo. *Baub. pin.* 459.

Morus candida. *Dod. pempt.* 810. *Lob. hist.* 610.

Svecis Hvita Mulbärstrå.

Habitat in *China* & *Italia*.

Hospitatur *sub dio*, & in *Frigidario*, Arbor.

P E N T A N D R I A.

X A N T H I U M.

1. XANTHIUM spinis ternatis.

Xanthium spinis triplicibus. *Hort. cliff.* 443.

Xanthium spinosum, atriplicis folio. *Moris. hist.* 3. p.
604. f. 15. t. 2. f. 3.

Xan-

Xanthium lusitanicum spinosum. Raj. suppl. 109. Herm. parad. 246. t. 246. Pluk. alm. 206. t. 239. f. 1. Magn. hort. 208. t. 208.

Habitat in *Lusitania*.

Hospitatur in *Tepidario*, & *sub dio*, annua †.

*. **XANTHIM** caule inermi. *Hort. cliff. 443. Flor. svec. 778. Fl. zeyl. 569. Gron. virg. 188. Roy. lugdb. 85. Hall. belv. 161.*

β. *Xanthium canadense majus, fructu aculeis aduncis munito. Tournef. inst. 439.*

Xanthium elatius & majus americanum, fructu spinulis aduncis armato. Moris. hist. 3. p. 604. f. 15. t. 2. f. 2.

Habitat in *Jamaica*, *Carolina*, *Canada*, *Virginia*.

Hospitatur *sub dio*, annua.

A M B R O S I A.

1. **AMBROSIA** foliis trilobis ferratis.

Ambrosia foliis palmatis: laciniis lanceolatis ferratis. Hort. cliff. 443. Gron. virg. 188.

Ambrosia canadensis altissima hirsuta, platani folio. Tournef. inst. 439.

Ambrosia virginiana maxima, platini orientalis folio. Moris. hist. 3. p. 4. f. 6. t. 1. f. 4.

Ambrosia gigantea inodora, foliis asperis trifidis. Raj. suppl. 109.

Habitat in *Virginia*, *Canada*.

Hospitatur in *Tepidario*, annua.

2. **AMBROSIA** foliis duplicato-pinnatifidis, racemiss paniculatis glabris.

Ambrosia foliis composito-multifidis, internodiis remotissimis. Gronov. virg. 188.

Ambrosia maxima inodora, marubii aquatici foliis tenuiter laciniatis, virginiana. Pluk. alm. 27. t. 10. f. 5. Raj. suppl. 108. Moris. hist. 3. p. 4.

Ambrosia maritima, artemisiæ foliis inodoris, elatior. Herm. lugdb. 32. Pluk. alm. 28. Raj. hist. 1855. suppl. 109.

Ambrosia virginiana elatior & viridior, hortensis facie. Moris. hist. 3. p. 4.

Am-

Ambrosia altissima vix foetida, foliis artemisiæ. *Gron. virg.* 115.

Habitat in *Virginia & Carolina.*

Hospitatur in *Caldario*, annua.

PARTHENIUM.

1. PARTHENIUM foliis composito-multifidis. *Hort. cliff.* 442.

Hysterophorus ambrosiæ folio. *Vaill. aët.* 1720. p. 435.

Partheniastrum americanum, ambrosiæ folio. *Niss. aët.* 423. t. 13. f. 2.

Matricaria flore minore albo, absinthii foliis. *Plum. spec.* 10.

Habitat in siccis campestribus, *Jamaicæ.*

Hospitatur in *Tepidario*, annua.

I V A.

1. IVA foliis lanceolato-ovatis serratis, caule annuo.

Tarchonanthos foliis cordatis serratis trinerviis B. jussæi. *Roy. lugdb.* 538.

Habitat in *America.*

Hospitatur in *Caldario*, sero floret, annua.

Desc. Radix annua. Caulis humanæ altitudinis, erectus, striatus, pilis albis patulis adpersus. Rami pauci. Folia inferiora opposita, superiora alterna, lanceolato-ovata, acuminata, petiolata, serraturis aliquot magnis, trinervia, scabra. Racemus terminalis erectus, floribus alternis, nutantibus, sub quibus singulis Folia floralia pauca, lanceolata. Flores nutantes ut in specie 1. *Hort. cliff.* sed flosculi foemini 5, nudi absque omni corolla singuli stylis duobus longis. Calyx triphyllus, inæqualis; inter flosculos disci masculos pili aliquot.

ANDRACHNE.

1. ANDRACHNE. *Hort. cliff.* 443.

Telephioides græcum humitufum, flore albo. *Tournef. cor.* 50. *Dill. elth.* 377. t. 282. f. 364. *Buxb. aët.* 2. p. 20. t. 12. f. 2.

Glaux procumbens, myrti tarentinæ folio. *Bocc. mus.* 2. p. 168. t. 119.

Habitat in *Italia, Græcia, Media, Olympo.*

Hospitatur in *Tepidario*, annua †.

AMARANTHUS.

1. AMARANTHUS racemis cylindraceis pendulis longissimis. *Hort. cliff.* 443. *Fl. Zeyl.* 563.

Ama-

Amaranthus maximus. Baub. pin. 120.

Blitum majus peruvianum, Clus. hist. 2. p. 81.

Habitat in Peru & Persia.

Hospitatur sub dio, annua.

2. **AMARANTHUS** inermis, racemis cylindraceis erectis. *Hort. cliff. 444. Gron. virg. 188.*

Amaranthus sylvestris maximus novæ angliaë, spicis viridibus. Raj. hist. 201.

- β. *Amaranthus sylvestris maximus novæ angliaë, spicis purpureis. Tournef. inst. 235.*

Habitat in Virginia.

Hospitatur sub dio, annua.

3. **AMARANTHUS** capitulis subrotundis lateralibus, foliis lanceolatis acuminatis. *Hort. cliff. 444.*

Amaranthus folio variegato. Baub. pin. 121.

Amaranthus tricolor. Lob. hist. 121.

Habitat - -

Hospitatur in Caldario ut pulchrior evadat, annua.

Obs. Singulare quod in hac floribus demerat Naturæ Auctor eorum purpura eaque pinxerit folia, non inferiora, sed superiora, ut florem formarent; sic in PEPLI, callitriche &c. ubi flores abjectissimi, folia rosam formant. Hæc monoica triandra, præcedentes monoica pentandra sunt.

POLYANDRIA.

CORYLUS.

- * **CORYLUS** stipulis ovatis obtusis. *Hort. cliff. 448.*
Fl. Svec. 787.

- β. *Corylus fativa, fructo albo minore, seu vulgaris. Baub. pin. 417.*

Svecis: Lambertiska nötter.

- γ. *Corylus fativa, fructu rotundo maximo. Baub. pin. 418.*

Svecis Spanska Nötter.

Habitat in Germania, Hispania.

Hospitatur sub dio, Arbor.

JUGLANS.

1. **JUGLANS** foliis ovalibus glabris obsolete ferratis: omnibus subæqualibus. *Hort. cliff. 448.*

Nux

Nux juglans seu regia vulgaris. *Bauh. pin.* 417.

Nux juglans. *Dod. pempt.* 816.

Pharm. JUGLANDIS Nuces, Dissepimentum, *Rob. oleum.*

Svecis Walnöt-tråd.

Habitat - - -

Hospitatur in *Frigidario*, at in australibus *Sveciæ* provinciis, præsertim in *Scania*, *sub dio*, *Arbor.*

2. JUGLANS foliolis lanceolatis argute ferratis: superioribus minoribus. *Hort. cliff.* 449. *Gron. virg.* 189.

Nux juglans virginiana nigra. *Herm. lugdb.* 452. t. 453. *Catesb. carol.* 1. p. 67. t. 67.

Habitat in *Terra mariana & Virginia.*

Hospitatur in *Frigidario*, *Arbor.*

F A G U S.

1. FAGUS foliis lanceolatis acuminate ferratis, *Hort. cliff.* 447.

Castanea sativa. *Bauh. pin.* 418.

Castanea. *Cam. epit.* 118.

Pharm. CASTANÆ Fructus, cortex.

Svecis Castanie-trå.

Habitat in montibus *Italiæ* copiosissime; parcius in *Germania*, *Gallia.*

Hospitatur in *Frigidario*, *Arbor.*

LIQVIDAMBAR.

1. LIQVIDAMBAR. *Hort. cliff.* 486. *Gron. virg.* 190.

Liquidambari arbor seu *styraciflua*, aceris folio, fructu tribuloide pericarpio orbiculari ex quamplurimis apicibus coagmentato semen recondens.

Pluk. alm. 224. t. 42. f. 6.

Styrax aceris folio. *Raj. hist.* 1681.

Pharm. STORACIS LIQVIDÆ Refina.

Habitat in *Virginia.*

Hospitatur in *Frigidario*, *Arbor.*

P L A T A N U S.

1. PLATANUS foliis lobatis. *Hort. cliff.* 447. *Gron. virg.* 119.

Platanus occidentalis. *Catesb. carol.* 1. p. 56. t. 56.

Habitat in *Carolina*, *Virginia.*

Hospitatur in *Tepidario*, *Arbor* †.

POTE-

P O T E R I U M.

1. POTERIUM inerme. *Hort. cliff.* 446. filamentis longissimis. *Roy. lugdb.* 129. *Gvett. Fl.* 2: p. 129.

Sangvisorba minor. *Bauh. hist.* 3. p. 113.

Pimpinella sangvisorba minor hirsuta. *Bauh. pin.* 160.

Pimpinella sangvisorba. *Cam. epit.* 777.

Pharm. PIMPINELLÆ ITALICÆ Herba, Semina.

Svecis Pimpinella.

Habitat in apricis asperis petrosis *Germaniæ*, *Belgii*, *Angliæ*, *Galliæ*, *Italiæ*.
Hospitatur sub dio, perennis.

2. POTERIUM agrimonoides.

Pimpinella agrimonoides odorata. *Tournef. inst.* 157.

Pimpinella agrimonoides. *Morif. blæs.* 294. *umb.* 57.

Bocc. succ. 58.

Habitat *Monspeli.*

Hospitatur sub dio, biennis.

Obs. Non video quomodo hæc a præcedenti distingvatur. Facies tristior sic-
cior, odor gravior. an HYBRIDA ex antecedenti & *Agrimonia*?

MONADELPHIA.

P I N U S.

1. PINUS foliis geminis, primordialibus solitariis ciliatis. *Hort. cliff.* 450.

Pinus sativa. *Bauh. pin.* 490.

Pinus officulis duris, foliis longis. *Bauh. hist.* 1. p. 248.

Pharm. PINI Nuces, Nuclei, *Loboc.*

Svecis: Spanfktall.

Habitat copiosissime in *Italia* propè *Ravennam* ad maris usque littus.

Hospitatur in *Frigidario*, Arbor.

Obs. Huic cotyledones 10 vel 12, dum e semine enascitur.

C U P R E S S U S.

1. CUPRESSUS foliis imbricatis erectis. *Hort. cliff.* 449.

Cupressus meta in fastigium convoluta, quæ *Fœmina* *plinii* *Tournef. inst.* 587.

Cupressus. *Bauh. pin.* 488. *Cam. epit.* 52.

Sophier Gels. hierob. 1. p. 328.

Pharm. CUPRESSI Lignum, Nuces.

Svecis: Cypress.

Habi-

Habitat in insulis Grætiæ, Creta &c.
Hospitatur in Frigidario, Arbor.

2. CUPRESSUS foliis distiche patentibus. *Hort. cliff.*
449. *Gron. virg.* 119.

Cupressus virginiana, foliis acaciæ deciduis. *Comm.*
hort. 1. p. 113. t. 59.

Cupressus virginiana, foliis acaciæ cornigeræ paribus
& deciduis. *Pluk. alm.* 125. t. 85. f. 6.

Habitat in Carolina, Virginia.
Hospitatur in Frigidario, Arbor.
Obs. Hæc pentacotyledonis est.

THUJA.

1. THUJA strobilis lævibus: squamis obtusis. *Hort.*
cliff. 449.

Thuja theophrasti. *Baub. pin.* 488.

Arbor vitæ. *Clus. hist.* 1. p. 36. *Dod. pempt.* 630.

Habitat in Canada.
Hospitatur in Frigidario, Arbuscula.

2. THUJA strobilis squarrosi: squamis reflexo acuminatis.

Thuja strobilis uncinatis, squamis reflexo acuminatis.
Roy. lugdb. 87. *descr.* *Hort. cliff.* 449.

Habitat forte in China.
Hospitatur in Tepidario, Arbuscula.

POLYADELPHIA.

RICINUS.

1. RICINUS foliis peltatis ferratis, petiolis glanduliferis. *Hort. cliff.* 450. *Fl. zeyl.* 339.

Ricinus vulgaris. *Baub. pin.* 439.

Ricinus, gallis Palma christi. *Lob. hist.* 392.

Kikajon. *Cels. hierob.* 2. p. 273.

Pharm. CATAPUTIÆ MAJORIS Semina.

Svecis Jonæ Curbitz, Undertråd.

3. Ricinus africanus maximus, caule geniculato rutilante. *Tournef. inst.* 542.

T

Habi-

Habitat locis pinguibus, in quatuor orbis partibus calidioribus: *Japonia*,
Malabaria, *Zeylona*, *Africa*, *Creta*, *Jamaica*, *Surinama*, *Virginia*.
 Hospitatur sub dio, & in *Caldario*, biennis.

J A T R O P H A.

1. *JATROPHA* foliis palmatis dentatis aculeatis. *Hort. cliff.* 445.

Ricinus tithymaloides americanus lactescens & urens,
 floribus albis. *Comm. hort.* 1. p. 19. t. 10.

Ricinus lactescens, fici foliis: spinulis mordacibus armatis. *Pluk. alm.* 320. t. 220. f. 3.

Habitat in *Brasilia*.

Hospitatur in *Caldario*, Arbor.

C R O T O N.

1. *CROTON* foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo.

Croton foliis ovatis plicatis scabris, capsulis e pedunculo ramoso pendulis. *Roy. lugdb.* 532.

Ricinoides ex qua paratur *Tournefol* gallorum. *Tournef. inst.* 565. *Vaill. act.* 1712. p. 337. t. 17.

Heliotropium tricoccum. *Bauh. pin.* 253. *Raj. hist.* 165.

Pharm. LACMUS Succus.

Habitat *Monspelii* rarius.

Hospitatur in *Caldario*, & *Tepidario*, annua.

Obs. Caulis herbaceus teres spithameus viridis terminatus racemo, ubi Rami 2 vel 3 erecto-patentes, terminati racemo & similiter subdivisi. Racemi erecti pedunculis partialibus unifloris erectis: femineis inferioribus longioribus, paucioribus. Masculi calyx cylindraceus monophyllus quinquedentatus, deciduus: Corolla infundibuliformis pentapetala: limbo brevissimo flavo patulo acuminato. Stamina ex filamentis in unam columnam, longitudine floris, connata, deinde divisa, & antheris 8 seu 10 oblongis instructa. Feminei calyx decaphyllus, foliolis subulatis alternis brevioribus persistens. Corolla nulla. Germen subrotundum verrucosum. Styli 3. recurvi semibifidi. Stigmata subbarbata longitudine styli. Fructus pendentes in pedunculis elongatis. Folia rhombæa repanda, rugosa, venosa, viridia, petiolis canaliculatis. Glandula ad basin subtus folii, utrinque una, elevata.

A C A L Y P H A.

1. *ACALYPHA* involucris femineis cordatis incisfis, foliis ovato-lanceolatis petiolo longioribus. *Flor. zeyl.* 342.

Acaly-

Acalypha foliis ovato-lanceolatis, involucris femineis obtusis. *Hort. cliff.* 495. *Gron. virg.* 116.

Mercurialis tricoccus hermaphroditica seu ad foliorum juncturas e foliolis cristatis julifera simul & fructum gerens. *Pluk. alm.* 248. t. 99. f. 4.

Habitat in Zeylona, Virginia.

Hospitatur in Caldario, & Vaporario, ubi nimis luxuriat & se ipsam multiplicat, annua.

SYNGENESIA.

SICYOS.

1. *SICYOS* foliis angulatis. *Hort. cliff.* 452.

Sicyoides americana, fructu echinato, foliis angulatis. *Tournef. inst.* 103.

Bryonoides flore & fructu minore. *Dill. elth.* 58. t. 51. f. 59.

Cucumis canadensis monospermos, fructu echinato. *Herm. parad.* 108. t. 108.

Habitat in Canada.

Hospitatur sub dio, & in Caldario, annua.

CUCURBITA.

1. *CUCURBITA* feminibus obsolete bicornibus. *Hort. cliff.* 451.

Cucurbita laginaria, flore albo. *Morif. hist.* 2. p. 23. f. 1. t. 5. f. 3.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *Bauh. pin* 313.

Cucurbita camerariana longa. *Dalech. hist.* 615.

Pharm. CUCURBITÆ Semina.

Svecis Calabass.

Habitat in locis riguis humentibus Americæ.

Hospitatur sub dio, vix maturefcit, annua.

2. *CUCURBITA* feminum margine integro tumido. *Hort. cliff.* 452.

Cucurbita major rotunda, fructu luteo, folio aspero. *Bauh. pin.* 213.

Pepo vulgaris. *Raj. hist.* 639.

Svecis Pompa.

Habitat - - - -

Hospitatur *sub dio*, annua.

3. CUCURBITA foliis multipartitis.

Cucurbita feminum margine basi dilatato. *Hort. cliff.* 452.

Anguria Citrullus dicta. *Baub. pin.* 312.

Citrullus folio colocynthidis secto, semine nigro, quibusdam Anguria. *Baub. hist.* 2. p. 235.

Pharm. CITRULLI Semina.

Svecis Watu - Melon.

Habitat in *Apulia*, *Calabria*, *Sicilia*.

Hospitatur in terra prægnante, annua.

CUCUMIS.

1. CUCUMIS foliorum angulis rectis. *Hort. cliff.* 451.

Cucumis fativus vulgaris. *Baub. pin.* 310.

Cucumis vulgaris. *Dod. pempt.* 66.

Pharm. CUCUMERIS Semina.

Svecis Gurka.

Habitat - - - -

Hospitatur *sub dio*, annua.

2. CUCUMIS foliorum angulis rotundatis. *Hort. cliff.* 451.

Melo vulgaris. *Baub. pin.* 310.

Melo. *Baub. hist.* 2. p. 242.

Pharm. MELONIS Semina.

Svecis Melon.

Habitat - - - -

Hospitatur in *vaporariis*, & terra prægnante, annua.

3. CUCUMIS foliis palmato-sinuatis, pomis subovatis echinatis.

Cucumis foliis palmatis. *Roy. lugdb.* 263.

Cucumis sylvestris americanus, anguriæ folio, fructu ovi figura & magnitudine ad maturitatem pallido, spinosis tuberculis momordicæ instar muricato. *Pluk. phyt.* 170. f. 3.

Cucu-

Cucumis anguriæ folio latiore aspero, fructu minore candido : spinulis obtusis muricato. *Sloan. flor.* 103.

Anguria americana, fructu echinato eduli. *Tournef. inst.* 107.

Habitat in *Jamaica*.

Hospitatur in *Caldario*, annua †.

Obf. Accedit valde ad Cucumerem africanum echinatum minorem. *Herm. parad.* 133. t. 133.

4. CUCUMIS foliis multifidis, pomis globosis glabris. Cucumis foliis multifidis. *Ray. lugdb.* 263.

Colocynthis fructu rotundo major. *Baub. pin.* 313.

Colocynthis. *Cam. epit.* 982.

Pharm. COLOCYNTHIDIS Pulpa, Semina, Resina, Extractum.

Svecis Coloquint.

Habitat - - -

Hospitatur in *Caldario*, annua.

5. CUCUMIS foliis cordatis integris denticulatis, pomis globosis glabris.

Cucumis maderaspatensis, fructu minimo. *Pluk. alm.* 123. t. 170. f. 2.

Habitat in *India*.

Hospitatur in *Caldario*, annua.

M O M O R D I C A.

1. MOMORDICA pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patienti-palmatis. *Hort. cliff.* 451.

Balsamina rotundifolia repens seu mas. *Baub. pin.* 306.

Charantia. *Dod. pempt.* 670.

Habitat in *India*

Hospitatur in *Caldario*, annua †.

2. MOMORDICA pomis oblongis : fulcis catenulatis, foliis incis. *Hort. cliff.* 451. *Flor. zeylon.* 352.

Cucumis ægyptius reticulatus seu Luffa arabum. *Vest. ægypt.* 199. t. 58. 59. *Morif. hist.* 2. p. 35. s. 7. t. 7. f. 1. 2.

Luffa arabum. *Tournef. act.* 1706.

Habitat in Zeylona.

Hospitatur in *Calderio*, annua.

3. MOMORDICA absque cirrhis.

Momordica pomis ovalibus hispidis, foliis cordatis integris plicato-dentatis. *Hort. cliff.* 451.

Cucumis sylvestris asininus dictus. *Baub. pin.* 314.

Cucumis sylvestris. *Cam. epit.* 946.

Pekaim. *Cels. hierobot.* 1. p. 393.

Pharm. CUCUMERIS ASININI Radix.

ELATERII *Extractum*, *Resina*.

Habitat in ruderatis, sabulosis, uliginosis, *Galliae Narbonensis*, *Italia*, *Sicilia*.

Hospitatur *sub dio*, perennis.

Obf. Hæc cirrhis destituitur omnino & unica.



CLASSIS XXII.

DIOECIA

DIANDRIA.

SALIX.

1. SALIX foliis ferratis ovatis acutis glabris : ferraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis.

Salix folio laureo seu lato glabro odorato. *Raj. hist.*

1420.

Habitat in *Europa*.

Hospitatur *sub dio*, Arbor.

TRIANDRIA.

OSYRIS.

1. OSYRIS foliis obtusis.

Osyris fructu nigro. *Amm. rhut.* 178.

Habitat circa locum salsum *Jamischom* Sibiriae.

Hospitatur *sub dio* & in *Frigidario*, (ad huc tenella) frutex.

TETRANDRIA.

MYRICA.

2. MYRICA foliis lanceolatis subserratis, fructu baccato. *Hort. cliff.* 455. *Gron. virg.* 120.

Myrtus brabanticae similis carolinensis baccifera, fructu racemoso sessili monopyreno. *Pluk. alm.* 250. t. 48. f. 9. *Catesb. carol.* 1. p. 69. t. 69.

Coriotragematodendros seu Arbor carolinensis æleagni cordi foliis, fructu saccharati specie & magnitudine coriandri. *Pluk. amalth.* 65.

Svecis Waxträd. *Pensylvanis* Candeltree.

Habitat in *Carolina*, *Virginia*.

Hospitatur in *Frigidario*, Arbor.

P E N T A N D R I A.

P I S T A C I A.

1. PISTACIA foliis impari pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 456.

Terebinthus vulgaris. *Bauh. pin.* 400.

Terebinthus. *Dod. pempt.* 870. *Clus. hist.* 1. p. 15.

Pharm. TEREBINTHINA CYPRIA.

Svecis Terpentins - trå.

Habitat in *Gallia Narbonensi, Lusitania, Hispania, Italia, Sicilia, Cypro, Cycladibus, Syria, Mesopotamia, Assyria.*

Hospitatur in *Tepidario, Arbor.*

2. PISTACIA foliis abrupte pinnatis. *Hort. cliff.* 456.

Lentiscus vulgaris. *Bauh. pin.* 399.

Lentiscus. *Dod. pempt.* 871. *Clus. hist.* 1. p. 14.

Pharm. LENTISCI Lignum

MASTICIS Resina, Syrupus, Oleum.

Svecis Mastix - trå.

Habitat in *Gallia Narbonensi, Lusitania, Hispania, Italia.*

Hospitatur in *Tepidario, Arbor.*

C E R A T O N I A.

1. CERATONIA *Dod. pempt.* 787. *Cels. hierobot.* 1. p. 226.

Siliqua edulis. *Bauh. pin.* 400.

Siliquæ. *Cam epit.* 139, femina.

Pharm. SILIQUA DULCIS.

Svecis Johannisbröd.

Habitat in *Apulia, Campania, Creta, Cypro, Sicilia, Syria, Judæa.*

Hospitatur in *Tepidario, per hyemes.*

S P I N A C I A.

1. SPINACIA, *Hort. cliff.* 457.

Mas.

Spinacia vulgaris sterilis.

Tournef. inst. 533.

Spinachia femina. *Dalech. hist.* 543.

Spinachia sterilis. *Moris. hist.* 2. p. 598.

hist. 2. p. 598.

Femina.

*Spinacia vulgaris, cap-
sula seminis aculeata.*

Tournef. inst. 533.

Spinachia mas. *Dalech. hist.* 543.

*Spinachia femine spinosa.
Lapa-*

Lapathum hortense seu
Spinacia sterilis, *Baub.*
pin. 115.

so. *Morif. hist.* 2. p.
598.

Lapathum hortense seu
Spinacia femine spino-
so. *Baub. pin.* 114.

β. Lapathum hortense seu
Spinacia femine non spi-
nofo. *Baub. pin.* 115.

Pharm. SPINACIÆ Se-
mina,

Svecis Spinat.

Habitat - - -

Hospitatur sub dio, annua.

CANNABIS.

1. CANNABIS foliis digitatis. *Hort. cliff.* 457.

Mas.

Cannabis sterilis. *Dod.*
pempt. 353.

Cannabis femina. *Dalech.*
hist. 497.

Cannabis erratica. *Baub.*
pin. 320.

Svecis Gallringshampa.

Femina.

Cannabis foecunda. *Dod.*
pempt. 535.

Cannabis mas. *Dalech. hist.*
497.

Cannabis fativa. *Baub.*
pin. 320.

Pharm. CANNABIS Se-
mina.

Svecis Fröhampa.

Habitat in India Orientali.

Hospitatur sub dio, annua, ubique in agris.

HEXANDRIA.

DIOSCOREA.

1. DIOSCOREA foliis cordatis alternis, caule lævi.
Hort. cliff. 459. *Fl. zeyl.* 358.

Dioscorea scandens, folio tamni, fructu racemoso.
Plum. gen. 9.

Volubilis nigra, radice tuberosa compressa maxima
digitata farinacea esculenta, folio cordato nervoso.
Sloan, flor. 46. *hist.* 1. p. 140.

T 5

Habi-

Habitat in *Malabaria*, *Zeylona*, *Jamaica*.

Hospitatur in *Caldario*, perennis †.

OCTANDRIA.

POPULUS.

1. **POPULUS** magna, foliis amplis: aliis cordiformibus, aliis subrotundis: junioribus tomentosis. *Gron. virg.* 194.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur *sub dio*, Arbor.

Obs. Varietas forte **POPULI NIGRÆ**. *Fl. Suec.* 321.

GLEDITSIA.

1. **GLEDITSIA**. *Gron. virg.* 193.

Cæsalpinoides foliis pinnatis ac duplicato pinnatis. *Hort. cliff.* 489.

Acacia americana, *abruæ folio*, *triacanthos*, sive ad axillas foliorum spina triplici donata. *Pluk. mant.* 1. *Hort. angl. t.* 21.

Acacia, *abruæ folio*, *triacanthos*, capsula ovali unicum semen claudente. *Catesb. carol.* 1. p. 43. t. 43.

Acacia triacanthos, siliquis latis fuscis: pulpa virescente subdulci. *Clayt. virg.* 59.

Habitat in *Virginia*.

Hospitatur in *Tepidario*, Arbor.

ENNEANDRIA.

MERCURIALIS.

1. **MERCURIALIS** caule brachiato, foliis glabris. *Hort. cliff.* 461.

Mas.

Mercurialis spicata seu femina. *Bauh. pin.* 121

Mercurialis femina. *Dod. pempt.* 658. *Lob. hist.* 131.

Dalech. hist. 1627.

Femina.

Mercurialis testiculata seu mas. *Bauh. pin.* 121.

Mercurialis mas. *Dod. pempt.* 658. *Lob. hist.* 131.

Dalech. hist. 1627.

Pharm.

Pharm. MERCURIALIS Herba, *Mel.*

Habitat in umbrosis *Angliæ*, *Galliæ*, *Italiæ*.

Hospitatur *sub dio*, cicur, annua.

DECANDRIA.

CORIARIA.

1. CORIARIA foliis ovato oblongis.

Coriaria, *Hort. cliff.* 462.

Coriaria vulgaris. *Isnard. act.* 1711. p. 418.

Rhus myrtifolia monspeliana. *Bauh. pin.* 414. *Angl. hortul.* 64. t. 20. f. 1.

Habitat *Monspelii*.

Hospitatur in *Tepidario*, & *Frigidario*, frutex.

Obs. Vim singularem producendi EPILEPSIAM detexit Illustris Medius DD. SAUVAGESIUS, quocunque modo & a quocunque animali assumatur.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS.

1. JUNIPERUS foliis inferne adnatis : oppositionibus concatenatis. *Hort. cliff.* 464.

Sabina folio cupressi. *Bauh. pin.* 487.

Sabina. *Dod. pempt.* 854.

Pharm. SABINÆ Herba, *Essentia*, *Aqua*, *Oleum*.
Svecis Säfvenbom.

Habitat in orientis montibus *Ararat*, *Olympi*, *Uraliæ*.

Hospitatur *sub dio*, frutex.

2. Juniperus foliis basi adnatis : junioribus imbricatis, senioribus patulis. *Hort. cliff.* 464. *Gron. virg.* 194.

Juniperus major americana. *Raj. hist.* 1413.

Juniperus barbadensis, cupressi folio, ramis quadratis.

Pluk. alm. 201.

Svecis Ceder.

Habitat in *Jamaica*, *Carolina*, *Virginia*.

Hospitatur in *Tepidario*, Arbor.

SYNGENESIA.

RUSCUS.

1. RUSCUS foliis supine floriferis nudis. *Hort. cliff.* 463.
Ruscus myrtifolius aculeatus. Tournef. inst. 79. *Segu.*
veron. 90.
Ruscus. Baub. pin. 470.
Ruscum. Dod. pempt. 744.
Pharm. RUSCI Radix, Semina.
Habitat in asperis saxosis umbrosis Gallia, Italia.
Hospitatur in Frigidario, Fruticulus.
2. RUSCUS foliis nudis prone floriferis. *Hort. cliff.* 465.
Laurus alexandrina, fructu folio insidente. Baub. pin.
305. Segu. veron. 90.
Laurus alexandrina, Chamædaphne. Column. ecphr. 1.
p. 164. t. 165. f. 1.
Habitat in Italiae devexis collium lateribus.
Hospitatur in Frigidario, perennis.
3. RUSCUS foliis supine floriferis sub foliolo. *Hort. cliff.*
466.
Hippoglossum. Dod. pempt. 745.
Hippoglossum dioscoridis seu Laurotaxa plinii. Co-
lumn. ecphr. 1. *p. 166. t. 165. f. 2.*
Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente. Baub.
pin. 304.
Pharm. UVULARIÆ Herba.
Habitat in umbrosis montibus Hungariæ, Liguriæ.
Hospitatur in Frigidario, perennis.



CLASSIS. XXIII.

POLYGAMIA

MONOECIA.

MUSA.

1. MUSA racemo simplicissimo. *Hort. cliff.* 467. *Fl. zeyl.* 368.

Musa cliffortiana. *Linn. mus.* 1. t. 1.

Musa. *Clus. exot.* 229. *Sterb. citric.* t. 4.

Ficus indica, fructu racemoso, folio oblongo. *Bauh. pin.* 508.

Palma humilis, longis latisque foliis. *Bauh. pin.* 107.

Habitat in calidiori India.

Hospitatur in Caldario, missa ab optimo Amico A. v. Royeno, Professore Leydensi. Magnificum munus, sed periit summo meo dolore, Perennis cæterum. Arborefcens herba.

ÆGILOPS.

1. ÆGILOPS spica ovata aristis brevior.

Ægilops. *Roy. lugdb.* 72. *Dod. pempt.* 72.

Ægilops altera. *Cam. epit.* 928.

Festuca altera, capitulis duris. *Bauh. pin.* 10. *theatr.* 151.

Gramen spicatum, durioribus & crassioribus locustis, spica brevi. *Scheuchz. gram.* 11.

Habitat ad agrorum margines Gallie Narbonensis, Campania, Sicilia.

Hospitatur sub dio, biennis. †

HOLCUS.

1. HOLCUS glumis villosis. *Hort. cliff.* 469

Milium arundinaceum, plano alboque semine. *Bauh. pin.* 26. *theatr.* 514.

Sorghi album, Milium indicum, Dora. *Daleck. hist.* 2. p. 449.

Habitat in Sicilia, Epiro, Arabia, culta, vix sponte.

Hospitatur in Caldario & sub dio, vix maturefcit, annua.

P A R I E T A R I A.

1. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis alternis.

Hort cliff. 469.Parietaria officinarum & dioscoridis. *Bauh. pin.* 121.Parietaria. *Dod. pempt.* 102.Helxinc. *Cam. epit.* 849.*Pharm.* PARIETARIÆ Herba.Habitat in *Europæ* australioris ruderatis, muris, siccis.Hospitatur *sub dio*, perennis.

V A L A N T I A.

1. VALANTIA floribus masculis trifidis hermaphroditici germini insidentibus, caulibus procumbentibus glabris.

Valantia procumbens glabra. *Hort. cliff.* 468.Valantia quadrifolia verticillata. *Tournef. act.* 1706. p. 86.Valantia annua quadrifolia verticillata, floribus ex viridi pallescentibus, fructu echinato. *Mich. gen.* 13. t. 17.Cruciata muralis minima romana. *Column. ecphr.* 1. p. 298. t. 297. *Moris. hist.* 3. p. 328. f. 9. t. 21. f. 2. *Magn. char.* 154. *Raj. hist.* 479.Rubeola echinata saxatilis *Bauh pin.* 334.Habitat in littore *Tyrrhenō*, in siccis, saxosis, antiquis parietibus *Monspeli*, *Nemausi*, *Liburni*, *Massiliæ*, *Romæ*.Hospitatur *sub dio*, annua.

2. VALANTIA floribus masculis trifidis hermaphroditici pedunculo insidentibus.

Aparine semine coriandri saccharati. *Park. theatr.*Aparine semine verrucoso. *Moris. hist.* 3. p. 322.Aparine fructu verrucoso. *Raj. hist.* 484.Aparine semine lævi. *Vaill. parif.* 14. t. 4. f. 3. opt.Habitat inter segetes *Monspeli*, *Siciliæ*, *Germaniæ*.Hospitatur *sub dio*, annua.

Desc. Caules diffusi pedales tetragoni, ramosi inferne, angulis aculeis recurvis armati. Folia verticillata sena, lanceolata lævia utrinque, sed margine & stria carinali aculeata, aculeis versus apicem (non recurvis) flexis. Pedunculi ad verticillos bini vel tres cum ramo, teretes, quadrifariam sulcati, reflexi, aculeati, terminati flore hermaphrodito: germine didymo, corolla quadripartita alba. Staminibus 4, antheris luteis stylo duplici capitato

pitato. Juxta florem hermaphroditicum pedunculi duo, singuli sustinentes florem (raro duos) masculum trifidum. staminibus 3, stylis 2 absque germine, hi pedunculi laterales persistentes sunt. Fructus ex baccis geminis exsuccis globosis: tectis tuberculis mollibus conicis, verruca similibus.

3. VALANTIA floribus masculis quadrifidis, pedunculis nudis.

Cruciata orientalis latifolia erecta glabra. *Tournef.*

cor. 4.

Habitat in *Ægypto*.

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix fibrosa. Caulis (uti tota planta) erectus glaber tetragonus vix ramosus nisi ad basin. Folia quaterna, sessilia, cordata, concava, reflexa, glabra. Pedunculus inter singula folia, dichotomus, flore unico hermaphrodito, masculis vero magis pedunculatis 4 vel 6: omnibus luteis quadrifidis. Pedunculi carent duobus foliolis parvis, quibus sequens instruitur. Maturæ plantæ folia omnia reflexa sunt, pulchre semina occultantia; tum articuli caulis discedunt & folia a vento pelluntur cum seminibus.

4. VALANTIA floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis.

Galium foliis quaternis, flosculis in alis confertis.

Hort. cliff. 34. *Hall. helv.* 462.

Cruciata hirsuta. *Bauh. pin.* 335.

Cruciata minor. *Lob. ic.* 804.

Cruciata. *Dod. pempt.* 257.

Habitat ad vias Germaniæ, Helvetiæ, Galliæ.

Hospitatur sub dio, perennis.

A T R I P L E X.

1. ATRIPLEX caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hort. cliff.* 469.

Atriplex hortensis alba seu pallide virens. *Bauh. pin.* 119.

Atriplex hortensis. *Dod. pempt.* 615.

β. Atriplex hortensis rubra. *Bauh. pin.* 119.

Atriplex spuria rubra hortensis. *Volk. norib.* 53.

Pharm. ATRIPLICIS SATIVÆ Herba, Semina.

Svecis: Molla.

Habitat in deserto oreburgensi.

Hospitatur sub dio, annua.

2. ATRIPLEX foliis deltoidibus sinuatis undulatis alternis.

Atri-

Atriplex tatarica maxima, folio laciniato viridi, semine splendente. Gerb. samar. 290.

Habitat in Tataria,

Hospitatur sub dio, annua.

Desc. Radix annua. Caules erecti, longi, ramosi teretiusculi glabri tripedales.

Folia alterna deltoidea sinuata, acuta, undulata, coarctata, parum viridia.

Racemi seu spicae terminales. Seminum involucra ovata acuta ad oris margines utrinque minimo denticulo, extus laevia. Sero admodum floret.

Flosculi hermaphroditi saepius abortiunt.

D I O E C I A.

F R A X I N U S.

1. *FRAXINUS floribus completis. Hort. cliff. 470.*

Fraxinus humilior seu altera theophrasti minore & tenuiore folio. Baub. pin. 416.

Ornus. Dalech. hist. 83. male.

Pharm. MANNA calabrina, granulata.

Svecis Manna-trä.

Habitat in Hetruria, Italia, Lugduni Gallorum.

Hospitatur in Frigidario, Arbor.





CLASSIS. XXIV.

CRYPTOGAMIA

PLANTÆ.

FICUS.

1. FICUS foliis palmatis. *Hort. cliff.* 471. *Hegardt.*
Fic. I. n. 1.

Mas.

Caprificus. *Bauh. hist.* 1.
p. 134.

Femina.

Ficus communis. *Bauh.*
pin. 457.

Ficus. *Dod. pempt.* 812.

- β. Caprificus præcox, fructu nigricante parvo deciduo. *Pont. anth.* 229.

- β. *Ficus sativa*, fructu atro-rubente polline cæcio adperso. *Tournef. inst.* 663.

Theenah. *Cels. hierob.* 2.
p. 153.

Pharm. CARTICÆ pingues.
Swecis. Fikon-trä.

Habitat in Gallia Narbonensi, Hispania, Italia, Græcia.
 Hospitatur sub dio, hybernat in Frigidario. Arbor.

INDETERMINATA.

HYMENÆA.

1. HYMENÆA. *Hort. cliff.* 484.

Ceratia diphylls antegoana, ricini majoris fructu nigro, filiqua grandi incluso. *Pluk. alm.* 96. t. 82. f. 2.
 Arbor filiquosa ex qua Gummi Elemi ellicitur. *Bauh.*
pin. 404.

Courbaril bifolia, flore pyramidato. *Plum. gen.* 49.

Habitat in Brasilia.

Hospitatur in Caldario. Arbor.

P H O E N I X.

1. PHOENIX frondibus pinnatis, foliolis alternis ensi-
formibus basi complanatis, petiolis compressis dor-
so rotundatis. *Hort. cliff.* 443.

Palma mas *Kæmpf.*
amæn. 668. & 686.
t. 1, 2 *f.* 1, 3.

Palma hortentis. *Kæmpf.* *amæn.* 668. 686. *t.* 1. 2
f. 2. 6. 11.

Palma major. *Baub. pin.* 506

Palma dactylifera major vull-
garis *Sloan. hist.* 2. p 174

Palma. *Baub. hist.* 1. p. 351
Raj. hist. 1352. *Doa-*
pempt. 819.

Pharm. DACTYLI fructus
Ossa.

Svecis Palm-trå.

Pharmac. DACTYLI recentes.

Habitat in utraque India calidissima,
Hospitatur in Caldario. Arbor.



NOMINA BOTANICA.

A.

A <i>Brotanum</i>	252. 256. 257.	<i>Aminautia</i>	30.
<i>Abrus</i>	222.	<i>Amni</i>	59. 63.
<i>Absinthium</i>	256. 257.	<i>Ammonium</i>	1.
<i>Abutilon</i>	198.	<i>Amorpha</i>	208.
<i>Acacia</i>	102. 146. 208. 212. 298.	<i>Amygdales</i>	123.
<i>Acalypha</i>	290. 291.	<i>Anacampseros</i>	146. 147. 116.
<i>Achaurus</i>	181.	<i>Anacardium</i>	103.
<i>Acanthium</i>	249.	<i>Anagallis</i>	38.
<i>Acer</i>	93. 34.	<i>Anagyris</i>	211. 210.
<i>Acetosa</i>	89. 90.	<i>Ananas</i>	73.
<i>Achillea</i>	265.	<i>Anandria</i>	259.
<i>Achyrophorus</i>	240.	<i>Ananthocyclus</i>	266.
<i>Acinos</i>	9.	<i>Anapodophyllum</i>	137.
<i>Aconitifolia</i>	137.	<i>Anascardi</i>	247.
<i>Aconitum</i>	151. 152. 138. 158. 269.	<i>Analtatica</i>	183.
<i>Actæa</i>	138.	<i>Andrachne</i>	285.
<i>Adaschim</i>	224.	<i>Androsamum</i>	237.
<i>Adhatoda</i>	8. 179.	<i>Androsace</i>	36.
<i>Admirabilis</i>	43.	<i>Andayala</i>	240.
<i>Adonia</i>	157.	<i>Anemone</i>	155.
<i>Adonis</i>	156.	<i>Anemonospermus</i>	275.
<i>Aegilops</i>	301.	<i>Anethum</i>	66.
<i>Aeschynomene</i>	233. 144. 145.	<i>Angelica</i>	62. 70.
<i>Agave</i>	87.	<i>Anguria</i>	292. 293.
<i>Agem</i>	67.	<i>Anil</i>	209.
<i>Ageratum</i>	153. 265.	<i>Anisum</i>	67.
<i>Agrifolium</i>	32.	<i>Anonis</i>	210.
<i>Agrimonia</i>	118. 148.	<i>Anonyma</i>	2.
<i>Aizoon</i>	127.	<i>Antanifobhyllum</i>	2.
<i>Alaternus</i>	47.	<i>Anthericum</i>	83.
<i>Alcea</i>	204. 147. 199. 201. 202. 205. 206.	<i>Antholyza</i>	16.
<i>Alkekengi</i>	50.	<i>Anthora</i>	152.
<i>Allium</i>	73. 76. 77. 78. 79. 80.	<i>Anthyllis</i>	221.
<i>Aloe</i>	85. 86. 87. 88.	<i>Antirrhinum</i>	174. 175. 176.
<i>Alopecurus</i>	20.	<i>Antithora</i>	152.
<i>Alune</i>	23. 12. 24. 70. 95. 109.	<i>Aparine</i>	28. 30. 302.
<i>Aethæa</i>	204. 205.	<i>Aphaca</i>	218.
<i>Althæa</i>	195. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 205.	<i>Abiastrum</i>	163.
<i>Alypum</i>	142.	<i>Abios</i>	216. 227.
<i>Alyssum</i>	165. 185. 186.	<i>Apium</i>	67. 59. 62.
<i>Amaranthoides</i>	57.	<i>Apocynum</i>	53. 54. 178.
<i>Amaranthus</i>	285. 286. 31. 52.	<i>Aquifolium</i>	32.
<i>Amaryllis</i>	75.	<i>Aquilegia</i>	152. 153.
<i>Ambrosia</i>	284.	<i>Arabis</i>	191. 192.
<i>Amberbi</i>	271.	<i>Arachidna</i>	48. 216. 229.
<i>Ameri</i>	209.	<i>Arachis</i>	228.
<i>Amethystea</i>	9.	<i>Aralia</i>	70.
<i>Amethystina</i>	9.	<i>Arbores baccifera</i>	108.
		<i>juda</i>	59.
		U 2	Ar-

NOMINA BOTANICA.

Arbor Mexicana	148.	Bixa	148.
- Tulipiphera	154.	Blattaria	45. 46. 179.
- Vita	289.	Blennochoes	3. 45.
Arctotheca	275.	Blitum	3. 286.
Arctotis	275.	Boerhavia	2.
Argemone	135. 136.	Bona	218.
Argusia	36.	Bon vel Ban	42.
Aristolochia	279.	Bonduc	101.
Armeniaca	124.	Borraginoides	34.
Armercins	111.	Borrigo	34.
Artedia	58.	Botrys	55. 56.
Artemisia	256. 257.	Brassica	189. 190. 191. 280.
Arum	279. 280.	Briza	20.
Arundo	1. 2. 19.	Bromelia	73.
Asclepias	53. 54.	Brovallia	179.
Ascyrum	237.	Brunella	172. 162.
Aspalatus	208. 212.	Bryonia	15.
Asparagus	84. 85.	Bryonoides	291.
Asperula	27.	Bubon	62.
Asphodelus	83.	Buffonia	12.
Aster	258. 260. 262. 263. 266.	Buglossum	34. 35. 241.
Astericus	264.	Bulbine	83.
Asteroides	264.	Bulbus	84.
Astragaloides	228.	Bunias	185.
Astragalus	225. 226. 227.	Bupthalmum	263. 264.
Athamanta	60.	Bupleuroides	57.
Atraphaxis	95.	Bupleurum	64.
Attractylis	252.	Byxus	283.
Atriplex	3. 56. 303. 304.	C.	
Atropa	45.	Cactus	119. 120. 121. 122.
Aurantia	236.	Cæsalpina	102.
Auricula	36. 230.	Cæsalpinoides	298.
Avena	20.	Calamintha	161.
B.		Calcitrapa	272.
Baccharis	257. 259.	Calendula	274.
Balam	15.	Calobotrychis	6.
Ballote	171.	Caltha	274.
Balsamina	277. 293.	Camara	180.
Balsamita	255.	Campanula	38. 40. 41.
Barba Jovis	208. 221. 222.	Canna	1.
Barbula hirci	243.	Cannabina	267.
Barkanim	132.	Cannabis	297.
Bauhinia	99.	Cannacorus	1.
Beben	111.	Cannoides	1.
Beid-el-offar	54.	Capnoides	207.
Belladonna	45.	Capparis	103.
Bellis	261. 265. 266.	Caprificus	305.
Belvedere	55.	Caprifolium	42.
Bermudiana	278.	Capficum	47.
Beta	56. 89. 90.	Caragana	212.
Betonica	105. 163. 164. 165. 177.	Cardamine	188.
Bidens	255. 247.	Cardaminum	93.
Bignonia	178.	Cardiaca	169. 171.
Biscutella	185.	Cardiospermum	97.
Bistorta	95.	Car-	

NOMINA BOTANICA.

<i>Cardispermum</i>	274.	<i>Chenopodium</i>	55. 56.
<i>Carduus</i> 73. 181. 248. 272. 239. 250. 273.		<i>Chondrilla</i> 239. 241. 243. 244. 245. 247.	
<i>Carelia</i>	253.	<i>Chrysanthemum</i> 258. 263. 264. 265.	
<i>Caretti</i>	102.		266. 267. 269. 270. 275.
<i>Carlina</i>	252.	<i>Chrysis</i>	268.
<i>Carota</i>	59.	<i>Chrysocoma</i>	252.
<i>Carpesium</i>	257.	<i>Cicer</i>	224. 226.
<i>Carthamus</i>	251.	<i>Cichorium</i>	247.
<i>Caryophyllus</i> 104. 105. 106. 107. 268.		<i>Cicuta</i>	62.
<i>Caschou</i>	102.	<i>Cicutaria</i>	62. 64.
<i>Cassia</i>	100. 101.	<i>Cinara</i>	251.
<i>Cassida</i>	172. 99.	<i>Cineraria</i>	273.
<i>Castanea</i>	92. 287.	<i>Cirsium</i>	250.
<i>Catananche</i>	247.	<i>Cistus</i>	143. 144.
<i>Cataputia</i>	140.	<i>Citreum</i>	236.
<i>Cataria</i>	164.	<i>Citria</i>	136.
<i>Caucalis</i>	58.	<i>Citrullus</i>	292.
<i>Ceanothus</i>	51.	<i>Citrus</i>	236.
<i>Cedronella</i>	167.	<i>Claytonia</i>	53.
<i>Celastrus</i>	52.	<i>Clematis</i> 53. 155. 156. 253. 279.	
<i>Celofia</i>	52.	<i>Cleome</i>	193. 194.
<i>Celsia</i>	179.	<i>Clinopodium</i>	9. 12. 161.
<i>Centarea</i> 270. 271. 272. 273.		<i>Clitoria</i>	214. 215.
<i>Centaurium</i>	271.	<i>Clymenum</i>	257.
<i>Cepa</i> 77. 78. 79. 80.		<i>Clypeola</i>	185.
<i>Cephalanthus</i>	25.	<i>Cneorum</i>	14.
<i>Cerasa</i>	125.	<i>Cnicus</i>	250. 251.
<i>Cerastium</i>	115.	<i>Cochlearia</i>	184.
<i>Cerasus</i> 108. 125. 106.		<i>Coffea</i>	41.
<i>Ceratia</i> 99. 207. 305.		<i>Coix</i>	281.
<i>Ceratocarpus</i>	281.	<i>Colchicum</i>	90.
<i>Ceratocephaloides</i>	270.	<i>Colocasia</i>	280.
<i>Ceratocephalus</i>	270.	<i>Colocynthis</i>	293.
<i>Ceratonia</i>	296.	<i>Colutea</i>	228.
<i>Ceratosperrum</i>	281.	<i>Coma</i>	252.
<i>Cercis</i>	99.	<i>Commelina</i>	18.
<i>Cereus</i> 119. 120. 121.		<i>Consolida</i>	150.
<i>Cerinthe</i> 35. 36.		<i>Contrajerva</i>	225.
<i>Cervaria</i> 41. 59.		<i>Convolvulus</i>	38.
<i>Chærophylum</i> 60. 64.		<i>Conyza</i> 253. 256. 257. 258.	
<i>Chaleejos</i>	248.	<i>Conyzella</i>	258.
<i>Chamaecerasus</i>	43.	<i>Conyzoides</i>	257.
<i>Chamaecrista</i>	101.	<i>Coval</i>	207.
<i>Chamaedryfolia</i>	117.	<i>Corallodendron</i>	207.
<i>Chamaedrys</i> 159. 160.		<i>Corchorus</i>	147.
<i>Chamaeiris</i>	17.	<i>Coreopsis</i>	269. 270.
<i>Chamaelea</i>	14.	<i>Coriandrum</i>	63.
<i>Chamaeleon</i>	274.	<i>Coriaria</i>	299.
<i>Chamaemelum</i> 263. 266.		<i>Corindum</i>	97.
<i>Chamaepithys</i> 160.		<i>Coriotrigenatodendros</i>	295.
<i>Charantia</i> 293.		<i>Coris</i>	46.
<i>Cheiranthus</i> 187. 188.		<i>Corispermum</i>	2. 3.
<i>Coelidonium</i> 137.		<i>Cornus</i>	29.
<i>Chenopodio-Morus</i> 3.		<i>Corona</i>	82. 265. 268.
			Coro-

NOMINA BOTANICA.

Coronaria	115.	Pseudo-Dictamnium	169.
Coronilla	234. 235.	Pseudo-Dictamnus	169.
Coronopus		Diervilla	42.
Corrigiola	70.	Digitalis	176. 178.
Corylus	286.	Dimorphotheca	274.
Costus	2.	Dipsacus	25. 26.
Cotula	266.	Dioscorea	297.
Cotyledon	108.	Dolichos	15. 214.
Coumaril	305.	Dorycnium	225.
Cracca	219.	Draba	184. 186. 192.
Crambe	182. 186. 193.	Draco	256.
Crassula	147.	Dracocephalum	165. 166. 167.
Crataegus	126.	Dracunculus	256. 265.
Crepis	238. 239. 243.	Duglassia	181.
Crinum	76.	E.	
Crista pavonis	102.	Echino Melocactus	119.
Critium	61.	Echinophora	58.
Crocodylium	248.	Echinops	248.
Crocus	15.	Echinopus	248.
Crocum	15.	Echioides	35.
Crotalaria	210.	Echium	35.
Croton	290.	Flægus	31.
Crucianella	27.	Elatine	175.
Cruciata	302. 303.	Elephantopus	247.
Crupina	271.	Elleborum	158.
Cucubalus	109. 110.	Elleborus	158.
Cucumis	15. 291. 292. 293. 294.	Elichrysium	256.
Cucurbita	291. 292.	Eliocarpus	84.
Cuminoides	52.	Elymus	22.
Cuminum	52.	Endivia	247.
Cumila	169.	Epazotl	56.
Cupressus	288. 289.	Ephemerum	18. 73.
Cyanus	270. 271.	Epimedium	29.
Cyclamen	47.	Evangelia	74.
Cyclaminus	47.	Eranthemum	156.
Cymbalaria	175.	Erigeron	258. 259.
Cynanchum	54.	Eriophorus	240.
Cynara	251.	Eruca	190. 191. 192.
Cynoglossa	33.	Erucago	187.
Cynoglossoides	34.	Ervilia	215.
Cyperus	19.	Ervum	224.
Cynoglossum	33. 34.	Eryngium	57.
Cysticapnus	207.	Erysimum	96. 192. 193.
Cytisus	209. 210. 211. 221. 230.	Erythrina	207.
D.		Erythronium	82.
Daphne	94.	Esculus	92.
Daphnoides	94.	Esula	140. 141. 143.
Datura	43. 44.	Eupatorium	253. 254.
Daucus	59. 60. 67.	Euphorbia	138. 139. 140. 141. 142. 143.
Delphinium	150. 151.	Euphorbium	138. 139.
Dens canis	82.	Evonymoides	52.
Dentaria	137.	Evonymus	30. 52.
Dentellaria	43.	F.	
Dianthus	104. 105. 106.	Faba	218.
Dictamnus	102.	Fba-	

NOMINA BOTANICA.

Fabago	-	-	103.		tyemulum	20.
Fagonia	-	-	103.		Granadilla	278.
Fagopyrum	-	-	96.		Grevia	279.
Fago-triticum	-	-	96.		Grossularia	51.
Fagus	-	-	287		Guajabo	122.
Falcata	-	-	230		Guajava	102
Fel-fel-tavil	-	-	140.		Guilandina	101
Ferrum	-	-	233.		H.	
Ferula	-	-	61.		Hadas	123.
Festuca	-	-	301.		Hæmanthus	88.
Picoidea	-	-	127.		Halicacabum	50
Ficoides	-	119. 121. 127. 128. 129.	129.		Harmala	144.
Ficus	-	120. 127. 301. 305.	305.		Hedera	91.
Filipendula	-	-	131.		Hedypnois	246.
Flammula	-	-	155.		Hedysarum	226. 231. 232. 233. 234.
Flos Adonis	-	-	156.		Helenia	266.
- Clitoridis	-	-	214.		Heleniastrum	266.
- pavonis	-	-	101.		Helenium	268. 269.
- passionis	-	-	277.		Helianthemum	144.
- Constantinopolitanus	-	-	115.		Helianthes	70.
- regius	-	-	150.		Helianthus	264. 268.
Foeniculum	-	-	61. 63. 66.		Heliotropium	33. 290.
Foenum	-	-	229.		Helleborastrum	158.
Fragaria	-	-	133. 134.		Helleborus	157. 158.
Fraxinella	-	-	102.		Helminthotheca	141.
Fraxinus	-	-	304.		Helxine	96. 302.
Fritillaria	-	-	53. 81. 82.		Hemerocallis	81. 88.
Frutex	-	-	30.		Hepatica	155.
Fumaria	-	-	207.		Heptaphyllum	133.
					Heracleum	65.
					Herba Studioforum	55.
					- venti	171.
					Hermannia	195.
					Herniaria	54. 55.
					Hesperis	187. 188. 192.
					Hibiscus	205. 206.
					Hieracioides	238. 239. 245.
					Hieracium	238. 239. 240. 241. 244.
						245.
					Hippocastanum	92.
					Hiprocrepis	233.
					Hippoglossum	300.
					Holeus	301.
					Hordeum	22. 23.
					Horminum	10. 11.
					Hum	44.
					Hyacinthus	76. 85.
					Hymenæa	305.
					Hyoscyamus	44.
					Hyoseris	241.
					Hypecoum	31. 32.
					Hypericum	131. 236. 237.
					Hypocharis	240. 241.
						Hyss-

NOMINA BOTANICA.

<i>Hystopifolia</i>	118.	<i>Lantana</i>	180. 69.
<i>Hystopus</i>	162. 163.	<i>Lapathum</i>	89. 95. 98. 297.
<i>Hysterophorus</i>	285.	<i>Lappula</i>	57. 148.
I.		<i>Lapsana</i>	245. 146.
<i>Jacea</i>	255. 270. 271. 272.	<i>Lathyris</i>	140.
<i>Jacobaea</i>	252. 269. 261. 273.	<i>Lathyroides</i>	229.
<i>Jacobaeastrum</i>	273.	<i>Lathyrus</i>	216. 217. 218.
<i>Jalappa</i>	43.	<i>Laureola</i>	94.
<i>Jasminoides</i>	47.	<i>Lauro-Cerasus</i>	186.
<i>Jasminum</i>	4. 5. 39. 41. 103.	<i>Laurus</i>	69. 98. 300.
<i>Jatropha</i>	290.	<i>Lavandula</i>	162.
<i>Iberis</i>	184.	<i>Lavatera</i>	202. 203.
<i>Ibipitanga</i>	108.	<i>Ledum</i>	144.
<i>Ilex</i>	32.	<i>Lens</i>	220. 224.
<i>Impatiens</i>	276.	<i>Lentiscus</i>	296.
<i>Imperatoria</i>	62. 65.	<i>Leonurus</i>	170. 171.
<i>Indigo</i>	209.	<i>Lepidium</i>	183. 184.
<i>Indigofera</i>	208. 209.	<i>Leucacantha</i>	273.
<i>Insechi</i>	1.	<i>Leucosium</i>	73. 74. 185. 186. 187.
<i>Intubum</i>	247.		188. 192.
<i>Intubus</i>	247.	<i>Leuco Narcisso-Lirion</i>	73.
<i>Fontiblaspi</i>	185.	<i>Levisticum</i>	82.
<i>Ipomoea</i>	39.	<i>Libanotis</i>	60. 61.
<i>Iris</i>	193.	<i>Ligusticum</i>	62.
<i>Iris</i>	16. 17. 18.	<i>Ligustroides</i>	181.
<i>Isatis</i>	193.	<i>Ligustrum</i>	6. 181.
<i>Isopyrum</i>	157.	<i>Lilac</i>	6. 7.
<i>Juglans</i>	286.	<i>Lilio-Asphodelus</i>	76. 88.
<i>Juniperus</i>	299.	<i>Lilium</i>	76. 80. 81. 82. 83.
<i>Jussiaea</i>	103.	<i>Limnia</i>	52.
<i>Justicia</i>	7.	<i>Limonium</i>	71.
<i>Iva</i>	285.	<i>Linaria</i>	55. 174. 175.
<i>Ixia</i>	16.	<i>Linum</i>	34. 37. 71. 72.
K.		<i>Liquidambar</i>	287.
<i>Kampferia</i>	2.	<i>Liriodendrum</i>	154.
<i>Kali</i>	56. 127. 129.	<i>Lithospermum</i>	281.
<i>Karatas</i>	73.	<i>Lobelia</i>	276.
<i>Katsula-Kelengu</i>	2.	<i>Lobus</i>	101.
<i>Ketmia</i>	205. 206.	<i>Locusta</i>	14.
<i>Kikajon</i>	289.	<i>Lonicera</i>	42.
<i>Kleinia</i>	254.	<i>Lophanthus</i>	162.
<i>Knautia</i>	27.	<i>Lotus</i>	220. 221. 223.
<i>Konui</i>	228.	<i>Ludvigia</i>	30. 103.
<i>Kua</i>	2.	<i>Luffa</i>	293.
L.		<i>Lunaria</i>	186. 230.
<i>Lablab</i>	214.	<i>Lupinaster</i>	223.
<i>Laburnum</i>	210.	<i>Lupinus</i>	209. 194.
<i>Lacryma job</i>	281.	<i>Lupulus</i>	97.
<i>Lactuca</i>	242. 244.	<i>Lychnidea</i>	38.
<i>Lagoesia</i>	52.	<i>Lychnis</i>	43. 106. 108. 109. 110.
<i>Lagopodium</i>	222.		111. 112. 113. 114. 115.
<i>Lagopogon</i>	222.	<i>Lychni-scabiosa</i>	27.
<i>Lagurus</i>	20.	<i>Lycium</i>	47.
<i>Lamium</i>	172. 173. 177.	<i>Lycapenseon</i>	49.
		<i>Majo</i>	

NOMINA BOTANICA.

<i>Lycopsis</i>	34. 35.
<i>Lythymachia</i>	30. 37. 94. 103. 176.
<i>Lythrum</i>	118.
M.	
<i>Magistrantia</i>	65.
<i>Mabaleb</i>	125.
<i>Majorana</i>	161.
<i>Mala</i>	49. 124. 130.
<i>Malacoides</i>	206.
<i>Malope</i>	206.
<i>Malpighia</i>	108.
<i>Malus</i>	122. 224. 130. 236.
<i>Malva</i>	198. 200. 201. 202. 203. 204. 206.
<i>Malvinda</i>	199. 200.
<i>Mandarin</i>	99.
<i>Martynia</i>	176.
<i>Marrubiastrum</i>	169.
<i>Marrubium</i>	169. 170. 171.
<i>Marum</i>	159. 161.
<i>Mastichina</i>	161.
<i>Matricaria</i>	263. 285.
<i>Mays</i>	281.
<i>Medica</i>	229. 230.
<i>Medicago</i>	229. 230.
<i>Medium</i>	40.
<i>Melampyrum</i>	157.
<i>Melanthium</i>	153. 154.
<i>Melianthus</i>	181.
<i>Melica</i>	20.
<i>Melilotus</i>	223. 224. 229.
<i>Melissa</i>	161. 163. 166. 172. 173.
<i>Melissophyllum</i>	163. 166.
<i>Melo</i>	292.
<i>Meloeactus</i>	119.
<i>Nelochia</i>	195. 147.
<i>Melongena</i>	49.
<i>Melothria</i>	15.
<i>Menispermum</i>	91.
<i>Mentha</i>	164. 168. 255.
<i>Mercurialis</i>	298. 291.
<i>Mesembryanthemum</i>	127. 128. 129.
<i>Mespilus</i>	126. 129. 130.
<i>Mestermidia</i>	36.
<i>Meum</i>	60.
<i>Micropus</i>	275.
<i>Milium</i>	20. 301.
<i>Millefolium</i>	265.
<i>Millieria</i>	275.
<i>Mimosa</i>	144. 145. 146. 233.
<i>Mimulus</i>	176.
<i>Mirabilis</i>	43.
<i>Mitella</i>	148.
<i>Moerhingia</i>	95.
<i>Moldavica</i>	165. 166. 167.
<i>Molochus</i>	224.

<i>Mollugo</i>	24.
<i>Molucca</i>	172.
<i>Moluccella</i>	172.
<i>Moly</i>	76. 78.
<i>Momordica</i>	293. 294.
<i>Monarda</i>	12.
<i>Momilifera</i>	275.
<i>Monstrosa</i>	82.
<i>Morocarpus</i>	31.
<i>Morus</i>	283.
<i>Moul-elavon</i>	148.
<i>Musa</i>	301.
<i>Muscari</i>	85.
<i>Muscipula</i>	110.
<i>Myagrurn</i>	182. 183.
<i>Myosotis</i>	115.
<i>Myosurus</i>	167.
<i>Myrrhis</i>	60. 64.
<i>Myrica</i>	295.
<i>Myrobatindum</i>	180.
<i>Myrtus</i>	123. 295.

N.

<i>Napus</i>	190.
<i>Narcissus</i>	74. 76.
<i>Nasturtium</i>	93. 183. 184. 186. 189.
<i>Nepeta</i>	163. 164.
<i>Nerium</i>	53.
<i>Neurada</i>	117.
<i>Nicotiana</i>	45.
<i>Nigella</i>	153. 154.
<i>Nigellastrum</i>	109.
<i>Niruri</i>	282.
<i>Nux</i>	44. 69. 287.
<i>Nyctanthes</i>	4.

O.

<i>Obeliscotheca</i>	269.
<i>Ochrus</i>	215.
<i>Ocymastrum</i>	14.
<i>Ocymoides</i>	109. 111.
<i>Ocymum</i>	96. 168. 169.
<i>Oenanthe</i>	63.
<i>Oenothera</i>	94.
<i>Olea</i>	31.
<i>Oleander</i>	53.
<i>Onphalodes</i>	34.
<i>Onobrychis</i>	231. 232.
<i>Ononis</i>	210.
<i>Onopordum</i>	249.
<i>Opulus</i>	69.
<i>Opuntia</i>	120. 121.
<i>Orchis</i>	2. 89.
<i>Oreoseltium</i>	59.
<i>Origanum</i>	161. 12.
<i>Orleana</i>	118.
<i>Or-</i>	

NOMINA BOTANICA.

Ornithogalum	-	84.	Philyca	-	-	47.
Ornithopodium	-	234.	Phlomis	-	46. 171. 172.	
Ornithopus	-	234.	Phlox	-	-	38.
Ornus	-	304	Phoenix	-	-	306.
Orobus	-	220. 224.	Phua	-	-	14.
Orvala	-	10. 11.	Phyllanthus	-	-	282.
Osteospermum	-	274.	Phyllis	-	-	57.
Ostruthion	-	65.	Physalis	-	-	49. 50.
Osyris	-	55. 295.	Phytanma	-	-	150.
Othonna	-	273. 268.	Phytolacca	-	-	117.
Oxalis	-	89. 116.	Picris	-	-	241.
Oxys	-	116.	Pilocella	-	-	238.
P.			Pimpinella	-	-	181. 288.
Pachyphylla	-	45.	Pinus	-	-	288.
Padus	-	126.	Piper	-	-	47.
Paeonia	-	149.	Pira	-	-	130.
Paliurus	-	46.	Pistacia	-	-	296. 69.
Palma	-	301. 306.	Pisum	-	215. 97. 219. 228.	
Panaces	-	65. 70.	Plantago	-	-	28. 29.
Panax	-	62. 65.	Platanoccephalus	-	-	25.
Panicum	-	19. 20.	Platanus	-	-	287.
Papaver	-	135. 136. 137.	Plumbago	-	-	43.
Parietaria	-	302.	Podophyllum	-	-	137.
Parkinsonia	-	99. 100.	Poinciana	-	-	101.
Paronychia	-	54.	Polemonium	-	-	40.
Partheniistrum	-	285.	Polianthes	-	-	76.
Parthenium	-	285.	Polium	-	-	159.
Passerina	-	37.	Polyacantha	-	-	250.
Passiflora	-	278.	Polygolifolia	-	-	70.
Pastinaca	-	59. 66.	Polygonum	-	95. 12. 55. 70.	
Paulinia	-	97.	Poma	-	-	49. 130.
Pecten	-	64.	Populus	-	-	298.
Pekaim	-	294.	Porophyllum	-	-	254.
Pentaphylloides	-	134.	Porrum	-	77. 78. 79. 80.	
Pentaphyllum	-	133.	Portulaca	-	146. 122. 147.	
Penthorum	-	116.	Potentilla	-	-	133. 134.
Peganum	-	102. 144.	Poterium	-	-	288.
Peplis	-	143.	Prasium	-	-	173.
Pepo	-	292.	Priapeja	-	-	45.
Pereeskia	-	122.	Primula	-	-	36. 37.
Perfoliata	-	64. 66.	Prina	-	-	124.
Periclymenum	-	42. 180.	Prunella	-	-	165.
Periploca	-	54.	Prunus	-	-	124.
Persica	-	127.	Psidium	-	-	122.
Persicaria	-	96.	Pforalea	-	-	225.
Petilium	-	82.	Psyllium	-	-	28. 29.
Petiveria	-	91.	Ptarinica	-	-	255. 265.
Petroselinum	-	63.	Pulegium	-	-	168.
Peucedanum	-	60. 61.	Pulsatilla	-	-	155.
Phaca	-	228.	Punica	-	-	122.
Phalangium	-	83. 84.	Pyra	-	-	130. 131.
Phalaris	-	19.	Pyretum	-	-	264.
Phaseolus	211. 213. 214. 215. 228.		Pyrus	-	-	130. 131.
Philadelphus	-	122.	Q.			
Phillyrea	-	5. 6.	Quamoclit	-	-	39.

NOMINA BOTANICA.

Quinquefolium - 133. 134. 193.

R.

Ranunculus - 156. 157.
 Rapa - 190.
 Raphanistrum - 187.
 Raphanus - 188.
 Rapistrum - 182. 193.
 Rapum - 56. 190.
 Rapunculus - 40. 41.
 Rapuntium - 276.
 Reseda - 149. 150.
 Retro - 248.
 Rhabarbarum - 98.
 Rhagadioloides - 246.
 Rhagadiolus - 245.
 Rhagrostis - 3.
 Rhamnus - 46. 47.
 Rhaponticum - 98.
 Rheum - 98.
 Rhododendrum - 53.
 Rhus - 68. 299.
 Ribes - 50. 51.
 Ribesium - 51.
 Ricinoides - 290.
 Ricinus - 289. 290.
 Rimmon - 122.
 Rivina - 31.
 Robinia - 212.
 Rogga - 22.
 Rosa - 132. 183. 205.
 Rosmarinum - 159.
 Rosmarinus - 11.
 Rubeolo - 27. 302.
 Rubia - 27. 28.
 Rubus - 133.
 Rudbeckia - 269. 270.
 Ruellia - 178. 179.
 Rumex - 89. 90.
 Ruscum - 300.
 Ruscus - 300.
 Ruta - 102. 144.
 Ruysciana - 165.

S.

Sabina - 299.
 Saccharum - 19.
 Salicaria - 118.
 Salix - 295.
 Salsola - 56.
 Salvia - 10.
 Sambac - 4.
 Sambucus - 69.
 Samolus - 42.
 Sampsucus - 161.
 Sanicula - 56. 57.

Santolina - 252.
 Saponaria - 106. 107.
 Satureja - 161.
 Satyrium - 89.
 Saururus - 91.
 Saxifraga - 107. 108. 161.
 Scabiosa - 26.
 Seandix - 64.
 Schadidacalli - 138.
 Schaked - 123.
 Schitta - 146.
 Schoeno Prasum - 79.
 Scilla - 84.
 Sclarea - 10.
 Scolymus - 244. 251.
 Scorpioides - 233. 234.
 Scorpiurus - 233.
 Scorzoneroides - 242.
 Scorzonera - 242.
 Scrophularia - 177.
 Scutellaria - 172. 173.
 Secale - 22.
 Securidaca - 226. 234. 235.
 Sedum - 24. 108. 116.
 Selinum - 59. 60. 63. 67.
 Sempervivum - 118.
 Senecio - 258. 260. 261. 262. 271.
 Senina - 100. 101. 229.
 Serpentaria - 81.
 Serratula - 248. 249.
 Sefeli - 58.
 Sicyoides - 291.
 Sicyos - 291.
 Sida - 198. 199. 200.
 Sideritis - 163. 165. 169. 171.
 Sigesbeckia - 267.
 Silene - 110. 111. 112. 113. 114.
 Siligo - 21.
 Siliqua - 15. 99. 296.
 Siliquastrum - 99.
 Silybum - 250.
 Simpla - 57.
 Sinapis - 191.
 Sinapi - 187. 191.
 Sinapistrum - 194.
 Sisarum - 62.
 Sison - 63.
 Sisybrium - 192. 193. 190.
 Sisyrrinchium - 278.
 Sitz xel Sitzdsu - 68.
 Sium - 62. 63.
 Smilax - 213.
 Smyrnium - 66.
 Solo

NOMINA BOTANICA.

<i>Solanoides</i>	-	31.	<i>Thysselinum</i>	-	59.
<i>Solanum</i>	48. 49. 31. 43. 44.		<i>Tillæa</i>	-	24.
	45. 50. 117.		<i>Tinus</i>	-	69.
<i>Solidago</i>	259. 260. 273.		<i>Tirucalli</i>	-	139.
<i>Sonchus</i>	244. 240. 241. 242.		<i>Tithymalo-Nissolia</i>	-	127.
<i>Sopber</i>	-	288.	<i>Tithymalus</i>	138. 139. 140. 141. 142.	
<i>Sorgho</i>	-	301.			143.
<i>Spartium</i>	-	208. 225.	<i>Tordylium</i>	-	58.
<i>Speculum</i>	-	40. 41.	<i>Toxicodendrum</i>	-	68.
<i>Spina</i>	-	273.	<i>Trachelium</i>	-	41.
<i>Spinacia</i>	-	296.	<i>Tradescantia</i>	-	73.
<i>Spinachia</i>	3. 90. 296.		<i>Tragium</i>	-	237.
<i>Spiræa</i>	-	131.	<i>Tragopogonoides</i>	-	241.
<i>Stæchas</i>	-	162.	<i>Tragopogon</i>	241. 242. 243. 244.	
<i>Stachys</i>	-	170. 165.	<i>Tribulus</i>	-	103.
<i>Stapelia</i>	-	53.	<i>Trifolium</i>	103. 116. 222. 223.	
<i>Staphis</i>	-	150.		221. 222. 223. 225. 230.	
<i>Staphylæa</i>	-	69.	<i>Trigonella</i>	-	239.
<i>Staphylodendron</i>	-	69.	<i>Trionum</i>	-	206.
<i>Statice</i>	-	71.	<i>Triticum</i>	-	21. 22.
<i>Stoebe</i>	-	247.	<i>Triumfetta</i>	-	148.
<i>Stoechas</i>	-	256.	<i>Tropæolum</i>	-	93.
<i>Stramonium</i>	-	44.	<i>Tsiana Kua</i>	-	2.
<i>Stratiotes</i>	-	265.	<i>Tsietti-mandaru</i>	-	101.
<i>Styrax</i>	123. 287.		<i>Tulipa</i>	-	82.
<i>Succisa</i>	-	26.	<i>Tulipifera</i>	-	154.
<i>Sumach</i>	-	68.	<i>Tuna</i>	-	120. 121.
<i>Sycamirus</i>	-	283.	<i>Tunica</i>	-	104.
<i>Syringa</i>	6. 122.		<i>Turrita</i>	-	192.
	T.		<i>Turritis</i>	-	191.
<i>Tagetes</i>	-	267. 268.	<i>Tussilago</i>	-	259.
<i>Taludama</i>	-	2.		U.	
<i>Tamarindus</i>	-	15.	<i>Ulex</i>	-	212.
<i>Tamarix</i>	-	69.	<i>Ulmaria</i>	-	131.
<i>Tanacetum</i>	254. 255. 267.		<i>Ulmifolia</i>	-	179.
<i>Tarconanthos</i>	-	285.	<i>Urnaria</i>	-	282.
<i>Tatula</i>	-	43.	<i>Urtica</i>	-	282.
<i>Teaschur</i>	-	283.	<i>Uvedalia</i>	-	274.
<i>Telephiastrum</i>	-	147.		V.	
<i>Telephioides</i>	-	285.	<i>Vaccaria</i>	-	107.
<i>Telephium</i>	-	70.	<i>Valantia</i>	-	302. 303.
<i>Terebinthus</i>	-	396.	<i>Valeriana</i>	-	13. 14.
<i>Ternatea</i>	-	214.	<i>Valerianella</i>	13. 14. 57. 254.	
<i>Tetragonia</i>	-	126.	<i>Valerianoides</i>	-	25.
<i>Tetragonocarpus</i>	-	126.	<i>Vella</i>	-	186.
<i>Teucrium</i>	159. 160. 173.		<i>Verbasculum</i>	-	37.
<i>Thamæcnemon</i>	-	107.	<i>Verbascum</i>	45. 46. 171. 179.	
<i>Theenab</i>	-	305.	<i>Verbena</i>	-	8.
<i>Thlaspi</i>	183. 184. 185. 186.		<i>Verbesina</i>	-	267.
<i>Thlaspidium</i>	-	184. 185.	<i>Veronica</i>	-	7. 175.
<i>Thuja</i>	-	289.	<i>Viburnum</i>	68. 69. 180.	
<i>Thymbra</i>	-	160. 161.	<i>Vicia</i>	218. 219. 220.	
<i>Thymus</i>	-	160. 161.		Vi.	
<i>Thyrstis</i>	-	106.			

NOMINA BOTANICA.

Vinca	53.	Xeranthemum	255.
Viola	276. 40. 93. 188.	Xiphium	18.
Virga	258. 259	Xylon	148, 203.
Viscago	109. 112. 113. 114.	Y.	
Vitex	68.	Yucca	88.
Vitis	50.	Z.	
Volkameria	181.	Zea	281. 21.
Volubilis	297.	Zecryton	23.
Vulneraria	221.	Zingiber	1. 2.
W.		Ziziphora	9.
Wanhom		Ziziphus	31.
X.		Zoote-boonen-bom	100
Xan hium	283. 284	Zygophyllum	103



NO-

NOMINA SVECICA.

A.

A	Ardakers	216.
	Abrodd	257.
	Amur	223.
	Ananas	73.
	Anemon	155.
	Anis	67.
	Appel	130.
	Blod-appel	130.
	Deärg-appel	130.
	Apricoler	124.

B.

	Basilica	169.
	Bergamotte	130.
	Bigarorier	125.
	Bjugg	23.
	Bohvete	96.
	Siberiskt	96.
	Bomull	203.
	Bon Chretien	131.
	Borst-näglikor	106.
	Borstorfe-aplen	130.
	Buxbom	283.
	Bönor	218.
	Häst-bönor	218.
	Kryp-	213.
	Turkiska-	213.

C.

	Calabass	291.
	Canariefrö	19.
	Candelträ	295.
	Castanie-trä	287.
	Ceder	299.
	Celleri	67.
	Chardon	251.
	Charlotter	79.
	Citron	236.
	- - Meliss	163.
	Coloquint	293.
	Coffe-trä	42.
	Cypress	288.

D.

	Däg och Natt	274.
	Den sköna	75.
	Desman-päron	131.
	Dill	66.
	Dragon	256.

E.

	Endivia	247.
--	---------	------

F.

	Fikonträ	305.
	Fänkål	66.

G.

	Granat-trä	122.
	Gräslök	
	Gumrik, Gumring	23.
	Gurka	292.

H.

	Hafre	211.
	Hampa-Frö	397.
	- - Gallrings	397.
	Hirs	203.
	Hvete-Bo-	96.
	- - Kubb-	21.
	Sommar-	21.
	Turkiskt	281.
	Vinter	211.
	Häst Castanier	92.
	Hör	711.

I.

	Indianiskt Krasse	93.
	Indigo	209.
	Ingefära	11.
	Iohannis bröd	29.
	lök	
	Jonæ Curbitz	289.
	Jonquille	75.
	Jord-gubbar	133.
	möls	216.
	päron	48.
	ärtskockor	269.
	Isop	162.

K.

	Kardor	25.
	Korn	23.
	Himmels	23.
	Kägel	23.
	Krapp	28.
	Krasse	183.
	Indianiskt	93.
	Kron-ärtskåckor	251.
	Krusbär - Ludne	51.
	Krus mentha	168.
	Kyndel	161.
	Kål-Blom	189.
	Grön	189.
	Hvit-hufvud	189.

Kål

NOMINA SVECICA.

Kål-Krus	189.	Passions-blomma	278.
Plumafie	190.	Perlica	124.
Rabi	190.	Perfillja	67.
Röd	189.	Krus	67.
Sallat	189.	Rot	67.
Saphoi	189.	Pimpinella	288.
Vinter	189.	Pion	149.
Käjsar-Krona	82.	Corall-Pion	149.
Körsbar	125.	Änkla-Pioner	149.
Fögel-	125.	Piplök	78.
Spaniska-	125.	Piommon	124.
Sylt-	125.	Pomerans	236.
Kyrfvel-Spanisk	64.	Pompa	292.
L.		Portulak	146.
Lactue	242.	Potatos	48.
Krus-	242.	Pytter	265.
Lager	98.	Påsklilja	74.
Libb-sticka	62.	Pärlegräs	256.
Liljor-Brandgula	81.	Päron-Desinan	131.
Hvita	80.	R.	
Kroll-	81.	Radis	188.
Lin	71.	Rhabarbar-munk	98.
Lök hvit	77.	äktä	98.
Röd-	77.	Ringblomma	274.
Pip-	78.	Rotva	190.
Gräs-	79.	Stikrofva	282.
Johannis	79.	Rosmarin	12.
M.		Rosor-Brokuga	132.
Malört-Romerisk	157.	Canel	132.
Mandekträ	123.	Gula	132.
Manna-trä	304.	Holländska	132.
Mastix-trä	-	Hvita	132.
Matram	263.	Jungfru	132.
Mejrain	161.	Sammets	267.
Melon	292.	Student	116.
Vatten-Melon	292.	Räckenbäll	78.
Molla	303.	Råg-Sommur-	-
Moreller	125.	Vinter-	31.
Morot	59.	Vär-	22.
Mullbärsträ	283.	Rödbeta	56.
Hvita	283.	S.	
Myrten	123.	Safflor	251.
Mästar-rot	65.	Saffran	15.
N.		Safver	161.
Nakna Jungfrur	90.	Saint foin	232.
Narciss	75.	Sallat-Hufvud	242.
Nattfiol	188.	Salvia	10.
Näglicka	104.	Svänisk	255.
Nötter-Lambertska	286.	Tysk	10.
Spaniska	286.	Sammets rosor	267.
Pimper	70.	Sempertin	250.
Palnträd	306.	Semperviv	86.
Palsternacka	66.	Senap-hvit	191.
		Sierf-	-

NOMINA SVECICA.

Sjersmin	5.		U.	
Skyffel-Korn	23.			
Snöboll	69.	Underträd	V.	289.
Solblomma	268.			
Spelt	21.	Vallmog		162.
Stoffer-blomma	34.	Valhöt-trä		287.
Student-röser	116.	Vaxträd		29.
Syra-Rommette	89.	Vinbär-hvita		51.
Spanisk	90.	Vintanka		50.
Säcker-rör	62.	Vintuta		103.
rör	19.	Vintergrön		53.
Säfvenbom	299.	lager		53.
			Å.	
T.		Älskogs-villa		44.
Tall-Spanisk	288.	Ärter-Fontenell		244.
Tazette	75.	Gröna		215.
Terpentins-träd	396.	Holländska		215.
Timian	160.	Har		215.
Tobak	45.	Kron		215.
Turkiska	45.	Kryp		215.
Tuberos	76.	Socket		215.
Tulpan	82.	Stora hvita		215.
träd	154.	Stora Kant		215.
Tulensköna	266.			
Töne-Engelska	132.			





PHARMACOPÆORUM PLANTÆ OFFICINALES.

A.

A Brotanum
Absinthium
Acacia

Acetosa
Ageratum
Alkekengi

Allium
Aloe

Althæa

Ammi

Amygdalus

Amylum

Anacardium

Anethum

Anisum

Antirrhinum

Aristolochia

Arum

Atriplex

Aurantia

Avena

B.

Balsamita

Basilica

Beta

Bombyx

Botrago

Botrys

Branca urfi

Buxus

C.

Canariense Semen

Cannabis

Carduus Benedictus
Mariæ

Carica

Carlina

Charthamus

Castanea

Cataputia major
minor

Cepa

Cerasus

257.

257.

146.

89.

265.

50.

77.

86.

205.

63.

123.

21.

102.

66.

67.

176.

279.

279.

303.

236.

21.

255.

169.

56.

204.

34.

56.

181.

283.

19.

297.

251.

250.

305.

25.

251.

287.

289.

140.

77.

125.

Cerevisia

Chamæpitys

Cheiri

Cicer

Citrullus

Citrus

Coffea

Colocyntis

Costus

Crocus

Cucumeris

Cucurbita

Cupressus

Cyclamen

D.

Dactylus

Datura

Daucus

Dictamnus

E.

Endivia

Eruca

Ervum

Euphorbium

F.

Faba

Foeniculum

Foenum

G.

Galanga

Galega

Gossypium

Granatus

H.

Helleborus

Hyssopus

I.

Jalappa

Jasminum

Imperatoria

Indigo

Iris

Juglans

23.

160.

187.

224.

292.

236.

42.

293.

2.

15.

292. 294.

291.

288.

47.

306.

44.

59.

102.

247.

190.

224.

139.

218.

66.

229.

2.

208.

204.

122.

158.

162.

43.

5.

65.

209.

16.

287.

Lacmus

NOMINA PHARMACEUTICA.

L.

Lacmus	-	290.
Lactuca	-	242.
Laurus	-	98.
Lavendula	-	162.
Lentiscus	-	296.
Levisticum	-	62.
Lilium	-	80.
Linum	-	71.
Liquiritia	-	231.
Lupinus	-	209.

M.

Majorana	-	161.
Manna	-	304.
Marum	-	159.
Mastix	-	296.
Matricaria	-	263.
Melilotus	-	223.
Melissa citrina	-	163.
- Turcica	-	136.
Melo	-	292.
Mentha	-	168.
Mercurialis	-	298.
Mezereum	-	94.
Morus	-	283.
Myrtus	-	123.

N.

Napha	-	226.
Nasturtium hortense	-	183.
- Indicum	-	93.
Nigella	-	154.

O.

Opium	-	136.
Orleana	-	148.
Orobüs	-	224.

P.

Papaver	-	135.
Parietaria	-	302.
Pastinaca	-	66.
Perfoliata	-	64.
Perfica	-	124.
Petroselinum	-	63. 67.
Phaseolus	-	213.
Pimpinella	-	288.
Pinus	-	288.
Piper	-	47.
Paeonia	-	149.
Polium	-	159.
Portulaca	-	146.

Pruna	-	124.
Psyllium	-	29.
Purio	-	77.
Pyretrum	-	264.

R.

Raphanus	-	188.
Raponticum	-	98.
Rapum	-	190.
Rhabarbarum	-	98.
Rosa	-	132.
Rosmarinus	-	11.
Rubia	-	28.
Ruscum	-	300.
Ruta	-	102.

S.

Sabina	-	299.
Saccharum	-	19.
Salvia	-	10.
Santolina	-	252.
Satureja	-	161.
Saponaria	-	106.
Scilla	-	84.
Sclarea	-	10.
Scorzonera	-	242.
Scrophularia	-	177.
Siliqua	-	296.
Spinacia	-	297.
Stæchas	-	162.
Staphisagria	-	150.
Storax liquida	-	287.
Styrax calamita	-	123.
Sumach	-	68.

T.

Tabacum	-	45.
Tamarix	-	69.
Tanacetum	-	255.
Terebintina	-	396.
Thymus	-	160.
Tunica	-	104.

U.

Uvularia	-	300.
----------	---	------

V.

Valeriana	-	13.
Vernix	-	68.
Vinca	-	53.
Viris	-	50.

Z.

Zingiber	-	1.
----------	---	----



SVECICÆ PLANTÆ

Ex

Diffitis provinciis Horto illatæ.

1. ARBORES.

L Igustrum *Fior. Svec.*
Cornus femina

Evonymus - -

Hedera - -

Lonicera - -

Ribes Grossularia - -

nigrum - -

Rubrum - -

Sambucus arborea - -

Berberis - -

Daphne - -

Cratægus - -

Pyrus (proprie) - -

Malus - -

Rosa canina - -

pumila - -

Rubus albus - -

maximus - -

Potentilla fruticosa - -

Genista tinctoria - -

fol. hyperici - -

Spartium - -

Coronilla Emerus - -

Betula nana - -

Fagus - -

Carpinus - -

Salix germanica - -

Hippophaë - -

Populus alba - -

nigra - -

Taxus - -

Atriplex Halimus - -

2. PERENNES.

Circæa minor *Fl. Sv.* 5.

131. Veronica maritima - 6.

133. Salvia pratensis - 28.

190. Schoenus *Agb.* - 35.

191. Scirpus sylvaticus - 38.

195. Aira odorata - 70.

196. Bromus altissimus - 88.

197. Avena nodosa - 98.

250. Elymus maritimus 106.

290. Globularia - 109.

311. Asperula odorata - 114.

398. Galium maximum - 117.

401. Plantago maritima - 127.

402. Sanguisorba - 130.

406. Cornus herbacea - 132.

407. Lithospermum offic. - 151.

408. Symphytum - 155.

409. Lyfimachia Nummularia 168.

416. Convolvulus maximus 174.

587. Polemonium - 175.

588. Eryngium maritimum 220.

589. Sanicula - 222.

590. Ligusticum scoticum 232.

777. Oenanthe aquatica - 236.

785. - cicutæ facie 237.

786. Sambucus Ebulus - 251.

813. Statice Limonium - 254.

815. Allium ursinum - 263.

820. Anthericum ossifragum 267.

821. - calyculatum 268.

825. - album - 269.

829. Convallaria verticillata 275.

SVECICA PLANTÆ.

(2. PERENNES.)

(2. PERENNES.)

Acorus	-	277.	Pisum maritimum	-	608.
Juncus foliis junci		282.	Lotus maritimus	-	610.
Epilobium maximum		305.	Trifolium fragiferum		613.
Chrysosplenium	-	317.	Ononis inermis	-	622.
Saponaria carolina	-	346.	spinosa	-	623.
Saxifraga multiflora		356.	Hypericum villosum		626.
Cucubalus Behen	-	360.	Leontodon alterum	-	628.
Sedum rupestre	-	388.	Scorzonera sylvestris		647.
Afarum	-	392.	Carduus fol. helenii		659.
Sempervivum	-	395.	Eupatorium cannabin.	-	665.
Rubus septentrionalis		412.	Artemisia carolina	-	669.
Euphorbia fruticosa	-	430.	Seriphium	-	683.
Aconitum lycoctonum		441.	Tussilago Pellafites	-	671.
Napellus	-	442.	Doronicum Arnica	-	684.
Aquilegia	-	443.	Inula. Conyza	-	694.
Pulsatilla hirsuta	-	448.	Helenium	-	695.
Anemone lutea	-	451.	Asteriodes	-	696.
Thalictrum majus	-	452.	After Tripolium	-	697.
arvense	-	454.	Viola officinarum	-	715.
Adonis perennis	-	456.	Orchis hians	-	725.
Ranunculus fluviatilis		457.	minor	-	726.
polyanthos		467.	Satyrrium flore nigro.		731.
Helleborus Trollius	-	474.	repens	-	732.
Teucrium Scordium		476.	Serapias	-	734.
Ballota	-	484.	Cypripedium calceolus		735.
Nepeta	-	486.	Muscæ facie	-	737.
Linnaea	-	522.	Calla	-	744.
Alyssum fruticosum		528.	Bryonia	-	790.
Alcea major	-	582.	Mercurialis	-	823.
odorata	-	583.	Rhodiola	-	831.
Astragalus dulcis	-	591.	Ophioglossum	-	839.
Lathyrus sylvestris	-	598.	Osmunda struteopteris	-	841.
purpurascens		1139.			

SVEVICÆ PLANTÆ.

3. ANNUÆ.

Veronica clinopodii	-	15.	Lunaria	-	529.
hederæ fol.	-	18.	Lepidium pygmæum	-	535.
Verbena	-	26.	Ifatis	-	543.
Panicum parvum	-	54.	Raphanus arvensis	-	568.
Aira villosa	-	68.	Geranium lucidum	-	574.
Lolium annuum	-	103.	dissectum	-	576.
Sherardia	-	113.	villosum	-	577.
Plantago Coronopus	-	126.	roschalum	-	579.
Aphanes	-	137.	Anthyllis rubra	-	594.
Echium	-	158.	Vicia foetida	-	601.
Anagallis	-	169.	Trifolium lupul. rep.	-	618.
Datura	-	185.	melilotus	-	619.
Chenopodium rubrum	-	210.	Sonchus lapponicus	-	644.
daturæ fol.	-	214.	Prenanthes	-	645.
repandum	-	215.	Cichorium	-	650.
vulvaria	-	216.	Carduus nutans	-	655.
Angelica fativa	-	233.	Senecio jacobæa	-	688.
Cicuta aquatica	-	239.	radiola	-	689.
Scandix hispidula	-	241.	Chrysanthemum luteum	-	699.
Spergula nodosa	-	378.	Matricaria Chamomilla	-	701.
Potentilla Fahlunensis	-	420.	Cnicus achanthoides	-	711.
Refeda Luteola	-	439.	Jasione	-	713.
Ranunculus echinat.	-	470.	Impatiens	-	722.
Melampyrum arvense	-	511.	Xanthium	-	778.





MACELLUM SVECICUM.

I. AGRI.

1. ÅKRAR.

CEREALES.

Hvete vinter-
Sommar-
Kubb-

Spält.
Råg Vinter-
Sommar.

Korn.
Himmels-
Kågel-
Skyffel-

Gumring-
Hafre Svart-
Hvit-

Canarie frö

Gers

Hirs

Bohvete

Siberiskt.

Triticum hyemale 2.
Æstivum 1.
Typhinum 3.

Spelta 4.
Secale hybernum α.
Vernum β.

Hordeum polystichum 1.
decorticatum 2.
equilaterum 3.
zeocriton 5.
distichum 4.

Avena nigra α.
alba β.

Phalaris 1.
Panicum vulgare 1.
Milium 2.

Helxine cerealis 2.
Siberica 1.

2. GÅRDAR.

MONOTROPÆA.

Hummelgård
Kålgård
Rofgård

Humulus.
Brassica
Rapa.

3. PLANTERING.

Tobak.
Karder
Krap
Veide
Vån
Saffran
Lin
Hampa
Oliefrö

Nicotiana.
Dipsacus.
Rubia.
Isatis.
Reseda.
Crocus.
Linum.
Cannabis.
Brassica Napus.

II. RA-

MACELLUM SVECICUM.

II. RADICES.

I. *Vulgares.*

Kåhl rot-
rabi
Rofva
Stick-
Morot gul-
hvit
röd
Palsternacka
Hafverot
Skorfoner-rot
Rapuntzel rot-
Socker-rot
Potatos
Artfkåck-jord
Perfilie-rot

Brassica
gongylodes
Rapum
Napus.
Daucus

Pastinaca.
Tragopogon.
Scorzonera.
Campanula.
Sium Sifarum.
Solanum Papas.
Helianthus,
Apium.

2. *Frequentes.*

Beta röd-
Selleri
Råttika månads:
vinter-
Radis
Peppar-rot
Lök hvit.
röd-
Purio
Råckenbäll
Scharlotter

Beta rubra,
Apium.
Raphanus vulgaris.
niger.
Radicula.
Cochlearia Armoracia.
Allium Sativum.
Cepa.
Porrum,
Ophioscorod.
Ascalonica.

MACELLUM SVECICUM.

III. HERBÆ.

I. *Vulgares.*

Kåhl grön-
röd-
hvit-
fophoi-
krus-
vinter-
plumafic-
Mangolt
Molla hvit
röd
Spinat
Endivia
Cichoria
Körfvel
spanfk
Syra Spanfk
Italiensfk
Blomkåhl
Sparis
Kardon
Artskåck kron-
Portulak
Dill
Fänkåhl
Pårfilia

Brassica viridis.
rubra.
capitata.
sabaudica.
laciniata.
sabellica.
selenisia.

Beta alba.
Atriplex alba.
rubra.

Spinacia.
Cichorium Endivia.
vulgare.
Scandix bimestris.
Myrrhis.
Rumex hispan.
Romana.

Brassica.
Asparagus.
Cynara caulesc.
capitata.
Portulaca.
Anethum vulg.
Fœniculum.
Apium Petroselin.

2. *Frequentes.*

Lattuk
krus-
röd-
Pisenlie
Rapuntsel vinter
Kraffe indisk
vinter-
sommars-
krus-
Bitter saltso,
Dragon
Pimpenella
Stoffer blomma

Lactuca capitata.
crispa.
rubra.
Leontodon Flor.
Valeriana
Tropeolum.
Erysimum Flor.
Lepidium Nasturt.
crispum.
vulgare.
Artemisia Draco.
Poterium.
Borrago.

MACELLUM SVECICUM.

Lök gräs.
Piplök.
Johannis.

Vin-Ruta
Malört Romersk
Citron Meliss
Krusmynta
Basilika
Meiran.
Lavendel
Salvia Tysk
Klärj
Safver
Tymian

Allium cepa juncif.
fistulosa.
sectilis.

Ruta.
Artemisia Absinth.
Melissa.
Mentha.
Ocimum.
Origanum Majorana.
Lavandula
Salvia.
Horminum.
Satureja.
Thymus.



MACELLUM SVECICUM.

IV. FRUCTUS.

I. *Vulgares.*

Gurka

Melon

vatten-

Pompa

Calabafs

Jordgubbar

Åkerbår

Årter gröna-

focker-

kant-

kron-

kryp-

Bönor

Turkiska-

kryp-

Lins

Senap

hyit

Kumin

Anis

Koriander

Angelica

Cucumis sativus.

melo.

Cucurbita citrullus

pepo.

lagenaria.

Fragaria.

Rubus

Pisum hortense B.

cort. eduli γ.

quadratum ε.

umbellatum δ

nanum ζ.

Vicca. Faba.

Phaseolus vulg. 1.

humilis. 2.

Cicer Lens. 2.

Sinapis Flor. 549.

apii folio. 1.

Carum.

Anisum.

Coriandrum.

Angelica.

Nigella.

Corchorus.

MACELLUM SVECICUM.

V. ARBORETUM.

I. Communes.

Appel
 dvärg-
 blod-
 astrakans-
 borstorf-
 Renätter
 Påron
 dåsmans-
 Bergamotter
 Bonkretienger
 Plomon
 hvita
 Kårsbår
 spanska
 Fogel-
 fylt-
 Bigarotier
 Moreller
 Oxell
 Vinbår röda
 hvita
 svarta
 Krusbår gröna
 ludna
 röda
 Berberis
 Hallon hvita
 Brambår
 Rosor Provinske
 hvita
 månads
 holländska
 Törne ångelskt
 Hassel Lambertiskt

Pyrus Malus 1.
 paradisfac. β.
 rubellia δ.
 pellucida ε.
 borstorphian. ζ.
 prasomila η.

Pyrus. 2.
 formia δ.
 falerna β.
 pompefona γ.

Prunus 1. β.
 cerea. δ.
Cerasus *apronia* 1. β.
 saliva γ.
 racemosa ε.
 sanguinea η.
 duracina δ.
 juliana ε.

Crataegus
Ribes Flor. Svec. 197.

 1.
 196.
Grossularia Fl. Sv. 195.
 4.
 3.

Berberis.
Rubus 1.
 Flor 409.

Rosa 1.
 δ.
 δ.
 ι.
 κ.

Corylus.

2. Temperata.

Valnötter
 Kastanier
 Mandlar
 Persiker

Juglans
Fagu Castanea
Amygdalus sativ
Persica

Apri-

MACELLUM SVECICUM.

Aprikofer
Mespilar
Vindrufver
Mullbär
Fikon

Prunus Armeniaca.
Mespilus
Vitis
Morus
Ficus

3. *Calidæ.*

Lager
Myrten.
Laurocerasus.
Citron
Pomerants
Applesin

Laurus
Myrtus
Padus
Citrus.

Auranthium.
ß.

4. *Calidissima.*

Koffe

Coffea



HORTICULTURA TOPOGRAPHICA.

- I. **FRIGIDÆ** plantæ hyemes nostrates ferunt.
1. ALPINÆ omnes vernaes sunt, cum nec Æstas nec Autum-
nus in Alpibus; gelu non corrumpuntur; loca expetunt
aprica.
 2. SIBIRICÆ hyemes intensissimas ferunt.
 3. GERMANICÆ *Septentrionales, Helvetica, Hungarica, Austriaca,*
Anglica, Belgica, Gallica supra Parisios, & quæ magis Borea-
les rarissime nostrates reformidant hyemes.
 4. VIRGINICÆ magis delicatæ, tamen facilius sub dio vident, quam
in hybernaculo, modo hyeme parum tegantur.
- II. **TEMPERATÆ** plantæ & gelu intensiore & calore hybernaculi,
supra gradum decimum caloris in domo ascendente, per hye-
mem læduntur.
5. AUSTRALIS Europæ, *Gallia* extra Parisios, *Narbona, Hispanica,*
Lusitania, Italia, Syria, hybernacula frigidiora intrant hyeme.
 6. NARBONENSES minus delicatæ, sed æstate loco calido aprican-
tur, ut semina maturent.
 7. LUSITANICÆ minus gelu ferunt hyeme.
 8. HISPANICÆ fere cum lusitanicis eadem.
 9. ITALICÆ sæpe minus frigidæ, quam Hispanicæ.
 10. MEDITERRANÆ, ex intulis maris, ab omni gelu hyeme custo-
diendæ, & æstate loco aprico calido servandæ.
 11. SYRIACÆ, cum *judaicis & orientalibus* fere communes sunt, &
sæpe minus delicatæ, quam præcedentes temperatæ.
- III. **CALIDÆ.**
12. CAPENSES seu *Æthiopica* non ferunt hyemes nostrates sub dio,
nec in hybernaculo calido ultra 12 gradus servandæ, florent hye-
me lubentissime.
 13. MEXICANÆ & *Brasilenses* nec nimis fervidæ, nec nimis gelidæ
sunt.
 14. INDICÆ OCCIDENTALES semper hybernacula calidissima in de-
liciis habent & terram prægnantem.
 15. INDICÆ ORIENTALES calidæ, in terra prægnante & hybernacu-
lo calido asservandæ, vere & autumno florent.
 16. CANARIENSES calidissimæ sunt.
 17. ÆGYPTICÆ & *Arabica* calidæ & siccæ, per dimidium annum
vix aquis irrotandæ.



CLASSIS I.

FRIGIDÆ.

I. ALPINÆ.

Crocus I.
Scabiosa I.
Epimedium I.
Primula I.
Angelica.
Ligusticum I. 2.
Scandix 2. 3.
Selinum 2.
Athamanta I.
Imperatoria I.
Allium 6
Galanthus I.
Leucojum I.
Colchicum I.
Fritillaria I.
Anthericum 4.

Bistorta I.
Rheum I.
Saxifraga I.
Saponaria 4.
Pæonia I.
Ranunculus I.
Aconitum I. 3.
Helleborus I. 2. 3.
Scutellaria 2.
Sisymbrium I.
Geranium 10.
Hieracium 2.
Senecio I.
Buphtalmum 3.
Centaurea I.

2. SIBIRICÆ.

a Perennes.

Veronica I. 2. 3
Melica I.
Elymus 2.
Galium I.
Messerschmidia I.
Claytonia I.
Campanula 5.
Polemonium I.
Hyoschamus 2.
Cynanchum I.
Selinum 3.
Linum 2.
Hyacinthus 2.
Lilium 2. 3.

Allium 11. 12. 13.
Helxine 4.
Rheum 2.
Zygophyllum I.
Saponaria 4.
Silene 3. 13.
Sedum I. 2.
Papaver I.
Peganum I.
Delphinium 3. 4.
Aconitum 2.
Aquilegia I.
Nepeta 3.
Dracocephalum I.
Hyssopus 2.
Phlomis 2. 3.

Scutel-

FRIGIDÆ.

Scutellaria 4.
 Alyssum 1.
 Bunias 1.
 Althæa 1.
 Astragalus 3. 6.
 Phoca 1.
 Hedyfarum 5.
 Trifolium 5.
 Trigonella 1.
 Lathyrus 8.
 Vicia 6.
 Orobus 1.
 Hypericum 1.
 Crepis 3.
 Sonchus 2.
 Artemisia 1.
 Echinops 2.
 Serratula 1. 2.
 Tussilago 1.
 Carduus 4.
 Cnicus 2.
 Othonna 1.
 Centaurea 3.
 Urtica 1.

β *Arbores.*

Syringa 1.
 Lonicera 3.
 Polygonum 1.
 Amygdalus 3.
 Philadelphus 1.
 Spiræa 1.
 Robinia 2. 3. 4.

Thuja 2.
 Osyris 1.

γ *Annua.*

Corispermum 1. 2.
 Blitum 2.
 Valeriana 2.
 Amethystea 1.
 Ziziphora 1.
 Lyfimachia 1.
 Salsola 1. 2.
 Chenopodium 3. 4.
 Heracleum 1. 2.
 Statice 2.
 Helxine 1.
 Tribulus 1.
 Silene 11.
 Potentilla 1.
 Isopyrum 1.
 Dracocephalum 2. 6. 7.
 Sideritis 1.
 Leonurus 1. 2.
 Brassica 6. 7.
 Sinapis 2.
 Sifymbrium 4.
 Arabis 1.
 Astragalus 4. 8.
 Vicia 7.
 Artemisia 4.
 Centaurea 5.
 Ceratocarpus 1.
 Atriplex 2.

3. GERMANICÆ.

α *Perennes.*

Valeriana 1. 5.
 Iris 1. 2. 4. 5. 6.
 Cyclamen 1.
 Atropa 1.
 Vinca 1.

Eryngium 1.
 Peucedanum 1.
 Selinum. 1. 2.
 Ornithogalum 2.
 Colchicum 1.
 Hemerocallis 1. 2.

FRIGIDÆ.

Lilium 2. 4.
 Rumex 2.
 Dianthus 2.
 Saponaria 1.
 Euphorbia 16.
 Clematis 1. 2.
 Mentha 2.
 Scrophularia 1. 2.
 Digitalis 1.
 Cheiranthus 2.
 Sifymbrium 1.
 Lavatera 4.
 Althæa 1.
 Lathyrus 1.
 Tanacetum 1.
 Porterium 1.
 Parietaria 1.

β *Arbores.*

Cornus 1.
 Ilex 2.
 Staphylæa 1.
 Acer 1.
 Cerasus 1.
 Prunus 1.
 Mespilus 1.
 Cytisus 1. 2.
 Ulex 1.
 Ruscus 3.

γ *Annua.*

Blitum 1.
 Salvia 7.
 Scabiosa 2.
 Dipsacus 1. 2.
 Aparine 1. 2.
 Asperula. 1.
 Echium 1.

Lycopsis 2.
 Androsace 1.
 Campanula 3.
 Beta 1.
 Bupleurum 1.
 Chærophyllum 1.
 Coriandrum 1.
 Pastinaca 1.
 Scandix 1. 2.
 Sison 1.
 Corrighiola 1.
 Saponaria 3.
 Silene 9.
 Cucubalus 3.
 Lythrum 1.
 Papaver 1. 2. 5.
 Melidonium 2. 3.
 Euphorbia 10. 11. 19.
 Reseda 12.
 Betonica 2.
 Antirrhinum 4. 5. 6. 7. 9.
 Scrophularia 2.
 Iberis 3.
 Hesperis 1.
 Arabis 2.
 Sifymbrium 3. 2.
 Sinapis 1.
 Lathyrus 9.
 Vicia 3.
 Ornithopus 1.
 Trifolium 7. 8.
 Hypochæris 2.
 Picris 1.
 Scorzonera 2.
 Matricaria.
 Urtica 2.
 Mercurialis
 Valantia 2.

4. VIRGINICÆ.

α *Perennes.*

Verbera 4. 5.
 Monarda 1.

Commelina. 2.
 Elymus 1.
 Phlox 1.

FRIGIDÆ.

Solanum 3.
 Angelica 1.
 Ferula 3.
 Sanicula 1.
 Aralia 1.
 Menispermum 1.
 Rumex 1.
 Saururus 1.
 Tradescantia 1.
 Silene 6.
 Phytolacca 1.
 Filipendula 1.
 Actæa 1.
 Podophyllum 1.
 Aquilegia 2.
 Scrophularia 4.
 Mimulus 1.
 Ruellia 1.
 Sida 5.
 Amorpha 1.
 Glycine 1.
 Hedysarum 6. 7.
 Hieracium 3.
 Gnaphalium 1.
 Elephantopus 1.
 Porophyllum 1.
 Solidago 1. 2.
 Aster 2. 3.
 Helenia 1.
 Helianthus 3.
 Rudbeckia 1.
 Coreopsis 1. 2.
 Osteospermum 1.
 Lobelia 1.
 Sisyrrinchium 1.
 Passiflora 2.

β Arbores.

Cephalanthus 1.
 Cornus 1.
 Evonymus 1.
 Ptelea 1.
 Ceanothus 1.
 Diervilla 1.
 Ribes 2. 5.
 Chenopodium 1.

Rhus 2. 4.
 Jucca 1.
 Acer 2.
 Cercis 1.
 Cratægus 1.
 Rubus 1.
 Liriodendrum 1.
 Bignonia 1.
 Hibiscus 1.
 Robinia 1.
 Platanus 1.
 Liquidambar 1.
 Juglans 2.
 Cupressus 2.
 Thuja 1.
 Myrica 1.
 Populus 1.
 Gleditsia 1.

γ Annua.

Monarda 2.
 Melothria * 1.
 Mollugo 1.
 Ludwigia 1.
 Solanum 1. 6.
 Physalis 3.
 Convolvulus 1.
 Campanula 3.
 Oenothera 1.
 Cassia 4. 5. 6. 7.
 Silene 12.
 Penthorum 1.
 Hyssopus 3.
 Sida 2.
 Fumaria 1.
 Erigeron 1. 4.
 Senecio 8.
 Aster 1.
 Rudbeckia 2.
 Lobelia 1.
 Zea 1.
 Coix 1.
 Xanthium 1.
 Ambrosia 1. 2.
 Acalypha 1.
 Sicyos 1.

CLASSIS II.

TEMPERATÆ.

5. AUSTRALES.

α Arborea.

Phillyrea 1. 2.

Jasminum 4.

Salvia 1.

Rosmarinus 1.

Rhamnus 1. 2.

Lonicera 1.

Ferula 1.

Tamarix 1.

Viburnum 1. 2.

Daphne 1.

Ruta 1.

Cercis 1.

Myrtus 1.

Lavandula 1. 2.

Althæa 2.

Anagiris 1.

Coronilla 1.

Spartium 1. 2.

Buxus 1.

Pistacia 1. 2.

Pinus 1.

β Perennes.

Iris 2. 7.

Physalis 1.

Crithmum 1.

Ferula 1.

Asphodelus 2.

Narcissus 1. 2. 3.

Dictamnus 1.

Cucubalus.

Satureja 2.

Phlomis 1. 2.

Antirrhinum 8.

Digitalis 1. 2.

Galega. 1.

Conyza 1.

Achillea 2. 3.

Momordica 3.

γ Annua.

Valeriana 3.

Phalaris 1.

Cerinthæ 1.

Heliotropium 1.

Campanula 1. 4.

Verbascum 1. 2.

Convolvulus 2.

Chenopodium 5.

Ammi 1.

Tribulus 1.

Potentilla 1. 2.

Euphorbia 10. 12. 14. 18.

Reseda 2. 3.

Adonis 1.

Teucrium 4.

Draba 1.

Myagrum 1.

Malva 3.

Cicer 1. 2. 3.

Medicago 2. 3.

Ornithopus 2.

Vicia 2.

Lapsana 2. 3. 4. 5. 6.

Carduus 1. 2. 3.

Cynara 1.

Xeranthemum 1.

Erigeron 2.

Senecio 3. 5.

Centaurea 4. 9.

6. NAR.

TEMPERATÆ.

6. NARBONENSES.

α Arbores.

Cistus 2.
Coriaria 1.
Lavatera.

β Perennes.

Euphorbia 12.
Thymus 1.
Gladiolus 1.
Rubia 1.
Telephium 1.
Asclepias 1.
Mentha 3.
Astragalus 7.
Echinops 2.
Centaurea, 6.

γ Annua.

Buffonia 1.
Tillea 1.
Crucianella 1. 2.
Coris 1.
Lysimachia 2.

Anethum 2.

Caucalis 1.

Silene 1. 5.

Garidella 1.

Potentilla 2. 3.

Cistus 3.

Reseda 1. 3.

Nigella 1.

Satureja.

Bumias 2.

Hesperis 3.

Lupinus 2.

Astragalus 5.

Cicer 2.

Hippocrepis 2.

Scorpiurus 1.

Trigonella 2.

Trifolium 2. 4.

Andryala 1.

Scolymus 1.

Carthamus 2.

Lapsana 2.

Poterium 2.

Croton 1.

7. LUSITANICÆ.

α Perennes.

Padus 2.
Iris 3.
Verbena 3.

β Annua.

Cynoglossum 2.

Silene. 7. 10.

Isatis 1.

Onopordum 1.

Micropus 1.

Centaurea 3.

Xanthium 1.

8. HISPANICÆ.

α Perennes.

Cistus 1.
Coronilla 1.

Cneorum 1.

Teucrium 5

Lavandula 1. 3.

TEMPERATÆ.

Thymus 2.
Marrubium 2.
Nepeta 1, 2.
Iris 7.
Medicago 1.
Scorzonera 1.
Tragopogon 4.
Scilla 1.

Hypecoum 1.
Anethum 1.
Cucubalus 4, 5.
Silene 8.
Nigella 4.
Lavandula 1, 2, 3.
Vella 1.
Crambe 1.
Hedysarum 3.
Lathyrus 3, 5.
Anthyllis 2.
Coronilla 2.

β *Annua.*

Scabiosa 4.

9. ITALICÆ.

α *Arbores.*

Laurus 1.
Fraxinus 1.
Lavatera 1.
Anthyllis 1.
Colutea 1.
Cytisus 1.
Medicago 5.
Morus 1, 2.
Fagus 1.
Pinus 1.

Malope 1.
Echinops 1.
Carlina 1.
Carpesium 1.
Ruscus 1, 2.

γ *Annua.*

β *Perennes.*

Salvia 1.
Cyperus 1.
Trachelium 1.
Hyacinthus 4.
Ornithogalum 1.
Coronaria 1, 2.
Euphorbia 15.
Hysopus 1.
Melissa 1.
Scutellaria 1.
Antirrhinum 2, 3.
Acanthus 1.
Hesperis 2.

Briza 1.
Psyllium 2.
Cynoglossum 1.
Campanula 1, 4.
Rumex 4, 7.
Silene 4.
Oxalis 1.
Cunila 1.
Scrophularia 3.
Antirrhinum 3.
Biscutella 1, 2.
Clypeola 1.
Hibiscus 6.
Anthyllis 1.
Hippocrepis 1, 9.
Medicago 2, 3, 4.
Pisum 2.
Tragopogon 3.
Valantia 1.

TEMPERATÆ.

IO. MEDITERRANEÆ.

a Sicula.

Teucrium 5.
Cytisus 3.
Cynanchum 1.
Smyrniun 1.
Athamanta 2.
Asphodelus 1.
Allium 2.
Silene 2.
Ægilops 1.
* Valeriana 3.
Coronaria 2.
Antirrhinum 1.
Iberis 1.
Cardamine 1.
Lupinus 2. 3.
Lathyrus 4.
Lotus 1. 2. 3. 4.
Chrysanthemum 1.
Tordylium 2.
Anisum 2.
Convolvulus 2.

β Cretica.

Perennes.

Cupressus 1.
Sempervivum 1.
Teucrium 2. 3.
Marrubium 1.
Stachys 1.
Asphodelus 2.

Annua.

Rumex 3.
Fagonia 1.
Cucubalus 2.
Silene 6.
Iberis 2.
Lavatera 3.
Trifolium 1.
Hypochaeris 1.
Pieris 2.
Lapsana 6.
Centaurea 3.
Catananche 1.
Carduus 3.
Chrysanthemum 1.

II. SYRIACÆ

a Arbores.

Ælagnus 1.
Styrax 1.
Amygdalus 1.
Punica 1.
Hibiscus 3.
Pistacia 1.
Ceratonia 1.
Juniperus 1.
Prasium 1.
Gnaphalium 4.

β Perennes.

Salvia 6.
Asclepias 2.
Ferula 2.
Statice 1.
Lilium 1.

Cepa 9.
Zygophyllum 1.
Galega 1.
Samolus 1.

γ Annua.

Ziziphora 1.
Knautia 1.
Echium 2.
Artemisia 1.
Tordylium 1.
Helxine 2. 3.
Moluccella 1.
Malva 1.
Lavatera 5.
Lathyrus 2. 6.
Scorzonera 3.
Anisum 1.



CLASSIS III.

CALIDÆ.

12. CAPENPES.

a Perennes.

Mesembryanthemum 1-9.
 Aloe 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 Anthericum 1. 2. 3.
 Anacampseros 1.
 Euphorbia 3. 5.
 Stapelia 1.
 Tetragonia 1.
 Geranium 1--8.
 Hæmanthus 1.
 Malva 5.
 Hermannia 1.
 Rhus 3.
 Colutea 2.
 Psoralea 1.

Asclepias 3.
 Santolina 2.
 Chrysocoma 1.
 Arctotis 1.
 Solanum 5.
 Melianthus 1.
 Grevia 1.
 Antholyza 1.

β Annua.

Calendula 2. 3.
 Solanum 7.
 Fumaria 2.
 Gnaphalium 2.
 Senecio 2.
 Cotula 1. 2.

13. MEXICANÆ.

a Perennes.

Mimosa 1. 2.
 Jatropha 1.
 Rhus 1.
 Psoralea 3.
 Commelina 1. 3.
 Passiflora 1. 2.
 Amaryllis 1.
 Bromelia.
 Melochia 1.

β Annua.

Parthenium 1.
 Iva 1.
 Chenopodium 6.
 Fumaria 2.
 Arachis 1.
 Clitoria 2.
 Tagetes 1. 2.
 Helianthus 1.
 Argemone 1.

14. INDICÆ OCCIDENTALES.

a Arbores.

Rivinia 1.
 Petiveria 1.
 Parkinsonia 1.

Malpighia 1.
 Triumfetta 1.
 Bixa 1.
 Hymenaea 1.

Lan-

CALIDÆ.

Lantana 1. 2.
Mimosa 1. 2. 3. 4. 6.
Cassia 1. 2. 6.
Anacardium 1.
Volkameria 1.
Paulinia 1.
Cactus 1. 14.
Agave 1.
Yucca 2.

Dolichos 2. 3.
Mirabilis 1.

γ. Annua.

Valeriana 3.
Alfine 1.
Ammannia 1.
Heliotropium 2.
Datura 1.
Ipomœa 1. 3. 4.

β. Herba.

Crinum 1.
Amaryllis 1.
Arum 3.
Canna 2.
Sida 3. 4. 5.
Ruellia 2.
Martynia 1.

Justicia 1.
Corchorus 1. 2. 3.
Brovallia 1.
Ageratum 1.
Gossypium 1. 2.
Crotalaria 2.
Dolichos 2. 3.
Bidens 1.
Erigeron 3.
Milleria 1.

15. INDICÆ ORIENTALES.

α. Arborea.

β. Perennes.

Nyctanthes 1.
Jasminum 1.
Justicia 1.
Nerium 1.
Tamarindus 1.
Bauhinia 1.
Guilandina 1.
Poinciana 1.
Cæsalpina 1.
Indigofera 1.
Cassia 3.
Mimosa 5.
Psidium 1.
Urena 1.
Hibiscus 2. 4. 5.
Cytisus 4.
Xylon 1. 2.
Erythrina 1.
Euphorbia 2. 4. 6.
Aloe 1.

Amomum 1. 2.
Canna 1.
Castus 1.
Kæmpferia 1.
Amaryllis 2.
Polianthes 1.
Ixia 1.
Boerhavia 1.
Hedysarum 1.
Saccharum 1.
Plumbago 1.
Sida 5.
Elephantopus 1.
Dioscorea 1.

γ. Annua.

Panicum 1. 2.
Scabiosa 3.
Psyllium 1.

Borra-

CALIDÆ.

Borrago 2.

Ipomœa 1.

Convolvulus.

Celosia 1.

Datura 2.

Capsicum 1.

Chenopodium 2.

Gomphrena 1.

Cardiospermum 1.

Corchorus 1.

Euphorbia 20.

Ocymum 1.

Cleome 1.

Sida 2. 4.

Malva 6.

Phaseolus 1. 2. 4. 5.

Clitoria 1.

Trifolium 9.

Lathyrus 4.

Aster 4.

Sigesbeckia 1.

Impatiens 1.

Phyllanthus 1.

Acalypha 1.

Ricinus 1.

Coix 1.

Momordica 1. 2.

16. CANARIENSES.

Phyllis 1.

Silvia 5.

Euphorbia 1.

Aizoon 1.

17. ÆGYPTIÆ.

α Arbores.

γ Annua.

Coffea 1.

Lycium 1.

Euphorbia 7. 8.

Glycine 2.

Mimosa 7.

Mesembryanthemum 10.

Anisum 1.

Rumex 3.

Neurada 1.

Nigella 3.

Anastatica 1.

Dolichos 1.

Carthamus 1.

Senecio 5. 6.

Bupthalmum 2.

Valantia 3.

β Perennes.

Arum 2.



TABULÆ.

Tab. I. MIMULVS pag. 176.

- a. Calyx cum stylo.
- b. Calyx explicatus.
- c. Corolla.
- d. Stamina.

Tab II. CELSIA pag. 179.

- a. Calyx.
- b. Corolla antice.
- c. Corolla postice.

Tab. III. TUSSILAGO pag. 259.

Fig. 1. a. Anandria in Diff. de Anandria.

- b. Calyx communis perpendiculariter dissectus.
- c. Flosculus femineus radii.
- d. Flosculus hermaphroditicus disci.

Fig. 2. a. Bellidiastri flore eadem.

- b. Flosculus femineus radii.
- c. Corollula feminea.
- d. Calyx communis cum fructu.

ADDENDA.

~~IXIA~~ pag. 16. linea $\frac{1}{2}$ adde.

~~Bermudiana~~ iridis folio majori, flore croceo elegantissime punctato. *Roloff. Krauss. 25.*



ERRATA.

Corispermum	2. lin 10. hic <i>lege</i> his.
Nyctanthus	1. - 25. canabiculatus - canaliculatus.
Verbena	2. - 10. fructo - fructu.
Horminum	8. - 3. Hominum - Horminum.
Monarda	1. - 1. setterminalibus - terminalibus.
Hordeum	4. - 1. mutuis - muticis.
Erythronium	1. - 1. Erythrnium - Erythronium.
Helxine	1. - 6. emiinento - eminente.
Prunus	1. - 8. Prunus = δ Prunus.
Trifolium	8. - 5. Melilatus - Melilotus.
Artemisia	1. - 0. ARTHEMISIA = ARTEMISIA.



10

10



